

A TURJÁNVIDÉK NATURA 2000 TERÜLET DÉLI RÉSZÉNEK BOGÁRFAUNÁJA (COLEOPTERA)

MERKL Ottó¹ és SZÉNÁSI Valentin²

¹Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, 1088 Budapest, Baross utca 13.

E-mail: merkl.otto@nhmus.hu

²Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő utca 21.

E-mail: szvalent@gmail.com

A Duna–Tisza közén, Pest megyében fekvő Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén, vagyis a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótérén és a Dabasi Turjános Természetvédelmi Területen az 1990-es évek eleje óta gyűjtött bogáryanagból 1085 fajt határoztunk meg. A bogárfauna természetvédelmi és faunisztikai szempontból legértékesebb tagjai a nyílt és zárt homoki gyepek lakói. A területről 41 védett és 1 fokozottan védett faj került elő, köztük 4 Natura 2000 jelölőfaj, a magyar futrinka (*Carabus hungaricus*), a szarvas álganéjtúró (*Bolbelasmus unicornis*), a skarlátbogár (*Cucujus cinnaberinus*) és a nagy höscincér (*Cerambyx cerdo*). Országos viszonylatban is kiemelkedően népes állománya él itt a következő védett fajoknak: *Carabus hungaricus* (Carabidae), *Glaresis rufa* (Glaresidae), *Herpes porcellus* (Curculionidae), *Macrosiagon bimaculata* (Rhipiphoridae), *Scarabaeus typhon* (Scarabaeidae), *Stenoria apicalis* (Meloidae). A területről előkerült egy sutabogárpéldány (Histeridae), mely a Magyarországon eddig ismeretlen *Microsaprinus* genuszba tartozik, de mivel nőstény, faji szinten egyelőre nem lehet azonosítani.

Kulcsszavak: bogarak, Coleoptera, erdőössztyepp, Homokhátság, Natura 2000

BEVEZETÉS

A vizsgált terület

A jelen tanulmány által lefedett terület magában foglalja a Turjánvidék Natura 2000 terület (HUDI20051) déli részét, mely – nem kizárólag, de túlnyomórészt – Táborfalva és Dabas közigazgatási határai közé esik. E területet gyakorlati okokból két egységre osztjuk: az egyik a Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület (a továbbiakban Dabasi Turjános, illetve Vizes-Nyilas-erdő), a másik a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér (a továbbiakban lőtér vagy gyakorlótér). Ez utóbbit a Honvédelmi Minisztérium kezeli, azonban a lőtér területe nyugaton alaposan túlnyúlik a Natura 2000 terület határain. Közleményünkben az innen – leginkább a Rákóczi erdejéből és a Nagy robbantóról – származó adatok is szerepelnek.

A Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér területe 1875 óta szolgál katonai célokat (JUHÁSZ 2018, ROGOSZ 2001), de a természetvédelmi szempontból legértékesebb részek florisztikai-faunisztikai adataiból látszik, hogy korábban sem lehetett jellemző az intenzív mezőgazdasági művelés – nyilván külterjes állattartással hasznosították az agrárszempontból meglehetősen rossz minőségű földeket. Manapság a katonai használat is jóval visszafogottabb, mint az 1950-es évektől a 2000-es évek elejéig; Natura 2000 terület lévén igénybevételi korlátozások vannak érvényben. A „manőverező” részen és a „biztonsági zónában” a katonai használat jobbra az utakra szorítkozik, de a növényzet ezeket is egyre inkább visszafoglalja. Vannak utak, amelyek a bogarászati felmérés első évében (2012-ben) még személygépkocsival is úgy-ahogy járhatók voltak; 2015-ben azonban ezeken az utakon már alig lehetett közlekedni a keréknyomból felnövő cserjék és nyárcsemeték miatt.

A Natura 2000 terület északi része, illetve az ahhoz közel eső Ócsai Gyakorlótér bogárfaunájáról e kötet két másik dolgozata számol be (CSEHÓ 2018, MERKL 2018).

A bogarászati kutatás története

A lőtér bogarászati kutatásának előzményeit az 1990-es évek elejéig érdemes visszavezetni. Szél Győző, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa 1993-ban látni akarta a környező területeken (Tatárszentgyörgy, Ladánybene, Kunbaracs, Kunpeszér) fellépő „sáskajárást” (NAGY 1994), ezért ellátogatott a helyszínre. Június 23-án Tatárszentgyörgyön észrevett egy trágyagolyót görgető óriás-galacsinhajtót (*Scarabaeus typhon*), melyet akkor már évtizedek óta nem látott rovarász. Ez felkeltette az amatőr és hivatásos bogarászok figyelmét. A következő néhány hétben többen felkerestek egy közeli ígéretesnek látszó helyet „Örkény és Tatárszentgyörgy között félúton, homokbuckás területen” (MEDVEGY és MUSKOVITS 1994), vagyis magán a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótéren, ahol az ott talált vagy magukkal hozott lótrágyán a ritka bogár számos egyedét figyelték meg.

Mivel kiderült, hogy a homoki bogárfauna jellegzetes tagjainak a lőtér az egyik legbiztosabb, és Budapesthez viszonylag közel eső lelőhelye, a bogarászok (ahogyan más rovarászok is) az 1990-es és a 2000-es években sokszor jártak a területen. Számos érdekes, ritka fajra is rábukkantak, többek között a nagy aknásfutóra (*Acinopus ammophilus*) vagy a bütyköshátú ormányos (*Herpes porcellus*) harmadik lelőhelyére az országban. Többnyire Örkény felől, a Tatárszentgyörgy felé vezető aszfaltúton érkeztek, és attól jobbra vagy balra néhány száz méternél nem is merészkedtek távolabb (kelet felé nagyjából a lódombig). A fogott példányok lelőhelycéduláján szinte mindig Örkény – esetleg „Örkény,

Ilonamajor”, mint a legközelebbi lakott településrész – szerepel, noha ez a terület közigazgatásilag Táborfalvához tartozik. A lőtérnek híre ment az országhatáron túl is: cseh bogarászok és lepkészek körében is jól ismert gyűjtőhely lett „Örkény”. Akkoriban hétköznapiakon intenzív katonai műveletek zajlottak, az átvezető utakat néha egész napokra lezárták; hétvégéken azonban csend és nyugalom uralta a tájat, a terepen mozgó rovarászoknak nem állta útját akadály. E gyűjtéseknek véget vetett a Natura 2000 terület kijelölése, mely útelzárással sorompók elhelyezésével járt, és a belépést szigorúan engedélyhez kötötte. Az amatőr bogarászok azonban a 2010-es évek engedélyhez kötött gyűjtéseinek feldolgozásában is alaposan kivették a részüket, és gyűjteményük vonatkozó adatait is a szerzők rendelkezésére bocsátották.

A Dabasi Turjánosban a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai néhány alkalommal gyűjtöttek az 1970-es évek végén. Az akkori – nagyon kevés – adatot a Kiskunsági Nemzeti Park faunáját tárgyaló kötetek tartalmazzák (MAHUNKA 1986, 1987). Ezeket a lassan négy évtizedes adatokat nem ismételjük meg, egyetlen kivétellel: hogy a védett fajok listája minél teljesebb legyen, a pannon hólyaghúzó (*Mylabris pannonica*) szerepel a felsorolásunkban.

A jelen dolgozat első szerzője (Merkl Ottó) a „*Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén*” című LIFE+ Természet pályázat (azonosító: LIFE10NAT/HU/000020) keretében – a természetvédelmi kezelés monitorozás tevékenység részeként – 2012-ben és 2015-ben vizsgálta a bogárfaunát a lőtéren, elsősorban annak a Natura 2000 területre eső részén. 2012-ben a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) szakemberei által a lőtéren kijelölt 10 helyen történt rendszeres mintavétel – a terület monitorozási alapfelmérésének részeként –, illetve a kijelölt helyeken túl a terület más részein is gyűjtöttünk. 2015-ben pontosan ugyanazokon a helyeken hasonló felmérésre került sor, ugyanabban az évben Merkl Ottó a táborfalvai Vezetési pályán (a Natura 2000 területen belül), illetve a lőtér Natura 2000 területen kívüli egyes részein is gyűjtött (a dabasi Rákóczi erdejében és a Nagy robbantón). Néhány alkalommal a Dabasi Turjánosban is járt.

A mintavételt is, de az eredményeket még inkább befolyásolta az a sajnálatos tény, hogy 2012 rendkívül száraz évnek bizonyult. A lápréteken és a láperdőben már kora tavasszal sem volt semmilyen vízborítás, és számottevő csapadék sem tavasszal, sem nyáron nem hullott a területen. A száraz gyepek májusra szinte kiégtek, ami a növényzetet és a bogárfaunát egyértelműen szegényítette. Súlyosbította a helyzetet, hogy már 2011 is igen aszályos év volt, így a száraz 2012-nek már eleve „legyengült” bogárfauna vágott neki.

Sajnos, 2015 sem volt ideális évnek nevezhető a bogárfauna felmérése szempontjából. Tavasszal a lápréteken igen sokáig állt a víz, emiatt a lápréti

talajcsapdák is vízzel telítődtek. Júniustól augusztusig viszont rendkívüli meleg sújtott le az élővilágra: az egymást követő öt hőség hullám egészen rövidre csökkentette azt az időszakot, amikor a növényzeten és a talajfelszínen élő bogarak egyáltalán táplálkozni és szaporodni tudtak.

A dolgozat második szerzője (Szénási Valentin) 2002 óta gyűjt adatokat a Turjánvidék déli része és a lőtér szinte teljes területéről, fokozódó rendszerességgel, szintén a DINPI megbízásából, a 2010-es évek eleje óta elsősorban az ormányosalkatúakra (Curculionoidea) és a védett fajokra összpontosítva.

Kiterjedtebb bogárfaunisztikai adatsorok közlésére eddig nem került sor, de a szakirodalomban akadnak a vizsgált területre vonatkozó szórványos adatok (például HEGYESSY és mtsai 2000, KRÁTKÝ és PODLUSSÁNY 2008, MERKL 2004, SZALÓKI és mtsai 2012, SZÉL és mtsai 2006, SZÉNÁSI 2016).

ANYAG ÉS MÓDSZER

Mintavételi módszerek

Élvefogó talajcsapdák. A lőtér 10 mintavételi pontjában 10 literes műanyag-vödröket ástunk le, 2012-ben fedő nélkül, 2015-ben fedővel (a fedők alatt volt elég rés, ahol a bogarak be tudtak jutni). A vödrök alja át volt lyukasztva, hogy eső esetén ne álljon meg bennük a víz; 5 centiméter vastag földréteget és fűvet is tettünk bele, hogy az állatok elrejtőzhessenek, illetve a véletlenül beesett békák beáshassák magukat. A nyitott vödrök 2012-ben a nyílt helyeken júliusig voltak a helyükön, utána felszedtük őket, mert a nagy hőségben a belehullott gerincek nem éltek volna túl a két mintavétel közötti időszakot. A központi lőtér láperdejében azonban a vödrök októberig a helyükön maradtak. 2015-ben a fedett vödrök mindenütt kint maradtak októberig.

Fűhálózás. 2012-ben a mintavételi pontok környékén 50 méteres oldalú négyzetben hálóztuk a növényzetet. 2015-ben a Rákóczi erdejében, a Dabasi Turjánosban, a Nagy robbantón és a Vezetési pályán hálóztunk. 2012 előtt ez volt a leggyakrabban alkalmazott gyűjtőmódszer a lőtéren.

Boroscsapdák. 2012-ben a központi lőtéri láperdő szélén, illetve a táborfalvai közigazgatási területen, a lőtéren belül lévő, elég idős kocsányos tölgyesben vörösborral negyedrészig feltöltött műanyagpalackokat alkalmaztunk, melyeket 4 méter magasra helyeztünk a lombkoronába. 2015-ben hasonló módon mintavételeztünk a Rákóczi erdejében, a Dabasi Turjánosban, a Nagy robbantón és a Vezetési pályán.

Egyelés. A tereptárgyak (fadarabok, kövek) alatt talált, a talajfelszínen közlekedő, elhalt fában rejtőzködő vagy a növényeken ülő bogarakat puszta kézzel vagy csipesszel fogtuk meg.

Autóshálózás. 2012-ben a személygépkocsi tetejére szerelt, mintegy 1,5 négyzetméteres szájnyílású hálóval lassan hajtva gyűjtöttünk a lőtér járható útjain. A gyűjtött anyagot még aznap éjjel kiválogattuk. 2015-ben ugyanezt tettük a Rákóczi erdejében, a Nagy robbantón és a Vezetési pályán. Autóshálózásra néhányszor a 2000-es években is sor került. A módszer különösen alkalmas olyan bogárfajok gyűjtésére, melyek a talajban vagy a talajon lévő növényi törmelék között, vékony gallyakban, korhadt fák belsejében élnek, de legalább rövid ideig a levegőben rajzanak. Kora tavasszal és ősszel nappal célszerű autóshálózni, nyáron azonban a naplemente előtti és utáni fél–egy óra a legalkalmasabb. Ilyenkor olyan fajokat lehet gyűjteni, amelyek csak ebben az időben rajzanak, és fényre alig vagy egyáltalán nem repülnek. A hálózást akkor kell befejezni, amikor az autó lámpájának fényében már gyakran megcsillannak az éjszakai lepkék, ugyanis ezek pikkelyei a bogarakra tapadnak, illetve az alkonyati rajzás ekkorra már véget ér. Az autóshálózás alaposan átrajzolta a jelen írás első szerzőjének képét a magyar bogárfaunáról: számos olyan faj került elő, amelyeknek a gyűjtemények korábban csak néhány példányát őrizték, a módszer alkalmazásával azonban kiderült, hogy jóval nagyobb elterjedésűek és gyakoribbak, mint gondoltuk.

Éjszakai lámpázás. Az ilyen gyűjtést vagy kifeszített fehér vászonlepedővel és elé függesztett higanygőzlámpával, vagy fénycsővel működő automatikus fénycsapdával végeztük.

Rostálás. A talajról összeszedett növényi maradványok tömegét és fűcso-mókat kirostáltuk, majd a kapott finomabb törmeléket fehér lepedőn szétterítve a napon vagy autó meleg motorháztetőjén kiválogattuk.

A vizsgált példányok

Tanulmányunk alapjául elsősorban gyűjteményekben őrzött bizonyító példányok szolgálnak. Az adatokat akkor is ellenőriztük, ha azok a szakirodalomban már megjelentek. Egyes ritka fajok (elsősorban korábbi publikációkban faunára újként jelzett fajok) esetében jelezzük, hogy az adatokat hol közölték már; a gyakori fajoknál ettől eltekintettünk.

A bizonyító példányok nagy részét a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) őrzi, de sok adat forrásai amatőr bogárgyűjtők magángyűjteményei.

A terepen is egyértelműen azonosítható védett fajok esetében a közlés alapját számos esetben csak az adatbázisokban rögzített megfigyelés képezi. Ugyanezt tettük az élvefogó csapdákban talált gyakori, és szintén biztosan felismerhető fajokkal is. Mindazonáltal nincs olyan faj a felsorolásunkban, amelynek ne lennének gyűjteményben elhelyezett bizonyító példányai.

A példányok számát nem összesítettük (a fajok listájában a gyűjtési egységeknél nem is tüntettük fel), de ha fajonként csak átlag 3 példánnyal számolunk, akkor is 3000 körüli mennyiségről van szó; a valós szám ennél biztosan jóval nagyobb, valószínűleg a 10 ezret is meghaladja.

Adataink mennyiségi eloszlása a vizsgált területen nagyon egyenetlen. Az adatok túlnyomó többsége a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótérrel származik, a Dabasi Turjánosra vonatkozó adatok száma ehhez képest nagyon kevés.

A gyűjteményekben – az itt felsoroltakon kívül – sok olyan példány is található az 1980-as vagy még korábbi évekből, melyeknek Dabas vagy Táborfalva a lelőhelye. Mivel e települések külterületének csak egy része tartozik a lőtérhez, nem lehet biztosan állítani, hogy a példányokat a most vizsgált területen belül gyűjtötték (sőt, mivel katonai területről van szó, valószínűbb, hogy nem ott). Ezeket az adatokat a jelen tanulmányból ezért kihagytuk, de kijelenthetjük, hogy az ilyen bizonytalan lelőhelyű, bár természetvédelmi vagy faunisztikai szempontból figyelemre méltó fajok közül valamennyi előfordul a vizsgált területen belül is.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS

A terület bogárfaunájának összetétele és fajgazdagsága

A vizsgált területen összegyűjtött bogáranyagból 1085 fajt sikerült meghatározni. Egy fokozottan védett és 41 védett fajt mutattunk ki. A Natura 2000 jelölőfajok száma 4; a Turjánvidék ötödik jelölőfaja, a nagy szarvasbogár (*Lucanus cervus*) Ócsáról ismert (CSEHÓ 2018), de előfordulása a déli területen nem bizonyított. A védett fajok száma meglepően magas, különösen annak tükrében, hogy a magyarországi védett bogárfajok listájában túlnyomó részben a szaproxilofág, tehát főleg erdei fajok szerepelnek.

A lőtér bogárfaunája a jobb vízellátottságú helyeken, így elsősorban a kiszáradó lápréteken a gazdagabb. A természetvédelmi és faunisztikai szempontból érdekesebb fajokat azonban inkább a homoki gyepekben mutattuk ki. Faj- és egyedszámot tekintve a legkevesebb bogarat a nagyobb borókás állományok környékén találtuk (a kijelölt mintavételi helyek közül a 6. és a 7. pont környékén), különösen ott, ahol a lágyszárú növényzet szinte csak pázsitfüvekből (főleg árvalányhajból) áll, tehát ahol kétszikűek szinte csak elvétve akadnak.

A nedvesebb láprétek és a száraz homoki gyepek bogárközösségeiben csekély az átfedés; a közös fajok részben társulásközömbös, gyakori bogarak, illetve a területek mozaikossága miatt a nedvesebb részeken is akadnak szárazabb

kiemelkedések, ahol a száraz gyepek fajai kisebb számban bár, de megjelennek. Erre legjobb példa a 3. mintaterület, amelynek középpontja nedves láprét, de pár méteren belül már száraz gyepek is találhatók.

A terület bogárfaunája kivételesen gazdagnak és változatosnak tekinthető. A kimutatott védett és ritka fajok szórványosan másutt is előkerültek a Homokhátságon, illetve Magyarország más vidékein, de ilyen mennyiségben és együtt sehol másutt nem ismertek a pannon régióban. A viszonylag alaposan kutatott védett homokhátsági területek közül a fülöpházi homokbuckás bogárfaunája jöhet szóba összehasonlításként, de az ott talált védett fajok száma nem közelíti meg az itteniekét (pl. a magyar futrinka, a bütyköshátú ormányosbogár vagy a nagy hőscincér Fülöpházáról ismeretlen).

A homoki gyepek fajai közül egyesek előfordulnak a hegylábi és dombvidéki löszgyepekben, illetve a déli hegyoldalak lejtősztyeppjein és sziklagyepjeiben is. Ilyen például a magyar futrinka (*Carabus hungaricus*), a pusztai porva (*Phradonoma villosulum*), az alkonyati homoktúróbogár (*Ochodaeus chrysomeloides*), a sávós gyalogdíszbogár (*Sphenoptera substriata*), a fényes tolvajbogár (*Dignomus nitidus*) és az egyszínű szerecsenkata (*Parexochomus nigromaculatus*). Mások azonban nálunk kizárólag a homoki gyepeken élnek (obligát pszammofil fajok), kötött talajú száraz gyepekben nem találhatók. Közük tartozik többek között a nagy aknásfutó (*Acinopus ammophilus*), a homoki sutabogár (*Exaesiopus grossipes*), a pillás gombabogárka (*Leiodes ciliaris*), a vörhenyes csorvány (*Glaresis rufa*), a pusztai cserebogár (*Anoxia pilosa*), a homoki zömökdíszbogár (*Acmaeoderella mimonti*), a sarkantyús darázsbogár (*Macroisiagon bimaculata*), a keskenyfedős élösdibogár (*Stenoria apicalis*), a pikkelyes gyászbogár (*Leichenum pictum*), a homoki gyalogcincér (*Pedestredorcadion decipiens*) és a bütyköshátú ormányos (*Herpes porcellus*). Természetvédelmi szempontból ezek a lőtér legértékesebb bogárfajai.

A lőtéren 6 nagy futrinkafajt (*Carabus*) sikerült kimutatni (1–6. ábrák), ami meghaladta az előzetes várakozásokat, hiszen a hazai 28 *Carabus*-faj nagy többsége hegy- és dombvidéki üde erdők lakója. A száraz gyepekben csak a magyar futrinka fordult elő, a többi 5 mind lápréti-láperdei környezetből került elő, meglepő módon azonban a szárazságkedvelő magyar futrinka lápréten is megjelent.

A fentiek tükrében a terület minél magasabb fokú védelmet és jelentős természetvédelmi beavatkozásokat, majd folyamatos kezelést érdemel. További intenzív kutatás szükséges, célzott keresések minden bizonnyal további fajokra is fényt deríthetnek.

A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részéről kimutatott védett, fokozottan védett és Natura 2000 jelölőfajok összefoglalása az 1. táblázatban látható.

Az alábbiakban pár mondatban bemutatunk olyan fajokat, amelyek előfordulása a Turjánvidék déli részére jellemző, illetve faunisztikai szempontból figyelemre méltóak. A lista szubjektív, de azért képet nyújt a vidék jellegzetes bogárfaunájáról. Valamennyi előkerült védett fajt említjük, illetve – mivel Natura 2000 területről van szó – a jelölőfajokat külön mutatjuk be. A fajokat három élőhelytípushoz rendeltük. A homoki gyepek kategóriája magától értetődő; a kötött talajú gyepek alatt elsősorban a kiszáradó lápréteket értjük; a fás társulások pedig az őshonos és telepített erdők, illetve kis facsoportok és magányos fák. Ha egy bogárfaj több élőhelyen is előfordul, ott tárgyaljuk, ahol a leginkább jellemző. Néhány fajt – sajátos életmódja vagy ritkasága miatt – nem tudunk konkrét élőhelyekhez kötni, ezeket a fejezet végén külön mutatjuk be.

1. táblázat. A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén talált fokozottan védett, védett és Natura 2000 jelölő bogárfajok

Tudományos név	Magyar név	Védett (+), fokozottan védett (++)	Natura 2000	Lótér	Dabasi Turjános	Természetvédelmi érték (forint)
Carabidae	Futóbogárfélék családja					
<i>Acinopus ammophilus</i>	nagy aknásfutó	+		+		10 000
<i>Calomera littoralis nemoralis</i>	sziki cicindéla	+		+		10 000
<i>Carabus cancellatus</i>	ragyás futrinka	+		+		5000
<i>Carabus convexus</i>	selymes futrinka	+		+		5000
<i>Carabus granulatus</i>	szemcsés futrinka	+		+	+	5000
<i>Carabus hungaricus</i>	magyar futrinka	++	+	+		100 000
<i>Carabus scabriusculus</i>	érdes futrinka	+		+		5000
<i>Carabus violaceus</i>	kék futrinka	+		+		5000
<i>Cicindela campestris</i>	mezei cicindéla	+		+		10 000
<i>Cicindela hybrida</i>	öves cicindéla	+		+		10 000
<i>Cicindela soluta pannonica</i>	pusztai cicindéla	+		+		10 000
Lucanidae	Szarvasbogárfélék családja					
<i>Dorcus parallelipipedus</i>	kis szarvasbogár	+		+		5000
Geotrupidae	Álganéjtúró-félék családja					
<i>Bolbelasmus unicornis</i>	szarvas álganéjtúró	+	+	+		50 000
Glaresidae	Csorványfélék családja					
<i>Glaresis rufa</i>	vörhenyes csorvány	+		+		10 000
Scarabaeidae	Ganéjtúrófélék családja					
<i>Copris lunaris</i>	közönséges holdszarvú-ganéjtúró	+		+		5000


Tudományos név	Magyar név	Védett (+), fo- kozottan védett (++)	Natura 2000	Lőtér	Dabasi Turjános	Természetvédel- mi érték (forint)
<i>Oryctes nasicornis</i>	orrszarvú bogár	+		+		50 000
<i>Protaetia speciosissima</i>	pompás virágbogár	+		+	+	5000
<i>Protaetia affinis</i>	smaragdzöld virágbogár	+		+	+	10 000
<i>Protaetia ungarica</i>	magyar virágbogár	+		+	+	10 000
<i>Scarabaeus typhon</i>	óriás galacsinhajtó	+		+		10 000
Buprestidae	Díszbogárfélék családja					
<i>Acmaeoderella mimonti</i>	homoki zömökdíszbogár	+		+		5000
<i>Dicerca aenea</i>	nyárfadíszbogár	+		+		10 000
<i>Poecilonota variolosa</i>	szeplős díszbogár	+		+		10 000
Cucujidae	Lapbogárfélék családja					
<i>Cucujus cinnaberinus</i>	skarlátbogár	+	+	+		5000
Meloidae	Hólyaghúzófélék családja					
<i>Hycleus tenerus</i>	kis hólyaghúzó	+		+		5000
<i>Meloe cicatricosus</i>	óriásnünüke	+			+	10 000
<i>Mylabris pannonica</i>	pannon hólyaghúzó	+			+	5000
<i>Stenoria apicalis</i>	keskenyfedős élösdibogár	+		+		10 000
Rhipiphoridae	Darázbogárfélék családja					
<i>Macrosiagon bimaculata</i>	sarkantyús darázbogár	+		+		50 000
Cerambycidae	Cincérfélék családja					
<i>Aegosoma scabricorne</i>	diófacincér	+		+		5000
<i>Aromia moschata</i>	pézsmacincér	+			+	5000
<i>Calamobius filum</i>	hosszúcsápú szalmacincér	+		+		5000
<i>Cerambyx cerdo</i>	nagy hőscincér	+	+	+		50 000
<i>Cerambyx scopolii</i>	kis hőscincér	+		+		5000
<i>Pedestredorcadion decipiens</i>	homoki gyalgcincér	+		+		5000
<i>Purpuricenus budensis</i>	bíborcincér	+		+		5000
<i>Saperda perforata</i>	díszes nyárfacincér	+		+		10 000
<i>Semanotus ruscicus</i>	borókacincér	+		+		5000
<i>Theophilea subcylindricollis</i>	hengeres szalmacincér	+		+	+	5000
<i>Trichoferus pallidus</i>	sápadt éjcincér	+		+		5000
Curculionidae	Ormányosbogár-félék családja					
<i>Gasterocercus depressirostris</i>	laposorrú ormányos	+		+		10 000
<i>Herpes porcellus</i>	bütyköshátú ormányos	+		+		50 000

A Natura 2000 jelölőfajok

Carabus hungaricus Fabricius, 1792 (futóbogárfélék – Carabidae) – magyar futrinka (1. ábra) – Magyarországon a legtöbb előfordulási adata a Duna–Tisza köze, a Pesti-síkság és a Nyírség homokterületeire esik. Előfordul továbbá a Budai-hegységben, a Gerecsében, a Keleti-Bakonyban, a Mezőföldön és a Kisalföldön is. Alighanem a táborfalvai lőtérén él a legerősebb magyarországi állománya; ennek monitorozási programjáról BÉRCES és mtsai (2018) számolnak be. A hazai *Carabus*-fajok közül a leginkább szárazságkedvelő. Fátlan területeken, így homoki gyepekben, helyenként löszgyepeken és dolomit vagy mészkő alapközetű sziklagyepekben és lejtősztyepeken fordul elő. Megtaláltuk azonban a dabasi kiszáradó lápréteken is; ott más *Carabus*-fajok társaságában fordul elő, a száraz homoki gyepeken azonban ez az egyetlen *Carabus*-faj. Legnagyobb egyedszámban nyár végén és ősszel (augusztus közepétől október közepéig) látható; ilyenkor zajlik a párzás, a peterakás és a lárvák kikelése. A lárvák áttelelnek, de az imágók egy része is túléli a telet, ezért magyar futrinkákat kisebb számban tavasszal és nyár elején is találni. Éjszakai ragadozó, nappal a talajba ássa magát, vagy a talajon fekvő tárgyak alá húzódik. Meleg, párás őszi napokon azonban nappal is aktív lehet (BÉRCES és mtsai 2014).

Bolbelasmus unicornis (Schränk, 1789) (álganéjtúró-félék – Geotrupidae) – szarvas álganéjtúró (7. ábra) – Magyarországon szórványosan fordul elő a síkságtól az alacsonyabb hegyvidékekig. Legtöbb adata a Dunántúl keleti feléből, a Gödöllői-dombságból és a Duna–Tisza köze északi feléből ismert. Nagyon elvétve került elő az Északi-középhegységből és a Tiszántúlról. Föld alatti gombák (például *Glomus macrocarpus*, *Terfezia terfezioides*, *Tuber*-fajok) termőtestében fejlődik. Megérzi az akár 40–50 centiméteres mélységben lévő gomba felszínre szivárgó illatát, ahová 8–10 milliméter széles függőleges járatot ás. A nőstény egy gombára csupán egyetlen petét helyez. A lárvák a tél folyamán kifejlődnek, de az imágók csak tavasszal és nyáron bújnak elő; szürkületkor alacsonyan repülnek, és csak rövid ideig tartózkodnak a talajfelszín felett ezért nem könnyű kimutatni a jelenlétét (MERKL 2014a).

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (lapbogárfélék – Cucujidae) – skarlátbogár (8. ábra) – Magyarországon általánosan elterjedt a hegyvidéki üde és száraz erdőktől a síksági puhafaligetekig (leggyakoribb az utóbbi társulásokban), de nyár- és fenyőtelepítésekben is elfordul. Lárvája olyan elhalt törzsekben fejlődik, amelyek kérge laza, de még nem vált le, és az alatta lévő faanyag nem túl száraz. Rövid életű imágója ugyanezen törzsek szárazabb részeiben telel, illetve tavasszal ezek körül rajzik (MERKL 2014b).



1–6. ábrák. Futrinkák a Turjánvidék déli részéről. 1 = magyar futrinka (*Carabus hungaricus*);
2 = érdes futrinka (*Carabus scabriusculus*); 3 = ragyás futrinka (*Carabus cancellatus*);
4 = selymes futrinka (*Carabus convexus*); 5 = szemcsés futrinka (*Carabus granulatus*);
6 = kék futrinka (*Carabus violaceus*) (fotók: Retezár Imre)

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (cincérfélék – Cerambycidae) – nagy hőscincér (9. ábra) – Magyarország idős tölgyeseiben általánosan elterjedt. Parkokban, fáslegelőkön, tölgyfasorokban is előfordul. Valamennyi hazai tölgyfajban megtelepedhet. A lárvák az élő és az elhalt farész határán kezdenek rágni, de később az élő részben fejlődnek. Egy-egy nagy fában több generációja is kifejlődhet, ami végül a fa pusztulásához vezet. A megtámadott, de még élő fán a kirepülőnyílások jelzik a faj jelenlétét; az elpusztult törzseken a kéreg lehullása után láthatóvá válnak a lárvák hatalmas, kanyargós járatai. Az imágók este rajzanak a megfelelő fák körül (HEGYESSY és MERKL 2014). A lőtér egyik tölgyes állományában boroscsapdával fogott egyetlen példánya jelzi a jelenlétét a vizsgált területen. Valószínűleg más tölgyesekben is előfordul, de azért kijelenthető, hogy a lőtéren (és az egész Homokhátságon) nincsenek feltűnően erős állományai.



7. ábra. Szarvas álganéjtúró (*Bolbelasmus unicornis*) (fotó: Németh Tamás)



8. ábra. Skarlátbogár (*Cucujus cinnaberinus*) (fotó: Németh Tamás)



9. ábra. Nagy hőscincér (*Cerambyx cerdo*) (fotó: Szőke Viktória)



10. ábra. Nagy aknásfutó (*Acinopus ammophilus*) (fotó: Németh Tamás)

Homoki gyepek fajai


Acinopus ammophilus Dejean, 1829 (futóbogárfélék – Carabidae) – nagy aknásfutó (10. ábra) – Magyarországon nagyon kevés adata ismert az Alföldről. Az imágó a homokos területeken alkonyatkor és éjszaka a talajon mozog. A talajba ferdén lefutó, akár 50 cm hosszú aknát ás, nappal abban tartózkodik. Éjjel oda lehordja a sarlós lucerna (*Medicago falcata*) termését, és azt fogyasztja; aknája bejáratát a kihordott és szétszórt terméshéjakról lehet felismerni. Hogy miért kerül elő nagyon ritkán, arra magyarázatot ad éjszakai életmódja, illetve az, hogy a szokásos módszerekkel, melyekkel nappal is lehet futóbogarakat gyűjteni – vagyis fücsomók szétszedésével, tölevelek, kövek, fadarabok felemelésével – nem lehet megtalálni. Éjszakai lámpázással sem gyűjthető. Valószínűleg azonban a megfelelő élőhelyeken korántsem annyira ritka, erre következtethetünk abból, hogy a táborfalvai lőtéren néha több tucat egyedét figyelték meg éjszaka, illetve jól felismerhető maradványait szétszórtan többfelé megtaláltuk a homokos utakon, 2008 szeptemberében különösen nagy számban.

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 (futóbogárfélék – Carabidae) – öves cicindéla (13. ábra) – Magyarország homokos vidékein országszerte elterjedt, kivéve a Nyugat-Dunántúlt. Nyílt homoki gyepekben a leggyakoribb hazai cicindéla-faj. Tavasztól őszi napos időben igen gyorsan repül vagy szalad a majdnem növényzetmentes talajfelszínen. Ragadozó. Lárvája a homokba vájt csövekben él.

Cicindela soluta pannonica Mandl, 1936 (futóbogárfélék – Carabidae) – pusztai cicindéla (14. ábra) – Magyarország homokos vidékein szórványos, főleg a Duna–Tisza közén. Ritkább, mint az öves cicindéla (*Cicindela hybrida*), de helyenként a két faj közösen fordul elő. Kora tavasztól napos időben gyorsan repül vagy szalad a szinte növényzetmentes talajfelszínen. Ragadozó. Lárvája a homokba vájt csövekben él.

Harpalus flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783) (futóbogárfélék – Carabidae) – rőt lomhafutó – Szórványos adatai ismertek Magyarország homokos talajú vidékeiről; a Duna–Tisza közén helyenként nem ritka. A nyílt homoki gyepekben tavasszal, nyár elején és ősszel éjszaka aktív. Nappal a talajba ássa magát, vagy tereptárgyak alá rejtőzik. Növényevő.

Pangus scaritides (Sturm, 1818) (futóbogárfélék – Carabidae) – vastagfejű lomhafutó – Magyarországon igen ritka, tíznél kevesebb előfordulási adata ismert, leginkább az Alföld száraz gyepjeiből (NAGY és mtsai 2004). A bécsi Duna-csatorna melletti gyepekben 1993-ban nagyobb mennyiségben gyűjtötték talajcsapdákkal, és megállapították, hogy az imágók április közepétől szeptember közepéig aktívak; ezen az időszakon belül két aktivitásmaximum



11–14. ábrák. Cicindélák a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótérrel. 11 = sziki cicindéla (*Calomera littoralis nemoralis*): több rajzelemsora van, mint a következő fajoknak, a középsők kerek foltokra szakadozottak; 12 = mezei cicindéla (*Cicindela campestris*): hátoldala fűzöld alapszínű; 13 = öves cicindéla (*Cicindela hybrida*): vállfoltja összekötött a mögötte lévő folttal, szárnyfedői tövén nincsenek sörték; 14 = pusztai cicindéla (*Cicindela soluta pannonica*): vállfoltja külön áll, szárnyfedői tövén sörték vannak (fotók: Németh Tamás)

jelentkezik: június elején és augusztus elején (SCHWEINSCHWALLER és ZETTEL 1995).

Exaesiopus grossipes (Marseul, 1855) (sutabogárfélék – Histeridae) – homoki sutabogár – Magyarországon nagyon ritka, az ország homokterületeiről tíznél kevesebb lelőhelye ismert. Életmódja ismeretlen; valószínűleg a talajban vagy korhadék alatt élő légylárvákkal táplálkozik. A sutabogarakhoz mérten is feltűnően széles ásólábai arra utalnak, hogy életét főleg a talajban tölti, ahonnan ritkán jön a felszínre; valószínűleg ez ad magyarázatot arra, hogy miért kerül elő nagyon ritkán.

Nicrophorus vestigator (Herschel, 1807) (dögbogárfélék – Silphidae) – szőrösnyakú temetőbogár – Csak néhány adata ismert Magyarországról. Az imágó tetemeken fejlődő légylárvák ragadozója. Lárvai a szülők által elásott kisebb gerincesek tetemeiben fejlődnek. A nagy elterjedésű, gyakori, társulásközömbös

– de inkább erdei – temetőbogaraktól (*Nicrophorus vespillo*, *N. vespilloides*, *N. interruptus*, *N. humator*) eltérően ez a faj kifejezetten jellemző a homoki társulásokra (JAKUBEC és RŮŽIČKA 2015).

Leiodes ciliaris (W. L. E. Schmidt, 1841) (pecebogárfélék – Leiodidae) – pillás gombabogárka – Az európai tengerpartok homokdűnéin (főleg Európa északi felén) elterjedt faj, mely a kontinens belsejében sokkal ritkább. A Duna–Tisza közének homokvidékein szórványosan fordul elő, helyenként nagy egyedszámban. Tipikus faja a homoki gyepeknek. Lárvjának életmódja nem ismert, de valószínűleg gombák föld alatti részeiben fejlődik. Az imágók nyáron alkonyatkor rajzanak, olyankor fűhálózással és autóshálózással gyűjthetők, de talajcsapdába is bekerülhetnek.

Leiodes rubiginosa (W. L. E. Schmidt, 1841) (pecebogárfélék – Leiodidae) – homoki gombabogárka – Magyarországon az Alföld és a dombvidékek homokos helyein szórványosan fordul elő. Lárvjának életmódja nem ismert, de valószínűleg gombák föld alatti részeiben fejlődik. Az imágók nyáron alkonyatkor rajzanak, és az előző fajhoz hasonlóan – többnyire azzal együtt – gyűjthetők.

Zeadolopus latipes (Erichson, 1845) (pecebogárfélék – Leiodidae) – lapátlábú gombabogárka – Magyarországon a Duna–Tisza közéről (északon Sződig) és a Gödöllői-dombságból került elő. Lárvjának életmódja nem ismert, de valószínűleg gombák föld alatti részeiben fejlődik. Az imágók tavasz végén, nyár elején homoki gyepek felett alkonyatkor rajzanak. Az „autóshálózás előtti” időkből (2000 előttről) tíznél kevesebb lelőhelye volt ismert az országban, azóta azonban fogásai megszorodtak – ahogy sok más homoki bogárfaj esetében is.

Glaresis rufa Erichson, 1848 (csorványfélék – Glaresidae) – vörhenyes csorvány – A ganéjtúrókkal rokonságban lévő, de azoktól különálló, kis fajszerű család egyetlen európai tagja. Magyarországon az Alföld homoki gyepeiben fordul elő, de a Dunántúlon előkerült az Által-ér völgyének homokos élőhelyén is (Kutasi Csaba szóbeli közlése, 2017). Nálunk aránylag sok lelőhelye ismert, de tőlünk nyugatra és északra (Csehorszáig és Lengyelorszáig) már nagyon szórványos (SABOL 2012). A kiskunsági homokpuszták jellegzetes bogara. Életmódja szinte ismeretlen. Az imágó májustól júliusig alkonyatkor repül, ilyenkor autóshálózással vagy még szürkületkor bekapcsolt fénycsapdákkal könnyen kimutatható; néha nagy számban jelentkezik. Lárva talán korhadó gyökerekben fejlődik.

Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781) (homoktúróbogár-félék – Ochodaeidae) – alkonyati homoktúróbogár – Magyarországon az Alföld és a dombvidékek fátlan vagy ligetes területein szórványosan fordul elő. Lárvjának életmódja nem ismert, de valószínűleg gyepek talajában fejlődik. Imágói tavasszal és nyár elején alkonyatkor rajzanak, fényre is repülnek.

Trox eversmannii Krynicki, 1801 (irhabogárfélék – Trogidae) – homoki irhabogár – Magyarországon sík és dombvidékeken szórványosan terjedt el. Legtöbb adata a Duna–Tisza közéről származik (NÁDAI és MERKL 2004). Állati maradványokon található, leginkább rókák kotorékaiban. A homokos területeket részesíti előnyben, de löszgyepekben is előfordul. Nappal aktív, fényre ritkán repül.

Anoxia pilosa (Fabricius, 1792) (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – pusztai cserebogár – Magyarországon az Alföld homokos területein elterjedt, észak felé az esztergomi repülőtérig. Pajorja a talajban fejlődik, elhalt növényi részekkel táplálkozik. Imágója júniusban délután és alkonyatkor rajzik. A nőtények a talajon tartózkodnak, a hímek alacsonyan repülve keresik őket.

Diastictus vulneratus (Sturm, 1805) (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – kétgödrös trágyabogár – Magyarországon az Alföld homokos területeinek ritkasága. Bár rendszertani értelemben a ganéjtúrók közé tartozik, nem trágyafogyasztó, hanem a laza homokos talajban, elhalt gyökereken vagy mohapárnák alatt fejlődik. Röpképtelen, ezért is találni ritkán, hiszen a két következő fajjal ellentétben autóshálóval nem gyűjthető.

Psammodius asper (Fabricius, 1775) (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – homoktúró trágyabogár – Magyarországon szórványosan fordul elő az Alföld homokos területein, valamint háborítatlan homokos folyópartokon. Nem trágyafogyasztó, hanem a laza homokos talajban, elhalt gyökereken fejlődik. Imágói naplementekor repülnek.

Psammodius pierottii Pittino, 1979 (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – sörtesarcú trágyabogár – Magyarországon néhány előfordulási adata ismert az Alföld homokos területein. Életmódja az előző fajéhoz hasonló. Országos viszonylatban ritkább annál, a lőtéren azonban sokkal gyakoribbnak bizonyult.

Scarabaeus typhon (Fischer von Waldheim, 1823) (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – óriás-galacsinhajtó – Magyarországon a Duna–Tisza köze és a Tengelici-homokvidék (MEDVEGY és MUSKOVITS 1994, SOMAY 2007) homoki legelőinek lakója, észak felé elterjedt Vácegresig. Az 1990-es évek közepén szinte kampányszerűen keresték, ezért nagy számban találták a lőtéren, elsősorban friss lótrágyán, juhtrágyán és éjszakai lámpázással. Imágója alkonyatkor és éjszaka aktív. Olyankor repülve keresi fel a patások (főleg ló és juh) trágyáját, ebből galacsinokat készít, azokat elgörgeti, és alkalmas helyen elássa. Fogási adatainak csökkenése a kevésbé intenzív kereséssel is magyarázható, de állományának zsugorodását leginkább az okozhatta, hogy 2004-ben megszüntették a juhtartást a lőtér homoki gyepein. Mivel azonban a környéken ma is folyik legeltetés, visszatelepülésére van esély.

Acmaeoderella mimonti (Boieldieu, 1865) (díszbogárfélék – Buprestidae) – homoki zömökdíszbogár (15. ábra) – Magyarországon a Duna–Tisza közén és a

tolnai homokvidéken fordul elő. Lárvai a homoki gyepeken növvő különféle cserjék ágaiban fejlődnek. Imágói május végétől augusztus elejéig fészkesvirágzatúak – főleg a homoki szalmagyopár (*Helichrysum arenarium*), a cickafark (*Achillea* spp.) és a mezei iringó (*Eryngium campestre*) – virágzatán tartózkodnak.

Sphenoptera cauta Jakovlev, 1904 (díszbogárfélék – Buprestidae) – apró gyalogdíszbogár – Magyarországon az Alföldön és a dombvidékeken szórványosan fordul elő, sokkal ritkább, mint a következő faj. Lárvájának tápnövényeként az aszúszegefűt (*Petrorhagia prolifera*) említik (MUSKOVITS és HEGYESSY 2002, *S. petriceki* néven). Az imágók nyáron a tápnövényükön tartózkodnak.

Sphenoptera substriata (Fabricius, 1798) (díszbogárfélék – Buprestidae) – sávós gyalogdíszbogár (41. ábra) – Magyarországon az Alföldön és a dombvidékeken szórványosan fordul elő (MUSKOVITS és HEGYESSY 2002). Lárvája szegfűfajok (*Dianthus* spp.) – a táborfalvai lőtérén a kései szegfű (*Dianthus serotinus*) – gyökerében fejlődik 1–2 évig. Az imágók nyáron a tápnövényükön tartózkodnak.

Phradonoma villosulum (Duftschmid, 1825) (porvafélék – Dermestidae) – pusztai porva – Magyarországon az Alföld homokos területein és a közép-hegységek lejtősztyeppjein elterjedt. Imágója nyár elején főleg kutyatejfajok (*Euphorbia* spp.) virágzatán tartózkodik, néha tömegesen. Lárvájának életmódja ismeretlen.

Dignomus nitidus (Duftschmid, 1825) (álszűfélék – Ptinidae) – fényes tolvajbogár (16. ábra) – Magyarországon néhány lelőhelye ismert száraz, meleg élőhelyekről (homokpusztákról és alacsonyabb hegyvidéki, dombvidéki lejtősztyeppokról). A talajon lévő növényi korhadékban fejlődik; a röpképtelen nőtények állandóan ott tartózkodnak, a röpképes hímek alkonyatkor rajzanak. Életmódja eléggé eltér a többi tolvajbogárétól, mivel azok többsége erdőlakó; elhalt fák kérge alatt, odvakban, avarban található, illetve településeken



15. ábra. Homoki zömökdíszbogár (*Acmaoderella mimonti*) (fotó: Németh Tamás)



16. ábra. Fényes tolvajbogár (*Dignomus nitidus*) (fotó: Németh Tamás)

(fáskamrákban, éléskamrákban, istállóban, ólakban) is előfordulnak.

Cardiophorus asellus Erichson, 1840 (pattanóbogár-félék – Elateridae) – homoki szívespattanó – Magyarországon a homokterületekről ismert néhány adata, a legtöbb a Homokhátságról. Lárvája homokos talajban fejlődik, imágói nyár elején a talajon és az alacsony növényzeten tartózkodnak.

Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) (pattanóbogár-félék – Elateridae)

– zsurló-szívespattanó – Magyarország homokos talajú területein helyenként nem ritka. Legtöbb adata a Homokhátságról származik. Lárvája a talajban fejlődik, imágói kora tavasszal a talajon és az alacsony növényzeten tartózkodnak.

Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840) (pattanóbogár-félék – Elateridae) – pusztai szívespattanó (17. ábra) – A homoki gyepekre leginkább jellemző többi pattanófajhoz (*Cardiophorus asellus*, *Dicronychus equiseti*, *D. equisetoides*, *Cidnopus ruzenae*) képest jóval később, általában május végétől június végéig rajzik (a többiek már április elején megjelennek). Sokkal inkább ragaszkodik a jó állapotú, zavartalan gyepekhez (az említett többi faj zavartabb homoki gyepekben is felbukkanhat).

Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (katicabogár-félék – Coccinellidae) – hangyáskatica (18. ábra) – Magyarországon az Alföldön, illetve a domb- és hegyvidékek délies lejtőin szórványosan terjedt el. Száraz, meleg élőhelyeken a gypszintben tartózkodik, általában *Formica*-fajok bolyai körül. A lőtéren egyes években csak néhány egyede kerül elő, de néha – például 2011-ben – tömegesen jelentkezik. A táborfalvai lőtér egyike a faj kevés számú biztos hazai lelőhelyeinek.

Hyperaspis erythrocephala (Fabricius, 1787) (katicabogár-félék – Coccinellidae) – homoki szerezsenbőde – Magyarországon az Alföldön szórványosan fordul elő. Fátlan homoki gyepek jellemző katicabogara.




17. ábra. Pusztai szívespattanó (*Paracardiophorus musculus*)
(fotó: Németh Tamás)



18. ábra. Hangyáskatica (*Coccinella magnifica*). Nagyon hasonlít a hétpettyes katicára (*Coccinella septempunctata*), de színe teltebb vörös, és foltjai nagyobbak
(fotó: Rahmé Nikola)



19. ábra. Sarkantyús darázsbogár (*Macrosiagon bimaculata*)
(fotó: Németh Tamás)



20. ábra. Sarkantyús darázsbogár (*Macrosiagon bimaculata*) portréja
(fotó: Rahmé Nikola)



21. ábra. Pikkelyes gyászbogár (*Leichenium pictum*) (fotó: Rahmé Nikola)



22. ábra. Homoki gyalogcincér (*Pedestredorcadion decipiens*), hím
(fotó: Németh Tamás)



23. ábra. Homoki gyalogcincér (*Pedestredorcadion decipiens*), nőstény
(fotó: Németh Tamás)

Áttelelő egyedei tavasszal, az új nemzedék egyedei a nyár második felében találhatók a növényzeten. Lárvája pajzstetvekkkel táplálkozik.

Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777) (katicabogár-félék – Coccinellidae) – egyszínű szerecsenkata – Az Alföld homokos területein és a középhegységek száraz, meleg lejtősztyeppjein és sziklagyepjeiben elterjedt, néha nagy számban fordul elő. Késő tavasztól kora őszig a gyepszintben tartózkodik. Levél- és pajzstetvekkkel táplálkozik.

Macrosiagon bimaculata (Fabricius, 1787) (darázbogárfélék – Ripiphoridae) – sarkantyús darázbogár (19–20. ábrák) – Magyarországi elterjedése néhány elszigetelt foltra korlátozódik. Az 1950-es évek óta csak a Homokhátság egyes pontjairól (Fülöpháza, Ágasegyháza, Kunpeszér és a táborfalvai lőtér), valamint a tolnai homokvidékről (Paks) került elő. Lelőhelyadatait SZALÓKI és mtsai (2012) dolgozata foglalja össze. Az ott közöltekhez képest a dabasi Nagy robbantó újnak számít. A közlemény megjelenése óta a vizsgált területen kívül, de ahhoz közel újabb lelőhelyeken is előkerült, ezek az alábbiak: Tatárszentgyörgy, Borovicskás, 2015.VII.12., 2015.VII.31., MO & SD; Tatárszentgyörgy, Vitéz sori homokbuckák, 2013.VII.7., MO. Száraz homoki gyepekben él, megjelenése rapszodikus: egyes években és helyeken gyakori lehet, máskor és másutt látszólag évekre eltűnhet. Lárvai magányos redősszárnyú darazsak és szabóméhek fészkeiben fejlődnek. Rövid életű imágói csaknem mindig a mezei iringó virágzatán tartózkodnak, ahol nektárral táplálkoznak. Rajzása e növény virágzásának kezdetére (július) esik.

Hycleus tenerus (Germar, 1834) (hólyaghúzófélék – Meloidae) – kis hólyaghúzó – A pannon régió endemikus faja. Száraz gyepekben, legelőkön, főleg homokos talajon szórványosan elterjedt az ország alacsonyabb fekvésű vidékein, leginkább az Alföldön. Elvértve dombsági és hegylábi tájak fátlan lejtőin, legelőin is megtalálható. Az utóbbi 20 évben mindenütt – a lőtéren is – viszszaszorulni látszik. Lárvája nem ismert, de valószínűleg más *Hycleus*-fajokhoz hasonlóan sáskák petecsomóiban fejlődik. A kifejlett bogarak június–júliusban virágokon tartózkodnak.

Mylabris crocata (Pallas, 1781) (hólyaghúzófélék – Meloidae) – pettyes hólyaghúzó – Magyarországon az Alföld homokterületeinek szórványos faja, de néha nagy számban fordul elő. Lárvai sáskák petecsomóiban fejlődnek. Az imágók nyár közepén jelennek meg, és virágokat látogatnak. Egy alkalommal nagy mennyiségben találtuk virágzó homoki baltacimen (*Onobrychis arenaria*).

Stenoria apicalis (Latreille, 1804) (hólyaghúzófélék – Meloidae) – keskenyfedős élősdibogár – Magyarországon csak a Homokhátság néhány pontjáról ismert (Fülöpháza, Ágasegyháza, Kéleshalom, Dabas, Táborfalva, Tatárszentgyörgy). A természetes állapotú homokpuszták jellemző faja. Lárvai magányos

méhek fészkeiben fejlődnek. Imágói a sarkantyús darázsbogáréhoz hasonlóan a mezei iringó virágzatán tartózkodnak, de annál később (július végén–augusztusban) jelennek meg, bár a két faj rajzási időszakában lehet némi átfedés.

Zonitis flava (Fabricius, 1775) (hólyaghúzófélék – Meloidae) – rőt élösdi-bogár – Magyarországon az Alföldön és a dombvidékek szárazabb területein szórványosan fordul elő. Lárvai földben fejlődő hártácsszárnyúak fészkeiben élnek. Az imágók nyár közepén jelennek meg, és virágokat látogatnak.

Gonocephalum pygmaeum (Steven, 1829) (gyászbogárfélék – Tenebrionidae) – homoki gyászbogár – Magyarországon az Alföld homokos talajú területein elterjedt, de csak szórványos adatai ismertek. Lárvája a talajban, növényi korhadékban fejlődik. Imágói tavasszal és nyár elején napos időben a talajfelszínen közlekednek.

Leichenum pictum (Fabricius, 1801) (gyászbogárfélék – Tenebrionidae) – pikkelyes gyászbogár (21. ábra) – Az Alföld homokos talajú területein elterjedt, de csak szórványos adatai ismertek. Nappal a homok felületén összegyűlt növényi törmelékben vagy növények tölevélrózsái alatt tartózkodik; éjjel a talajfelszínen mászkál. Különböző színű pikkelyek alkotta mintázata annyira hasonlít a homokéhoz, hogy még a mozgó állatot is nehéz észrevenni.

Anthicus bimaculatus (Illiger, 1801) (füregbogárfélék – Anthicidae) – két-foltos füregbogár – A legritkább füregbogárfajok egyike Magyarországon, bár az autóshálózás alkalmazásával ismert lelőhelyei kissé megsaporodtak. Legtöbb adata a Homokhátság területéről való. Nappal a homoki gyepek talaján tartózkodik. Naplementekor repülve rajzik.

Mecynotarsus serricornis (Panzer, 1796) (füregbogárfélék – Anthicidae) – kis nyakszarvúbogár – Magyarországon a homokos területekről ismertek szórványos adatai. Legtöbb adata a Homokhátságra esik. Nappal a homoki gyepekben növényi korhadék alatt tartózkodik, ahová az előtorának szarvszerű nyúlványával ássa be magát. Naplementekor repülve rajzik.

Pedestredorcadion decipiens (Germar, 1824) (cincérfélék – Cerambycidae) – homoki gyalogcincér (22–23. ábrák) – A Duna–Tisza köze nyílt homoki gyepeiben honos, észak felé Budapestig és a szentmártonkátai volt katonai lőtérig. Nyílt homoki gyepekben más gyalogcincérfaj gyakorlatilag nem fordul elő. Lárvját a magyar csenkesz (*Festuca vaginata*) gyökérzetéből mutatták ki (Kovács és mtsai 2000). Imágói kora tavasszal, néha már március közepén megjelennek (ez a leghamarabb rajzó hazai gyalogcincérfaj), és április végére nagy részük már el is tűnik. Napos időben párt keresve a talajon szaladgálnak, éjszaka és borús időben elbújnak.

Chrysomela collaris Linnaeus, 1758 (levélbogárfélék – Chrysomelidae) – szegettnyakú fűzlevelész – Magyarországon az Alföld homokos területein

szórványosan terjedt el. Homoki gyepek lakója. Tápnövénye a serevényfűz (*Salix rosmarinifolia*), mely elsősorban a buckaközi mélyedésekben fordul elő. A lárvá és az imágó is a növény leveleit fogyasztja, az áttelelt imágók áprilisban, a következő nemzedék imágói nyáron jelennek meg.

Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792 (levélbogárfélék – Chrysomelidae) – ékes zömökbogár – Magyarországon az Alföld homokos területein szórványosan terjedt el. Nyílt és zárt homoki gyepek lakója. Lárvája növényi korhadékban fejlődik, imágói a nyár második felében (július végétől) sárga fészkesvirágzatúakon tartózkodnak, ahol a nyeltes virágokat fogyasztják (SASSI 2014).

Herpes porcellus (Lacordaire, 1863) (ormányosbogár-félék – Curculionidae) – büttyköshátú ormányos (24. ábra) – Magyarországon csak a Homokhát-ságról ismert; az utóbbi évekig a táborfalvai lőtérrel származott a Magyarországon valaha talált példányok többsége. Célzott kereséssel, 2016 óta azonban a korábban ismerteknél jóval több lelőhelyről sikerült kimutatni. Tápnövényei a nyílt vagy félig zárt, száraz homoki gyepekben élő érdeslevelűek, leginkább a báránypirosító (*Alkanna tinctoria*). Pontos elterjedését, életmódját Szénási Valentin készülő közleménye mutatja majd be.

Prisistus obsoletus (Germar, 1824) (ormányosbogár-félék – Curculionidae) – bársonyos ormányos – Magyarországon főleg dunántúli száraz hegy- és dombvidéki lejtőkről ismert; ritka. Az Alföldön csak a Duna–Tisza közéről került elő. Tápnövénye ismeretlen. Imágói a gyepszínt fűhálózhatók.

Kötött talajú gyepek fajai

Carabus scabriusculus Olivier, 1795 (futóbogárfélék – Carabidae) – érdes futrinka (2. ábra) – A faj „törzsalakja” (nominotipikus alfaja) a Dunántúli- és az Északi-középhegység számos pontjáról előkerült, de vannak adatai a Gödöllői-dombságból és a Duna–Tisza közéről is. A Tiszántúl keleti részén élő állományát más alfajnak tartják. A magyar futrinka (*Carabus hungaricus*) után a leginkább szárazságtűrő *Carabus*-faj. Főleg hegylábi löszgyepek, kötött talajú rétek, lejtősztyepppek lakója. Éjszakai ragadozó.

Calomera littoralis nemoralis (Olivier, 1790) (futóbogárfélék – Carabidae) – sziki cicindéla (11. ábra) – Magyarországon főleg az Alföld szikes, de néha homokos területein található. Elég ritka, bár helyenként nagyobb számban is előfordulhat. Tavasztól őszi napos időben igen gyorsan röpköd vagy szalad a talajfelszínen. A legtöbb hazai homokfutrinkától eltérően azonban éjszaka is repül. Ragadozó. Lárvája a homokba vajt csövekben él.

Cicindela campestris Linnaeus, 1758 (futóbogárfélék – Carabidae) – mezei cicindéla (12. ábra) – Magyarországon a leggyakoribb és legáltalánosabban



24. ábra. Bütyköshátú ormányos (*Herpes porcellus*) (fotó: Németh Tamás)



25. ábra. Magyar virágbogár (*Protaetia ungarica*, balra) és sávornyakú púderbarkó (*Larinus iacea*, jobbra) (fotó: Kalotás Zsolt)

elterjedt cicindéla faj. Fátlan gyepekben országszerte előfordul, de a többi hazai fajtól eltérően nem a növényzetmentes, hanem a rövid fűvel borított területeket kedveli, ilyen helyeken napos időben gyorsan repül vagy szalad. Tavasztól nyár elejéig a leggyakoribb. Ragadozó. Lárvája a homokba vájt csövekben él.

Protaetia ungarica (Herbst, 1790) (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – magyar virágbogár (25. ábra) – Magyarországon az Alföldön és a dombvidékeken elterjedt. Lárvája kötött talajú területeken a talajban, néha hangyafészkekben fejlődik. Imágója fészkesvirágzatúak, leginkább bogáncsfajok (*Carduus* spp.) virágzatának alsó részén tartózkodik. Minden más hazai virágbogárnál kevesebbet repül. 2015-ben a Dabasi Turjános melletti szárazabb gyepon virágzó mezei aszaton (*Cirsium arvense*) csapatosan jelentkezett.

Protapalochrus flavolimbatus (Mulsant et Rey, 1853) (bibircsesbogár-félék – Malachiidae) – déli bibircsesbogár – E mediterrán elterjedésű bogárfajt 2001-ben és 2002-ben Akasztón gyűjtött példányok alapján 2005-ben közölték a magyar faunára újként (SZALÓKI és MERKL 2005). Azóta a Duna–Tisza közén és a Dél-Tiszántúlon néhány további előfordulási helye lett ismert, sőt a Mezőföldről is előkerült (Alcsútdoboz, Perkáta). Kötött talajú, nedves, többnyire kisé szikesedő helyeken fordul elő.

Mylabris pannonica Kaszab, 1956 (hólyaghúzófélék – Meloidae) – pannon hólyaghúzó – A pannon régió endemikus fajaként írták le, azóta előkerült a Balkán-félszigetről is, ezeket a közléseket azonban szükséges lenne megerősíteni. A szikesek jellemző faja, az ilyen élőhelyeken gyakran tömeges. Ritkán azonban nem kifejezetten szikes, de azért kötött talajú helyeken is felbukkan, ezt igazolja a Dabasi Turjánosból származó egyetlen fogása is még 1979-ből. Lárvája nem ismert, de valószínűleg más *Mylabris*-fajokhoz hasonlóan sáskák petecsomóiban fejlődik. A kifejlett bogarak júniustól augusztusig virágokon tartózkodnak.

Calamobius filum (Rossi, 1790) (cincérfélék – Cerambycidae) – hosszú-csapú szalmacincér – Az 1970-es évek előtt Magyarországon nagy ritkaságnak számított. Azóta viszont dél felől terjeszkedve alaposan elszaporodott, és kaszálókon, erdőirtásokon, száraz és nedves réteken a magasabb hegyvidékek kivételével szinte mindenütt igen gyakori. Lárváit egy évig fejlődnek különféle pázsitfűvek – például csomós ebír (*Dactylis glomerata*), siska nádtippán (*Calamagrostis epigeios*), franciaperje (*Arrhenatherum elatius*) – szárában (KOVÁCS és HEGYESSY 1995). Az imágók május–júniusban a fűvek szárán, általában fejjel lefelé tartózkodnak.

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 (cincérfélék – Cerambycidae) – hengeres szalmacincér – Magyarországon az 1980-as évekig – vagyis védetté nyilvánításáig – rendkívüli ritkaságnak számított (csak a Villányi-hegységből ismertük), azóta viszont látványosan elszaporodott, és terjeszkedni kezdett. Alacsonyabb vidékeken ma már az egész országban megtalálható, helyenként tömeges. Hazánkból kimutatott tápnövénye a közönséges tarackbúza (*Elymus repens*) (KOVÁCS és HEGYESSY 1995), de lárvája valószínűleg más pázsitfűvek szárában is fejlődik. A kifejlett bogár április végétől júliusig a lágyszárú növényzeten található.

Minyops variolosus (Fabricius, 1775) (ormányosbogár-félék – Curculionidae) – nyugati bordásormányos – Magyarországon szórványosan elterjedt a Dunántúlon, az Északi-középhegységben, illetve a Duna–Tisza közén; a Tiszántúlon a vikariáns keleti bordásormányos (*Minyops costalis* (Gyllenhal, 1834)) honos (MERKL és mtsai 2014). Kötött talajú gyepek (a táborfalvai lőtérén a kiszáradó láprétek) lakója. Lárvájának életmódja ismeretlen. Röpképtelen imágói nappal elrejtőznek, éjszaka a talajon mászkálnak.

Mogulones venedicus (J. Weise, 1879) (ormányosbogár-félék – Curculionidae) – metszettfogú nefelejcs-tarkaormányos – Magyarországon húsznál kevesebb lelőhelye ismert az ország középső részeiről. Nefelejcsfajok (*Myosotis* spp.) gyökerében fejlődik. Imágói a tápnövényükön tartózkodnak.

Fás társulások fajai

Carabus cancellatus Illiger, 1798 (futóbogárfélék – Carabidae) – ragyás futrinka (3. ábra) – A faj Magyarország nagy részén előfordul, a síkságtól a magasabb hegyvidékig. A *Carabus cancellatus adeptus* Kolbe, 1913 névvel önállónak tekintett alfaj a Pesti-síkságon és a Kiskunságban terjedt el. Az erősen száraz élőhelyeket kerüli, de a környezeti igényeit illetően kevésbé válogatós. Előfordul fátlan nedves réteken és zárt erdőkben is. A vizsgált terület kevésbé száraz részein a leggyakoribb *Carabus*-faj. Éjszakai ragadozó.

Carabus convexus Fabricius, 1775 (futóbogárfélék – Carabidae) – selymes futrinka (4. ábra) – Magyarország hegy- és dombvidéki erdeiben elterjedt, a síkságon ritkább. Duna–Tisza közti populációit *Carabus convexus kiskunensis* Ádám et Merkl, 1986 néven endemikus alfajként írták le, de a külföldi szakemberek jó része ezt nem fogadja el (ahogy a Magyarországról leírt *Carabus*-alfajok jelentős részét sem), és a törzsalak (*Carabus convexus convexus*) szinonimjának tekinti. Főleg erdőkben, erdőszegélyeken él, de sziklagyepekben és lejtősztyepeken is előfordul. Éjszakai ragadozó.

Carabus granulatus Linnaeus, 1758 (futóbogárfélék – Carabidae) – szemcsés futrinka (5. ábra) – Magyarországon az alacsonyabb fekvésű területeken, főleg a nedves talajú erdőkben (puhafaligetek, égerligetek) gyakori, de néha egyéb, nem túl száraz erdőkben is megtalálható. Éjszakai ragadozó. A telet laza fakéreg alatt csapatosan tölti. A hazai rovarászati szakirodalomban – és a természetvédelmi dokumentumokban is – a fajt „mezei futrinka” néven említik. Kódöböcz Viktor (szóbeli közlés, 2017) szerint azonban ez a név félrevezető, mert a „mezei” futrinka kifejezetten erdőlakó bogár, előfordulása „mezei” környezetben egyáltalán nem jellemző.

Carabus violaceus Linnaeus, 1758 (futóbogárfélék – Carabidae) – kék futrinka (6. ábra) – A faj a Dunától keletre terjedt el; a Duna–Tisza közén, az Északi-középhegységben és az Észak-Alföldön honos (a Tiszántúl nagy részén hiányzik). A Pesti-síkságon és a Kiskunságban élő állományokat *Carabus violaceus rakosiensis* Csiki, 1906 alfajnak tartják. Élőhelyi igényeit illetően nem válogatós, a ritkás alföldi erdőktől és nedves rétektől a magasabb hegyvidékek zárt erdőtársulásaiig sokfelé megtalálható, lakott területeken is. Éjszakai ragadozó.

Epierus comptus Erichson, 1834 (sutabogárfélék – Histeridae) – tojásdad erdei-sutabogár – Magyarországon főleg a Dunántúlon fordul elő, az Északi-középhegységben és az Alföldön sokkal ritkább. A Duna–Tisza közén Budapestről (Soroksár), Pusztavacsról, Ócsáról, Nagykörösről és Táborfalváról ismert. Idős erdők lakója; elhalt fák kérge alatt, néha csapatosan él. Imágója alkonyatkor repül.

Pseudepierus italicus (Paykull, 1811) (sutabogárfélék – Histeridae) – olasz erdei-sutabogár – Magyarországon eddig csak a Dunántúl néhány pontján találták. Táborfalva az első adata az Alföldről (a Dunától keletre). Idős erdőállományok és fáslegelők lakója; elhalt fák kérge alatt él. Imágója alkonyatkor repül.

Teretrius fabricii Mazur, 1792 (sutabogárfélék – Histeridae) – éji sutabogár – Magyarország alacsonyabb fekvésű területeiről szórványos lelőhelyei ismertek. Elhalt lombos fákban él, ahol légylárvákkal táplálkozik. A sutabogarak nagy többségével ellentétben éjszaka aktív; sötétedés után a holt fatörzseken mászkál, alkonyatkor repül.

Dorcus parallelipedus (Linnaeus, 1758) (szarvasbogárfélék – Lucanidae) – kis szarvasbogár – Magyarországon mindenütt megtalálható, ahol bármilyen fás növényzet tenyészik (csak azért tárgyaljuk ezen a helyen, mert védett faj). Lárvája erősen korhadt fában 2–3 évig fejlődik. Imágója tavasztól őszig főleg éjszaka mozog, nappal kéreg vagy fatörzsek alá húzódik.




26. ábra. Orrszarvú bogár (*Oryctes nasicornis*)
(fotó: Németh Tamás)

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – orrszarvú bogár (26. ábra) – Magyarországon általánosan elterjedt, főleg az alacsonyabb fekvésű területeken. Lárvája elhalt fák erősen korhadt föld alatti részeiben fejlődik. Imágója rövid életű, nem táplálkozik; június–júliusban éjszaka rajzik, legtöbbször fényforrásoknál figyelhető meg. A természetes élőhelyeken ugyan kissé visszaszorult, de mivel pajorjai sokféle lombos fa korhadékában, sőt fatelepeken és komposzthalmokban is kifejlődnek, lakott területeken is megél.

Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – pompás virágbogár (27. ábra) – Magyarország erdős vidékein mindenütt előfordul, a folyókat követő ligeterdőkben és más síksági nyárasokban különösen gyakori. Ahol a vizsgált területen boroscsapdákat alkalmaztunk, mindenütt megtaláltuk. Lárvája öreg fák odvaiban vagy az elhalt gesztből kialakult korhadékban fejlődik, és korhadékszemcsékből összeragasztott gubóban bábozódik. Az imágók meleg, napos időben magasan, a lombkorona szintjén repkednek, ezért viszonylag ritkán találkozunk velük. A bogár a fák kifolyó nedveivel táplálkozik; a lombkoronát ritkán hagyja el. (A rovtani szakirodalomban – és természetvédelmi dokumentumokban is – eddig legtöbbször az érvénytelen *aeruginosa* faji jelzővel említették.)

Protaetia affinis (Andersch, 1797) (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – smaragd zöld virágbogár (28. ábra) – Magyarországon főleg a hegy- és dombvidéki tölgyesek lakója, a síkságon ritka. Ritkább és szűkebb élőhelyigényű, mint a hozzá valamelyest hasonló pompás virágbogár, de az alföldi erdőkben állománya gyarapodni látszik. Ahol a vizsgált területen boroscsapdákat alkalmaztunk, mindenütt megtaláltuk. Idősebb fák odvaiban fejlődik, főleg tölgyfajokban, de fehér fűzben (*Salix alba*) és nyárban (*Populus* spp.) is. A kifejlett bogár általában



27–28. ábrák. Lombkoronában élő virágbogarak a Turjánvidék déli részéről. 27 = pompás virágbogár (*Protaetia speciosissima*) és 28 = smaragdzöld virágbogár (*Protaetia affinis*). A smaragdzöld virágbogár kisebb termetű, és szárnyfedőjén hátul sekély hosszanti mélyedés látható, erős pontozással, mely szabálytalan sorokba rendeződött (fotók: Rahmé Nikola)

a lombkoronában tartózkodik, meleg nyári napokon közepes magasságban röpköd; virágokat csak elvétve látogat.

Dicerca aenea (Linnaeus, 1760) (díszbogárfélék – Buprestidae) – nyárfa-díszbogár (38. ábra) – Magyarországon a síksági és dombvidéki őshonos nyárasokban országszerte elterjedt (MUSKOVITS és HEGYESSY 2002). Lárvája elhalt, de lábon álló vagy részben még élő fehér nyárok (*Populus alba*) törzsében fejlődik. Az imágók májustól július végéig szinte mozdulatlanul ülnek a napsütötte törzseken, illetve nagy melegben röpködnek.

Poecilnota variolosa (Paykull, 1799) (díszbogárfélék – Buprestidae) – szeplős díszbogár (40. ábra) – Magyarországon csak nagyjából tucatnyi lelőhelye ismert, főleg az Alföldről (MUSKOVITS és HEGYESSY 2002). Lárvai részben még élő, részben elhalt nyárfák (a táborfalvai lőtéren fehér nyár) törzsében és vastag ágaiban fejlődnek. Imágói május–júniusban ugyanezen fák kérgén tartózkodnak.

Dirrhagofarsus attenuatus (Mäklin, 1845) (tövisnyakúbogár-félék – Eucnemidae) – keskeny tövisnyakúbogár – Magyarországon eddig csupán tíznél kevesebb lelőhelye ismert. A Duna–Tisza közén 2012-ben került elő először (Táborfalva, Lakitelek). Fejlődésmenete, életmódja ismeretlen, de valószínűleg fűz- és nyárfákban fejlődik. Imágói nyár elején kéregtelen fatörzseken tartózkodnak, vagy alkonyatkor repülnek (LUCHT és MERKL 1993).

Microrhagus lepidus (Rosenhauer, 1847) (tövisnyakúbogár-félék – Eucnemidae) – csinos tövisnyakúbogár – Magyarországon nagyjából tíz lelőhelye ismert a hegy- és dombvidékekről. Táborfalvai adata az első az Alföldről. Lárváját eddig bükkben (*Fagus sylvatica*), égerben (*Alnus* sp.) és fűzben (*Salix* sp.)

találták. Az imágók a lombozaton, elhalt gallyakon tartózkodnak, és alkonyatkor rajzanak (LUCHT és MERKL 1993).

Agriotes modestus Kiesenwetter, 1858 (pattanóbogár-félék – Elateridae) – szürke pattanó – Magyarország alacsonyabb fekvésű vidékeinek nedves, de legalábbis nem túl száraz részein szórványosan elterjedt. Lárvája a talajban fejlődik, imágói nyár elején a gypszintben és cserjéken tartózkodnak, éjszaka repülnek.

Notolaemus castaneus (Erichson, 1845) (szegélyeslapbogár-félék – Laemophloeidae) – gesztenyebarna szegélyeslapbogár – Szórványos adatai ismeretek Magyarország hegy- és dombvidéki erdeiből. Az Alföldön nagyon ritka. Lárvája gombák által megtámadott elhalt fák kérge alatt fejlődik. Imágói főleg vékony gallyakon tartózkodnak, nappal elrejtőznek, éjszaka rajzanak.

Pycnomerus terebrans (A. G. Olivier, 1790) (héjbogárfélék – Zopheridae) – bordás héjbogár – A magyarországi hegy- és dombvidékek idős erdőállományaiban szórványosan fordul elő. Az Alföldön nagyon ritka. Elhalt, lábon álló vagy kidőlt fatörzsek kérge alatt tartózkodik, gyakran hangyák társaságában. Nappal elrejtőzik, éjszaka a fák törzsén mászkál, illetve alkonyatkor repül is. Lárvai gombás korhadékkal táplálkoznak.

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) (cincérfélék – Cerambycidae) – diófácincér (29. ábra) – Magyarországon az Alföldön természetes és ültetett erdőkben, parkokban általánosan elterjedt, de a hegyvidékeken is előfordul. Nagy testű lárvai legtöbbször fűz- és nyárfák törzsében rágják kétujjnyi széles járataikat, de szinte bármilyen lombos fában fejlődhetnek (KOVÁCS 1997, KOVÁCS és HEGYESSY 1995). Az imágók nyár közepén jelennek meg, éjszaka repülnek, vagy a fák törzsén mászkálnak.

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) (cincérfélék – Cerambycidae) – pézsmacincér (30. ábra) – Magyarországon főleg az ártéri puhafaligetekben él, de a hegyvidékeken kecskefűzben (*Salix caprea*) is előfordul (KOVÁCS és HEGYESSY 1995). A nőstény fűzfák sérült törzsére, vastagabb ágaira rakja petéit. A lárva először a kéreg alatt, majd az élő farészben is rág, ott is bábozódik. A kifejlett bogarak nappal aktívak: a fűzfák törzsén mászkálnak, de virágokat is látogatnak. A boroscsapdákat is szívesen felkeresik.

Cerambyx scopolii Füsslin, 1775 (cincérfélék – Cerambycidae) – kis hőscincér – Magyarországon a hegy- és dombvidék lomberdeiben mindenütt gyakori, a síkságon ritkább, ott főleg idősebb erdőkben fordul elő. Tápnövényeit illetően nem válogatós: leginkább tölgyfajok (*Quercus* spp.) törzsében és vastagabb ágaiban 2 évig fejlődik, de sok más keményfában is megél, például bükkben, gyertyánban (*Carpinus betulus*), égerben, szilben (*Ulmus* spp.), almában (*Malus* spp.), szilvában (*Prunus* spp.), berkenyében (*Sorbus* spp.), és galagonyában (*Crataegus* spp.) (KOVÁCS és mtsai 2000). Imágója tavasszal és nyár



29. ábra. Diófácincér (*Aegosoma scabricorne*) (fotó: Rahmé Nikola)



30. ábra. Pézsmacincér (*Aromia moschata*) (fotó: Rahmé Nikola)

elején virágokat látogat, vagy a lombozaton, illetve a peterakás helyén (elhalt fán) tartózkodik.

Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) (cincérfélék – Cerambycidae) – rőt hengercincér – Magyarországon az Alföldön és az alacsonyabb hegy- és dombvidékeken szórványosan fordul elő. Lárvai különféle nyárfajok ágaiban fejlődnek. Imágói nappal a lombkoronában tartózkodnak, éjszaka rajzanak, olyankor fényre is repülnek.

Purpuricenus budensis (Götz, 1783) (cincérfélék – Cerambycidae) – bíborcincér – Magyarországon szórványosan elterjedt, de az utóbbi három évtizedben meglepően kevés helyen találták; viszonylag több adata Pest megyéből (HEGYESSY és mtsai 2000) és a Dél-Dunántúlról (HEGYESSY és KOVÁCS 2003) ismert, de ezek többsége is 2000 előtti. Lárvája a tápnövényét illetően nem válogatós: számos vadon élő és gyümölcsfában kifejlődhet. Lelőhelyadatai alapján úgy tűnik, hogy a kertekkel, parkokkal, idősebb gyümölcsfákkal tarkított településeket kedveli; a tanulmány első szerzője például az utóbbi években a budapesti IX. kerületben a Bakáts téren (!), a szödi Debegió-hegyen, Szinetár Csaba pedig Fóton figyelte meg (még nem publikált adatok).

Saperda perforata (Pallas, 1773) (cincérfélék – Cerambycidae) – díszes nyárfacincér – Magyarország nyárasaiban általánosan elterjedt, de a hegy- és dombvidékeken rezgő nyárban (*Populus tremula*) gyakoribb. Az Alföldön – így a táborfalvai lőtérén is – a fehér nyárasok faja, de fekete nyárból (*Populus nigra*) is kimutatták (KOVÁCS és HEGYESSY 1995). Lárvája a frissen elhalt fák kérge alatt fejlődik. Az imágók május–júniusban a nyárfák ágain és lombján tartózkodnak. Éjszaka aktívak, akkor fényforrásokhoz is repülnek.

Semanotus russicus (Fabricius, 1776) (cincérfélék – Cerambycidae) – borókacincér – Magyarországon a síkságon és az alacsonyabb hegyvidéken sokfelé megtalálható, ahol boróka is nő (KOVÁCS és mtsai 2000). Lárvája a boróka

(*Juniperus communis*) elhalt ágaiban fejlődik; a vörösre színeződött elhalt borókaágak messziről felismerhetők, ezekben általában benne van a lárva, illetve késő ősztől kora tavaszig a bábkamrában lévő imágó is. Az imágó kora tavasszal már kirepül, de rajzása nagyon rövid, ezért a szabadban csak elvétve találták.

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) (cincérfélék – Cerambycidae) – sápadt éjcincér – Magyarország tölgyeseiben szórányosan terjedt el; elég ritkán kerül kézre, de ennek részben az éjszakai életmódja is oka lehet. Lárváit legyengült vagy frissen elpusztult tölgyek – nagyon ritkán hársak (*Tilia* spp.) és bükk – kérge alatt fejlődnek 2–3 évig, és a kéregben bábozódnak. Az imágók meleg nyári napokon este és éjszaka mozognak a tölgyek törzsén és vastagabb ágain; fényre is repülnek (CSÓKA és KOVÁCS 1999).

Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792) (ormányosbogár-félék – Curculionidae) – laposorrú ormányos – Hosszú ideig ritkának tartották Magyarországon, ám célzott kereséssel, illetve erős fényű lámpákkal történő éjszakai gyűjtéssel egyre több lelőhelye válik ismertté mind a síksági, mind a hegyvidéki tölgyesekben. Lárváit még élő, de részben elhalt tölgyek törzsében és vastagabb ágaiban fejlődnek. A lárvák áttelelnek, majd április–májusban bebábozódnak. Az imágók májustól augusztusig éjszaka közlekednek a fatörzseken, illetve repülnek (BERNARDINELLI és MOSSENTA 2009, CSÓKA és KOVÁCS 1999).

Társulásokhoz kevésbé köthető fajok

Tachys bisulcatus (Nicolai, 1822) (futóbogár-félék – Carabidae) – zömök martfutó – Magyarország alacsonyabban fekvő területein szórányosan elterjedt. Főleg nedvesebb rétek, cserjések, ritkás erdők talaján él, apró gerinctelenek ragadozója. Alkonyatkor rajzik, olyankor fényre is repül (MERKL és mtsai 2011). A vizsgált területen kizárólag autóshálózással gyűjtöttük.

***Microsaprinus* sp.** (sutabogárfélék – Histeridae) (31. ábra) – A táborfalvai Vezetési pályán autóshálózval került kézre egy nagyon apró sutabogár, mely egyértelműen a *Microsaprinus* genuszba tartozik. A Magyarországról korábban nem ismert genusznak négy fajt írták le: három nyugat-mediterrán elterjedésű, a negyedik Közép- és Belső-Ázsiában (Irántól




31. ábra. Azonosítatlan sutabogárfaj (*Microsaprinus* sp.). A genusznak ez az egyetlen adata Európában Dél-Franciaországon kívül (fotó: Rahmé Nikola)

Mongóliáig) fordul elő (SECQ és SECQ 1995, LACKNER 2010). Jórészt ismeretlen életmódú bogarak (a közép-ázsiai fajt rágcsálójáratokban is fogták), a legnagyobb bogárgyűjteményekben is igen ritkák. Kevésbé valószínű, hogy a táborfalvai példány a már ismert fajok egyikéhez tartozna, de mivel nőstény, faji szintű azonosításával – új faj esetén a leírásával – várni kell addig, amíg hím példány is előkerül.

Liocyrtusa vittata (Curtis, 1840) (pecebogárfélék – Leiodidae) – közönséges törpe-gombabogárka – Magyarországon az Alföld, a dombvidékek és az alacsonyabb hegyvidékek szórványosan előforduló lakója. Elsősorban zártabb gyepekben és ritkás erdőkben él. Lárvájának életmódja nem ismert, de valószínűleg gombák föld alatti részeiben fejlődik. Az imágók tavasz végén, nyár elején alkonyatkor rajzanak.

Chennium steigerwaldi Reitter, 1888 (holyvafélék – Staphylinidae) – Steigerwald-tapogatósbogár (32. ábra) – Magyarországon Táborfalván kívül eddig csak három lelőhelye ismert: a budapesti Hármashatár-hegy, az esztergomi



32–33. ábrák. Szárazságtűrő tapogatósbogarak a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótérrel.
32 = Steigerwald-tapogatósbogár (*Chennium steigerwaldi*) és 33 = pusztai tapogatósbogár (*Ctenistes palpalis*) (fotók: Németh Tamás)

Strázsa-hegy (BOKOR 1922) és az Ócsai Gyakorlótér (MERKL 2018), de egész Európában rendkívüli ritkaságnak számít. Száraz, meleg vidékeken a gyepi hangya (*Tetramorium caespitum*) és a lapos hangya (*Plagiolepis pygmaea*) bolyaiban él. Imágója alkonyatkor repül. A tapogatósbogár-formák (Pselaphinae) hazai fajai közül az egyik leginkább szárazság- és melegkedvelő (a tapogatósbogarak többsége nedves, főleg erdei környezetet kedvel).

Ctenistes palpalis Reichenbach, 1816 (holyvafélék – Staphylinidae) – pusztai tapogatósbogár (33. ábra) – Szórványos adatai ismertek az ország alacsonyabb területeiről. Száraz, meleg élőhelyeken (homoki és löszgyepekben, délies hegyoldalakon) kövek alatt és növényi törmelékben él. Imágója alkonyatkor repül.

Lomechusa pubicollis C. Brisout de Barneville, 1860 (holyvafélék – Staphylinidae) – selymes pamacsosholyva – Nagyjából tíz adata ismert az ország különböző részeiből. Igazi hangyavendég (mirmekofil faj). Lárvai *Formica*-fajok fészkeiben fejlődnek, ahol a lárvákat és a bábokat fogyasztják. A nyarat itt töltik az imágók is; ősszel viszont *Myrmica*-fajok fészkebe vonulnak, és ott telelnek át.

Trox cadaverinus Illiger, 1802 (irhabogárfélék – Trogidae) – nagy irhabogár – Szórványosan terjedt el az ország alacsonyabb hegy- és dombvidékein; az Alföldön ritka (NÁDAI és MERKL 2004). Nagyobb testű állatok tetemein található, a lebomlás végső szakaszában. A nyíltabb, szárazabb területeket kedveli, a zárt erdőket általában kerüli. Éjszaka rajzik, legtöbb példányát lámpázással gyűjtötték.

Copris lunaris (Linnaeus, 1758) (ganéjtúrófélék – Scarabaeidae) – közönséges holdszarvú-ganéjtúró – Magyarország legeltetett vidékein általánosan elterjedt. Patások – leginkább szarvasmarha és ló – trágyájában fejlődik. A hím és a nőstény a trágya alatt a talajban ökol nagyságú kamrát készít. Az oda lehordott trágyából 7–8 golyót formáznak, melyek mindegyikébe a nőstény egy petét rak. A nőstény négy hónapig – az új nemzedék bogarainak kikeléséig – őrzi a trágyagolyókat, melyeket folyamatosan tisztogat és simítgat. Nyáron ezért csak hímekkel lehet találkozni.

Scymnus doriae Capra, 1924 (katicabogár-félék – Coccinellidae) – széleslábú bödice – Magyarországon csupán két lelőhelye ismert (Esztergom, Táborfalva). Mediterrán elterjedésű faj, mely nálunk éri el az elterjedési területe északi határát. Életmódja ismeretlen. Csak 2006-ban közölték először Magyarországról (MERKL 2006).

Trotommidea salomae Reitter, 1883 (cérnanyakúbogár-félék – Scraptiidae) – törpe cérnanyakúbogár – Magyarországról csak 2008-ban mutatták ki (MERKL és NÉMETH 2008); néhány lelőhelye ismert az Alföldről és a dombvidékekről. Életmódja ismeretlen. Csaknem az összes hazai példányát autóshálózással fogták.

Cnemeplatia atropos Costa, 1847 (gyászbogárfélék – Tenebrionidae) – törpegyászbogár (34. ábra) – Magyarországi lelőhelyadatainak száma nem éri el a tízet; ezek mind az Alföldre és peremvidékére esnek. Nyílt homoki gyepekből és kötött talajú helyekről egyaránt előkerült, de más országokban találták hangyabolyokban, fák kérge alatt és városi kertekben is (PONEL és mtsai 2013). Ritkaságához hozzájárulhat, hogy apró termetű, színe beleolvad a környezetébe, és nappal rejtőzködik (a talajba is beássza magát). A Kanári-szigetektől a Mediterráneumon át Közép-Ázsiáig honos faj elterjedési területének északi határa Magyarország. Rendszertani szempontból is különlegesnek számít nálunk. A gyászbogarakon belül a Pimeliinae alcsaládba tartozik, melynek fajszáma a családon belül a legnagyobb (8–9 ezer). Ez az alcsalád elsősorban az arid-szemiarid (száraz és forró) területeken roppant fajgazdag, és a *Cnemeplatia atropos* az egyetlen képviselője Magyarországon, illetve Európában tőlünk északra. Az alcsalád „primitív” alakjai közé tartozik, mert működőképes hártyás szárnya van (a Pimeliinae legtöbb faja összenőtt szárnyfedőjű, röpképtelen, fekete, erősen páncélozott, viszonylag nagy testű bogár). Ásásra alkalmas elülső lábával, egyetlen felszínű, szőrös-pikkelyes kültakarójával a lőtéri gyászbogarak közül az *Opatrum*, a *Gonocephalum* és a *Leichenum* genuszok fajaira emlékeztet, de azoknak egyáltalán nem rokona; a hasonlóság csak a konvergencia eredménye.

Meloe cicatricosus Leach, 1815 (hólyaghúzófélék – Meloidae) – óriásnünke – Magyarországon elsősorban kötött talajú gyepeken fordul elő (leginkább löszön és szikeseken), néha azonban zártabb homoki gyepeken is megjelenik. (Homokon általában is ritkábbak a nünükék, mint löszgyepeken.) Itt azonban sohasem látható nagy számban (löszgyepeken ugyanis néha csapatosan jelentkeznek). Imágói április–májusban mászkálnak a talajon, és mohón fogyasztják a zsebébb leveleket. Párzás után a nőstény gödröt kapar a talajba, oda lerakja a petéit, majd betemeti őket. Az első stádiumú – „háromkarmú” (triungulinus) – lárvák 3–4 hét múlva kikelnek, virágokra kapaszkodnak, és magányos méhek fészkébe vitetik magukat, ahol folytatják egyedfejlődésüket.



34. ábra. Törpegyászbogár (*Cnemeplatia atropos*) (fotó: Romsauer János)

AZ ELŐKERÜLT BOGÁRFAJOK FELSOROLÁSA

A lőtérnek azt a 10 pontját, melyeken 2012-ben és 2015-ben élvefogó talajcsapdát üzemeltettünk – és amelyek körül 50×50 méteres négyzetben fűhálóztunk – a fajok adatainak felsorolásánál az alábbi módon jelöltük.

Dabas-1: $47^{\circ} 9' 31.7''$ N, $19^{\circ} 17' 53.9''$ E. Kiszáradó láprét.

Dabas-2: $47^{\circ} 9' 13.1''$ N, $19^{\circ} 18' 38.4''$ E. Kiszáradó láprét, fűzbokrokkal, a szélén homoki gyeppel.

Dabas-3: $47^{\circ} 8' 52.8''$ N, $19^{\circ} 18' 40.0''$ E. Kiszáradó láprét, fűzbokrokkal, selyemkóróval, a szélén homoki gyeppel.

Dabas-4: $47^{\circ} 6' 40.3''$ N, $19^{\circ} 20' 56.4''$ E. Láperdő-ligeterdő (főleg kocsányos tölgy, magyar kőris, fehér nyár). Az erdő a honvédség által „tatárszentgyörgyi lőtér”-nek nevezett terület része, közigazgatásilag azonban ez is Dabashoz tartozik.

Táborfalva-5: $47^{\circ} 7' 7.9''$ N, $19^{\circ} 23' 8.0''$ E. Száraz homoki gyeppel.

Táborfalva-6: $47^{\circ} 6' 34.8''$ N, $19^{\circ} 22' 53.1''$ E. Borókás-fehér nyáras.

Táborfalva-7: $47^{\circ} 6' 10.1''$ N, $19^{\circ} 23' 18.3''$ E. Borókás-fehér nyáras (főleg borókával).

Táborfalva-8: $47^{\circ} 5' 54.6''$ N, $19^{\circ} 24' 15.1''$ E. Száraz homoki gyeppel, bálványfákkal.

Táborfalva-9: $47^{\circ} 5' 29.0''$ N, $19^{\circ} 24' 46.1''$ E. Száraz homoki gyeppel, selyemkóróval, a szélén nyárral.

Táborfalva-10: $47^{\circ} 5' 54.2''$ N, $19^{\circ} 25' 33.1''$ E. Száraz homoki gyeppel, selyemkóróval.

A koordináták a csapdák pontos helyét adják meg. A gyűjtési módszer mindenütt talajcsapdázás és fűhálózás volt, ezt ezeknél a lelőhelyeknél külön nem említjük.

E tíz mintavételi hely kivételével a példányok lelőhelyének koordinátáit nem adtuk meg, mert (1) rendkívüli mértékben növelte volna a terjedelmet; (2) a mozgékony fajok esetében a pontos koordinátáknak csekély a jelentősége; (2) a védett és faunisztikai szempontból jelentős fajok koordinátái a DINPI adatbázisaiban megtalálhatók; (3) az 1990-es és 2000-es években a gyűjtők a koordinátákat nem rögzítették, hiszen a GPS-készülékek akkoriban még korántsem terjedtek el a maihoz hasonló mértékben.

Az idézőjelbe tett lelőhelynevek – „Örkény”, illetve „Örkény, Ilonamajor” – arra utalnak, hogy a példányok lelőhelycéduláján olvasható megnevezés helytelen, az ilyen példányok lelőhelye minden esetben Táborfalva közigazgatási területére esik.

A gyűjtők nevét az alábbi módon rövidítettük: ÁL = Ádám László, BG = Babocsai Gergely, BN = Bálint Norbert, BS = Bérces Sándor, BZS = Baranyai

Zsolt, CA = Csóka Annamária, GA = Grabant Aranka, GZ = György Zoltán, HG = Hangay György, HS = Hámori Sándorné, IS = Ilniczky Sándor, KA = Kotán Attila, MA = Máté András, MJ = Muskovits József, MO = Merkl Ottó, NA = Németh András, NL = Nádai László, NT = Németh Tamás, OA = Orosz András, PA = Podlussány Attila, PG = Petrányi Gergely, RD = Rédei Dávid, RN = Rahmé Nikola, RI = Retezár Imre, ROI = Rozner István, SD = Szalóki Dezső, SG = Scherczer Gabriella, SGY = Szél Győző, SK = Sipos Katalin, SZK = Székely Kálmán, SV = Szénási Valentin, SZ = Soltész Zoltán, SZG = Szövényi Gergely.

A családok sorrendje MERKL és VIG (2009) munkáját követi, figyelembe véve ROBERTSON és mtsai (2015) változtatásait. A magyar neveket illetően nincs a teljes magyar bogárfaunára kiterjedő általánosan elfogadott, publikált jegyzék (egyes csoportok, például a legtöbb vízibogárcsalád esetében létezik ilyen), ezért Ködöböcz Viktor és Szél Győző (futóbogárfélék), Podlussány Attila és Szénási Valentin (ormányoszerűek), Vig Károly (levélbogárfélék) és Merkl Ottó (egyéb családok) kézirat listáit vettük figyelembe. Emiatt lehetséges, hogy a később publikált jegyzékekben a „végleges” magyar nevek egyike-másika eltér majd az itt közöltektől.

Carabidae – Futóbogárfélék

Acinopus ammophilus Dejean, 1829 – nagy aknásfutó (10. ábra) – „Örkény”, úton egyelve, 1994.VI.29., 1994.VIII.3., 1994.VIII.10., RI; „Örkény”, úton egyelve, 1994.VII.29., SGY & SD; „Örkény”, lyukból kiásva, 1995.VII.8., ÁL; „Örkény”, egyelés úton, 1995.VI.30., 1995.VIII.5., 1996.VII.7., SGY; „Örkény”, 1999.VII.6., NL; „Örkény”, 1997.VII.7., MJ; Tatárszentgyörgy, 2015.X.10., MO; Táborfalva, 2008.IX.16., BS, SK & BZS; Táborfalva, gyakorlótér, egyelés, 2012.VI.30., 2015.IV.16., 2015.VI.21., MO; Táborfalva, 2015.IV.16., GA, NT & MO; Táborfalva, Vezetési pálya, 2015.VII.11., MO.

Acupalpus brunnipes (Sturm, 1825) – barna törpefutó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.

Acupalpus elegans (Dejean, 1829) – pompás törpefutó – Dabas-3, 2012.V.20., MO; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1995.VIII.5., SGY; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.11., 2012.VI.3., 2012.VI.24., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – fekete törpefutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.IX.8., 1995.V.29., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

- Acupalpus interstitialis* Reitter, 1884 – szélesközterű törpefutó – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.
- Acupalpus luteatus* (Duftschmid, 1812) – fakó törpefutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.11., 2012.VI.3., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO.
- Acupalpus maculatus* (Schaum, 1860) – vállfoltos törpefutó – „Örkény”, 1999.VII.21., PA; „Örkény”, autóshálózás, 2000.IV.23., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.17., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.3., 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Acupalpus meridianus* (Linnaeus, 1760) – sárgavállú törpefutó – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO.
- Acupalpus parvulus* (Sturm, 1825) – közönséges törpefutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.31., 1995.V.29., SGY & SG.
- Acupalpus suturalis* Dejean, 1829 – sárgavarratú törpefutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VI.20., SGY & SG.
- Agonum angustatum* Dejean, 1828 – keskenyhátú kislefutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG.
- Agonum lugens* (Duftschmid, 1812) – mocsári kislefutó – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO.
- Agonum monachum* (Duftschmid, 1812) – nádi kislefutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG.
- Agonum permolestum* Puel, 1938 – termetes kislefutó – Dabas-4, 2012.VI.24., MO.
- Agonum thoreyi* Dejean, 1828 – vörhenyes kislefutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG.
- Amara aenea* (DeGeer, 1774) – érces közfutó – Dabas-1, 2012.VI.3., MO.
- Amara apricaria* (Paykull, 1790) – rőt közfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VI.30., 1994.IX.8., SGY & SG.
- Amara bifrons* (Gyllenhal, 1810) – homoki közfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1995.V.29., 1995.VIII.5., SGY & SG.
- Amara chaudierei* Schaum, 1858 – réti közfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO.
- Amara consularis* (Duftschmid, 1812) – zömök közfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VI.30., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, egyelés úton, 1995.VIII.5., SGY.
- Amara convexior* Stephens, 1828 – erdei közfutó – Dabas-3, 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2015.VI.13., 2015.VI.27., MO.
- Amara fulva* (O. F. Müller, 1776) – fakó közfutó – „Örkény”, homokpuszta, lótrágyán, 1994.VI.30., SGY; „Örkény”, homokpuszta, úton egyelve, 1994.IX.8., 1995.VI.30., 1995.VIII.5., SGY.

- Amara majuscula* (Chaudoir, 1850) – bronzos közfutó – „Örkény”, homokpuszta, úton egyelve, 1995.VIII.5., SGY.
- Amara similata* (Gyllenhal, 1810) – közönséges közfutó – Dabas-1, 2012.VI.17., MO; „Örkény”, homokpuszta, lótrágyáról, 1994.VII.31., SGY & SG.
- Amblystomus metallescens* (Dejean, 1829) – érces árva futó – Táborfalva-9, 2012.VI.17., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., MO.
- Anisodactylus nemorivagus* (Duftschmid, 1812) – kis foltosfutó – Dabas-1, 2012.VI.3., MO.
- Anisodactylus poeciloides* (Stephens, 1828) – sziki foltosfutó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Anisodactylus signatus* (Panzer, 1796) – mezei foltosfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VI.30., SGY & SG.
- Anthracus consputus* (Duftschmid, 1812) – mocsári kisedfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1995.V.29., SGY; „Örkény”, 1999.VII.21., PA; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO.
- Anthracus longicornis* (Schaum, 1857) – keskenyhátú kisedfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO.
- Badister bullatus* (Schränk, 1798) – kis posványfutó – Dabas-4, 2012.VI.30., MO.
- Badister collaris* Motschulsky, 1844 – fakó posványfutó – Dabas, Gyón, fényre, 2012.V.20., IS & PG.
- Badister dilatatus* Chaudoir, 1837 – fekete posványfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény”, 1999.VII.21., PA.
- Badister lacertosus* Sturm, 1815 – erdei posványfutó – Dabas-4, 2012.VI.24., MO.
- Badister meridionalis* Puel, 1925 – közönséges posványfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.IX.8., 1995.V.29., 1996.VII.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Badister unipustulatus* Bonelli, 1813 – nagy posványfutó – „Örkény”, 1999.VII.21., PA.
- Bembidion articulatum* (Panzer, 1796) – tarka gyorsfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO.
- Bembidion assimile* (Gyllenhal, 1810) – mocsári gyorsfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.31., 1994.IX.8., 1995.V.29., SGY & SG.
- Bembidion biguttatum* (Fabricius, 1779) – kétfoltos gyorsfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO.

- Bembidion dentellum*** (Thunberg, 1787) – szalagos gyorsfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG.
- Bembidion fumigatum*** (Duftschmid, 1812) – rajzos gyorsfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.IX.8., SGY & SG.
- Bembidium inoptatum*** (Schaum, 1857) – kerekhatú gyorsfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.
- Bembidion latiplaga*** (Chaudoir, 1850) – kis gyorsfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.IX.8., SGY & SG.
- Bembidion minimum*** (Fabricius, 1792) – fekete gyorsfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VI.30., 1994.VII.29., 1994.VII.31., 1994.IX.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1997.VII.3., SGY & RI; „Örkény”, 1999.VII.21., PA; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012.VI.24., MO.
- Bembidion octomaculatum*** (Goeze, 1777) – nyolcfoltos gyorsfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.IX.8., 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1997.VII.3., SGY & RI; „Örkény”, autóshálózás, 2000.IV.23., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.11., MO.
- Bembidion properans*** (Stephens, 1828) – mezei gyorsfutó – Dabas-3, 2012.V.20., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Bembidion quadrimaculatum*** (Linnaeus, 1760) – négypöttyös gyorsfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.IX.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.11., 2012.VI.3., 2012.VI.24., MO.
- Bembidion semipunctatum*** (Donovan, 1806) – címeres gyorsfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG.
- Bembidion tenellum*** (Erichson, 1837) – apró gyorsfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.IX.8., 1997.VII.3., SGY & SG; MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO.
- Bembidion varium*** (Olivier, 1795) – közönséges gyorsfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.IX.8., 1995.V.29., 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1997.VII.3., SGY & RI; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

- Blemus discus*** (Fabricius, 1792) – szalagos fűrgefutonc – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1997.VII.3., SGY & RI; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO.
- Calathus ambiguus*** (Paykull, 1790) – homoki tarfutó – Dabas-2, 2015.VI.27., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.IX.8., 1995.V.29., 1995.VI.30., 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1997.VII.3., SGY & RI; Táborfalva-7, 2015.IX.12., MO; Táborfalva-7, 2015.IX.12., MO; Táborfalva-8, 2015.IX.12., 2015.X.10., MO; Táborfalva-9, 2015.IX.12., 2015.X.10., MO; Táborfalva-10, 2015.IX.12., 2015.X.10., MO.
- Calathus cinctus*** Motschulsky, 1850 – fakó tarfutó – Táborfalva-7, 2015.IX.12., MO.
- Calathus erratus*** (C. R. Sahlberg, 1827) – pusztai tarfutó – „Örkény”, homokpusztaréti, fadarabok alól, 1994.VII.3–5., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.IX.8., 1995.VI.30., 1995.VIII.5., SGY & SG.
- Calathus fuscipes*** (Goeze, 1777) – fekete tarfutó – Dabas-1, 2015.VI.27., MO; Dabas-2, 2015.VI.13., MO; Dabas-4, 2012.VIII.5., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.IX.8., SGY & SG; Táborfalva-5, 2015.VI.27., MO; Táborfalva-7, 2015.IX.12., MO; Táborfalva-8, 2015.VI.13., 2015.IX.12., MO.
- Calathus melanocephalus*** (Linnaeus, 1758) – vöröshátú tarfutó – Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV.
- Calomera littoralis nemoralis*** (Olivier, 1790) – sziki cicindéla (11. ábra) – Dabas, Nagy robbantó, 2015.IV.16., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Carabus cancellatus*** Illiger, 1798 – ragyás futrinka (3. ábra) – Dabas-1, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Dabas-2, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., MO; Dabas-4, 2012.VI.24., 2012.VI.30., 2012.VII.6., 2012.VII.15., 2012.IX.29., 2012.X.22., 2015.IV.16., 2015.IV.26., 2015.V.17., 2015.V.31., 2015.VI.13., 2015.VII.12., MO; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.8., 2015.IV.11., 2015.IV.15., 2015.IV.16., 2015.IV.24., 2015.IV.27., 2015.V.1., SV.
- Carabus convexus*** Fabricius, 1775 – selymes futrinka (4. ábra) – Dabas-4, 2012.VI.24., 2012.VI.30., 2012.VII.6., 2012.IX.29., 2012.X.22., 2015.IV.16., MO.
- Carabus granulatus*** Linnaeus, 1758 – szemcsés futrinka (5. ábra) – Dabas-1, 2015.VI.27., MO; Dabas-2, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Dabas-4, 2012.VI.24., 2012.VI.30., 2012.VII.6., 2012.IX.29., 2012.X.22., 2015.IV.16., MO; Dabas, Esső, egyelés, 2013.II.13., SV; Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2013.IV.29., SV; Dabas, Dabasi Turjános, egyelés, 2015.VI.27., MO.

Carabus hungaricus Fabricius, 1792 – magyar futrinka (1. ábra) – Dabas-2, 2012.VI.9., 2015.V.17., MO; Dabas-3, 2012.VI.17., 2015.V.17., 2015.V.31., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, egyelés, talajcsapdázás, 2015.III.31., 2015.IV.8., 2015.IV.11., 2016.IV.19., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, egyelés, talajcsapdázás, 2015.IV.11., 2017.III.15., SV; „Örkény”, úton egyelve, kövek alól, betontömbök alól, 1994.IX.8., 1995.V.31., 1995.VI.30., 1998.VI.9., 2005.V.22., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, kövek alól, 1997.VII.3., NL; „Örkény”, cserjés homokpusztagyep, talajcsapda, 2001.V.17., 2001.VI.15., 2001.VII.11., RI & SZK; „Örkény, Ilonamajor”, 1994.VI.30., SD; „Örkény”, lőtér, zárt homoki gyep *Stipa* fajjal, 2005.V.6., SGY, BS & SZ; „Örkény, Ilonamajor”, 1995.VII.12., RI; Tatárszentgyörgy, árokból, 2015.X.10., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.30., 2015.IV.26., 2015.V.31., 2015.VI.27., 2015.IX.12., 2015.X.10., MO; Táborfalva-6, 2015.IX.12., 2015.X.10., MO; Táborfalva-7, 2015.V.31., MO; Táborfalva-8, 2015.V.17., 2015.V.31., 2015.VI.13., 2015.VII.12., 2015.IX.12., 2015.X.10., MO; Táborfalva-9, 2015.V.31., 2015.VI.13., 2015.IX.12., MO; Táborfalva-10, 2015.IV.16., 2015.IV.26., 2015.V.31., 2015.VI.13., 2015.VI.21., 2015.IX.12., 2015.X.10., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, egyelés, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, 2015.III.26., 2016.IV.19., 2017.III.15., SV. – A faj 2006 előtti adatai szerepelnek SZÉL és mtsai (2006) dolgozatában.

Carabus scabriusculus Olivier, 1795 – érdes futrinka (2. ábra) – Dabas-2, 2012.VI.30., 2015.IV.26., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., MO; Dabas, Göboly-járás, talajcsapdázás, rostálás, 2013.IV.8., 2015.IV.11., SV; Dabas, Rákóczi erdeje, talajcsapdázás, 2015.III.31., SV.

Carabus violaceus Linnaeus, 1758 – kék futrinka (6. ábra) – Dabas-1, 2012.VI.3., 2015.IX.12., MO; Dabas-3, 2012.VI.9., MO; Dabas-4, 2012.VI.24., MO.

Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) – közönséges búzfutó – Dabas-1, 2012.VI.17., MO.

Chlaenius spoliatus (Rossi, 1792) – csupasz búzfutó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Chlaenius tristis (Schaller, 1783) – mocsári búzfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) – sárgavégű búzfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG.

Cicindela campestris (Linnaeus, 1758) – mezei cicindéla (12. ábra) – Dabas, Rákóczi erdeje, egyelés, 2015.IV.16., SV.

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 – öves cicindéla (13. ábra) – Dabas-3, 2012.VII.6., MO; Dabas, Göboly-járás, homokos rét, egyelés, 2009.IV.11., MO &

- NT; Dabas, Gyón, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Dabas, Nagy robbantó, 2015.IV.16., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.IV.16., 2015.VIII.1., MO; „Örkény”, homokpuszta, egyelés úton, 1994.VI.30., SGY; „Örkény”, homokpusztarét, egyelés, 1994.VII.3., MO; „Örkény”, fűhálózás, 2003.VI.10., GA, GZ & MO; Tatárszentgyörgy, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva-10, 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepterület, talajról egyelve, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, 2015.IV.16., GA, NT & MO.
- Cicindela soluta pannonica*** Mandl, 1936 – pusztai cicindéla (14. ábra) – Dabas, Gyón, egyelés, 2012.IV.22., IS; Dabas, Rákóczi erdeje, egyelés, 2015.IV.27., SV; „Örkény”, katonai lőtér, egyelés, 2011.IV.12., NL, NT & PA; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO; „Örkény”, katonai lőtér, homokpusztarét, egyelés, 2012.III.17., MO; Tatárszentgyörgy, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, 2015.IV.16., GA, NT & MO; Táborfalva, Vezetési pálya, 2015.IV.26., MO; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, 2016.IV.14., SV.
- Clivina collaris*** (Herbst, 1784) – foltos vakondfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO.
- Clivina fossor*** (Linnaeus, 1758) – közönséges vakondfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., 1996.VII.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.3., MO.
- Clivina ypsilon*** Dejean, 1830 – sziki vakondfutó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Diachromus germanus*** (Linnaeus, 1758) – német tarkafutó – Dabas-1, 2012.V.20., MO.
- Dolichus halensis*** (Schaller, 1783) – hantfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.28., 1996.VII.8., SGY & SG.
- Dyschirius aeneus*** (Dejean, 1825) – érces ásófutó – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.VII.31., SGY & SG; „Örkény”, 1999.VII.21., PA; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.11., 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Dyschirius chalybaeus*** Putzeys, 1846 – púposhomlokú ásófutó – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1995.VIII.5., 1997.VII.3., SGY & RI; „Örkény”, homokpusztarét, autóshálózás, 2000.V.16., MO; Táborfalva, fényre, 2012.VII.6., MO.
- Dyschirius nitidus*** (Dejean, 1825) – fényes ásófutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.VII.31., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Dyschirius politus*** (Dejean, 1825) – nyurga ásófutó – „Örkény”, 1999.VII.21., PA; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.30., MO.

- Dyschirius salinus striatopunctatus*** Putzeys, 1846 – sziki ásófutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.IX.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1997.VII.3., SGY & RI; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Dyschirius strumosus*** Erichson, 1837 – természetes ásófutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1995.V.29., 1996.VII.8., SGY & SG.
- Harpalus albanicus*** Reitter, 1900 – albán lomhafutó – „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO.
- Harpalus anxius*** (Duftschmid, 1812) – pusztai lomhafutó – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.
- Harpalus atratus*** Latreille, 1804 – erdei lomhafutó – Dabas-4, 2012.VII.13., MO.
- Harpalus autumnalis*** (Duftschmid, 1812) – őszi lomhafutó – Dabas-4, 2012.VI.3., MO; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.
- Harpalus calceatus*** (Duftschmid, 1812) – csupasz selymesfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.28–29., 1994.IX.8., 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, egyelés úton, 1995.VIII.5., SGY.
- Harpalus caspius*** (Steven, 1806) – kaszpi lomhafutó – Dabas-1, 2015.VI.13., MO.
- Harpalus distinguendus*** (Duftschmid, 1812) – parlagi lomhafutó – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.X.22., MO.
- Harpalus flavescens*** (Piller et Mitterpacher, 1783) – rőt lomhafutó – „Örkény”, homokpuszta, egyelés úton, 1994.IX.8., 1995.VI.30., 1995.VIII.5., SGY & SG.
- Harpalus froelichii*** Sturm, 1818 – Frölich-lomhafutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.IX.8., SGY & SG; „Örkény”, egyelés úton, 1995.VIII.5., SGY.
- Harpalus griseus*** (Panzer, 1797) – kis selymesfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény”, egyelés úton, 1995.VIII.5., SGY.
- Harpalus hirtipes*** (Panzer, 1797) – nagy lomhafutó – Dabas-3, 2015.IV.26., 2015.V.17., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.IX.8., 1995.VII.30., 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény”, egyelés úton, 1995.VI.30., 1995.VIII.5., SGY; „Örkény”, homokpuszta, egyelés kövek alól, 1995.V.31., SGY & SG; „Örkény”, katonai lőtér, 2011.III.26., NT & RN; Táborfalva-8, 2015.IX.12., MO; Táborfalva-10, 2015.X.10., MO; Táborfalva, gyakorlótér, egyelés, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

- Harpalus melancholicus*** Dejean, 1829 – komor lomhafutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG; Táborfalva-9, 2012.VI.24., 2015.VI.12., 2015.VI.13., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.30., MO.
- Harpalus picipennis*** (Duftschmid, 1812) – apró lomhafutó – „Örkény”, egyelés úton, 1995.VIII.5., SGY; Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV.
- Harpalus rubripes*** (Duftschmid, 1812) – vöröslábú lomhafutó – Dabas-3, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyeper, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Harpalus rufipes*** (DeGeer, 1774) – nagy selymesfutó – Dabas-4, 2012.VII.13., MO; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1994.VI.30., SGY & SG; „Örkény”, egyelés úton, 1995.VIII.5., SGY; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Harpalus serripes*** (Quensel in Schönherr, 1806) – fekete lomhafutó – Dabas-3, 2012.VI.17., MO; „Örkény”, homokpusztaréti, fadarabok alól, 1994.VII.3–5., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.9., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyeper, fűhálózás, 2012.IV.25., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyeper, rostálás, 2012.IV.30., MO.
- Harpalus servus*** (Duftschmid, 1812) – homoki lomhafutó – „Örkény”, homokpusztaréti, fadarabok alól, 1994.VII.3–5., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.VII.31., SGY & SG; „Örkény”, egyelés úton, 1995.V.29., 1995.VI.30., 1995.VIII.5., SGY; „Örkény”, homokpuszta, egyelés kövek alól, 1995.V.31., SGY & SG; „Örkény”, 2011.III.26., NT & RN; Táborfalva, lőtér, 2008.IV.4., MO; Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV.
- Harpalus smaragdinus*** (Duftschmid, 1812) – smaragd zöld lomhafutó – „Örkény”, egyelés úton, 1994.VI.30., 1995.VIII.5., SGY; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VI.30., 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.9., MO.
- Harpalus subcylindricus*** Dejean, 1829 – karcsú lomhafutó – Dabas-1, 2012.VI.3., MO.
- Harpalus tardus*** (Panzer, 1797) – közönséges lomhafutó – Dabas-3, 2012.VI.30., 2015.VI.17., MO; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO.
- Lebia humeralis*** Dejean, 1825 – vállfoltos cserjefutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG.
- Licinus depressus*** (Paykull, 1790) – kis pajzsosfutó – Dabas-1, 2012.VI.17., MO.
- Lymnastis galilaeus*** (Piochard de la Brûlerie, 1876) – déli martfutó – Dabas, Nagy robbantó, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO.

- Microlestes corticalis escorialensis*** (Brisout de Barneville, 1885) – sziki parányfutó – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.
- Nebria brevicollis*** (Fabricius, 1792) – barna partfutó – Dabas, Rákóczi erdeje, talajcsapda, 2015.V.31., MO.
- Notiophilus palustris*** (Duftschmid, 1812) – mocsári szemesfutó – Dabas-4, 2012.VII.13., MO.
- Notiophilus rufipes*** Curtis, 1829 – erdei szemesfutó – Dabas, Rákóczi erdeje, talajcsapda, 2015.VI.13., MO.
- Omophron limbatum*** (Fabricius, 1776) – gömböcfutó – „Örkény”, 1999.VII.2., HG & PA.
- Oodes gracilis*** A. Villa et G. B. Villa, 1833 – karcsú búvárfutó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Ophonus azureus*** (Fabricius, 1775) – azúrkék bársonyfutó – Dabas-3, 2015.VI.27., MO; „Örkény”, egyelés úton, 1995.VIII.5., SGY; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG.
- Ophonus cordatus*** (Duftschmid, 1812) – szívhátú bársonyfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG.
- Ophonus puncticeps*** (Stephens, 1828) – mezei bársonyfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG.
- Ophonus rufibarbis*** (Fabricius, 1792) – közönséges bársonyfutó – „Örkény”, homokpuszta, lótrágyáról, 1994.VII.31., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, egyelés úton, 1995.VIII.5., SGY; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Ophonus schaubergerianus*** (Puel, 1937) – Schauberger-bársonyfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG.
- Oxypselaphus obscurus*** (Herbst, 1784) – barnás kisfutó – Dabas-4, 2012.VIII.5., MO.
- Panagaeus cruxmajor*** (Linnaeus, 1758) – nagy keresztesfutó – „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.IX.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Pangus scaritides*** (Sturm, 1818) – vastagfejű lomhafutó – „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO.
- Paradromius linearis*** (Olivier, 1795) – barázdáltfejű szárfutó – Dabas-3, 2012.V.20., MO; Táborfalva-8, 2012.V.11., MO; Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepp, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Parophonus dejeani*** (Csiki, 1932) – fekete bundásfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás, 2004.VII.22., MO; Dabas-1, 2012.VI.24., MO.

- Parophonus hirsutulus*** (Dejean, 1829) – nagy bársonyfutó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Platyderus rufus*** (Duftschmid, 1812) – rőtfitó – Dabas-4, 2012.IX.29., MO; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, egyelés, 2009.IV.11., MO & NT.
- Platynus longiventris*** (Mannerheim, 1825) – hosszúszárnyú kistfitó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Poecilus cupreus*** (Linnaeus, 1758) – rezes gyászfutó – Dabas-1, 2012.VI.9., 2012.VI.30., 2015.X.10., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2015.IV.26., MO; Dabas-4, 2012.VII.13., MO.
- Poecilus versicolor*** (Sturm, 1824) – smaragdöld gyászfutó – Dabas-1, 2012.V.25., 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO; Dabas-3, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO.
- Pogonus luridipennis*** (Germar, 1822) – pompás szikfitó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG.
- Pogonus transfuga*** Chaudoir, 1871 – zöldes szikfitó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény”, 1999.VII.21., PA.
- Polistichus connexus*** (Geoffroy, 1785) – foltos sutafutó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Pterostichus cursor*** (Dejean, 1828) – színjátzó gyászfutó – Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV.
- Pterostichus gracilis*** (Dejean, 1828) – karcsú gyászfutó – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1994.VI.30., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Pterostichus macer*** (Marsham, 1802) – lapos gyászfutó – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1994.VII.28., SGY & SG.
- Pterostichus niger*** (Schaller, 1783) – fekete gyászfutó – Dabas-4, 2012.VII.6., 2012.IX.29., 2015.X.10., MO.
- Pterostichus strenuus*** (Panzer, 1796) – pontozottmellű gyászfutó – Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV.
- Pterostichus vernalis*** (Panzer, 1796) – mocsári gyászfutó – Dabas-3, 2012.VI.9., MO; Dabas-4, 2012.VII.6., MO.
- Stenolophus discophorus*** Fischer, 1823 – foltos turzásfitó – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1997.VII.3., SGY & RI; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Stenolophus mixtus*** (Herbst, 1784) – közönséges turzásfitó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1995.V.29., 1996.VII.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.3., MO.

- Stenolophus skrimshiranus*** Stephens, 1828 – sárga turzásfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Stenolophus teutonius*** (Schränk, 1781) – réti turzásfutó – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.30., MO.
- Syntomus foveatus*** (Geoffroy, 1785) – gödörkés gyökérfutó – Dabas-2, 2015.VI.27., MO; „Örkény”, katonai lőtér, 2011.III.26., NT & RN.
- Syntomus obscuroguttatus*** (Duftschmid, 1812) – foltos gyökérfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG.
- Tachys bistriatus*** (Duftschmid, 1812) – közönséges martfutó – Dabas-3, 2012.V.20., MO; Dabas, Gyón, autóshálózás, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.31., 1995.V.29., 1997.VII.3., SGY; „Örkény”, 1999.VII.21., PA; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.V.17., 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.30., 2012.VII.12., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Tachys bisulcatus*** (Nicolai, 1822) – zömök martfutó – Dabas, Nagy robbantó, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.V.31., 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, 2015.VI.5., MO.
- Tachys diabrachys*** (Kolenati, 1845) – hatbarázdás martfutó – Dabas, Gyón, autóshálózás, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, autóshálózás, 2000.IV.23., MO.
- Tachys fulvicollis*** (Dejean, 1831) – szalagos martfutó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., MO.
- Tachys turkestanicus*** (Csiki, 1928) – turkesztáni martfutó – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, fűhálózás, 1995.V.29., SGY.
- Tachyta nana*** (Gyllenhal, 1810) – kéreglakó martfutó – Táborfalva, gyakorlótér, nyárfából egyelve, 2010.III.8., SV.
- Trechus quadristriatus*** (Schränk, 1781) – közönséges fűgefutó – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.IX.8., SGY & SG.
- Zabrus spinipes*** (Fabricius, 1798) – zömök gabonafutó – Dabas-2, 2012.VI.30., 2015.IV.26., 2015.VI.13., MO; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, fűhálózás, 1994.IX.8., SZG; Táborfalva-6, 2012.VI.24., 2015.X.10., MO; Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV.

Halipilidae – Víztaposófélék

- Haliplus fluviatilis*** Aubé, 1836 – kecses víztaposó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Haliplus immaculatus*** Gerhardt, 1877 – csíkos víztaposó – „Örkény”, homokpusztarét, fényre, 1999.VII.21., HG & PA.
- Peltodytes caesus*** (Duftschmid, 1805) – zömök víztaposó – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.
- Dytiscidae – Csíkbogárfélék
- Bidessus nasutus*** Sharp, 1887 – tarka törpecsíkbogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Dabas, Gyón, fényre, 2012.V.20., IS & PG.
- Graphoderus austriacus*** (Sturm, 1834) – kis tavicsíkbogár – Dabas, Rákóczi erdeje, fényre, 2015.VI.13., MO.
- Hydaticus seminiger*** (DeGeer, 1774) – fekete mocsáricsíkbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Hydaticus transversalis*** (Pontoppidan, 1763) – harántsávós mocsáricsíkbogár – Dabas, Rákóczi erdeje, fényre, 2015.VI.13., MO.
- Hydroglyphus geminus*** (Fabricius, 1792) – gyakori paránycsíkbogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Dabas, Gyón, fényre, 2012.V.20., IS & PG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Hydroporus angustatus*** Sturm, 1835 – karcsú kiscsíkbogár – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1994.VI.30., SGY & SG.
- Hydroporus planus*** (Fabricius, 1781) – gyakori kiscsíkbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.X.22., MO.
- Hygrotus decoratus*** (Gyllenhal, 1808) – keresztcs aprócsíkbogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO.
- Hygrotus impressopunctatus*** (Schaller, 1783) – barázdás aprócsíkbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Hygrotus inaequalis*** (Fabricius, 1776) – gyakori aprócsíkbogár – „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO.
- Hygrotus parallelogrammus*** (Ahrens, 1812) – pettyesnyakú aprócsíkbogár – Dabas, Gyón, fényre, 2012.V.20., IS & PG; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 2004.VII.17., SD.
- Ilybius ater*** (DeGeer, 1774) – nagy orsócsíkbogár – Dabas, Gyón, fényre, 2012.V.20., IS & PG; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Ilybius guttiger*** (Gyllenhal, 1818) – kis orsócsíkbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Ilybius quadriguttatus (Lacordaire, 1835) – gyakori orsócsíkbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Laccophilus poecilus Klug, 1834 – tarka bukóbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Rhantus bistratus (Bergsträsser, 1778) – sávossnyakú particsíkbogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 2004.VII.17., SD.

Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808) – fekete particsíkbogár – Dabas, Rákóczi erdeje, fényre, 2015.VI.13., MO.

Hydrophilidae – Csiborfélék

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – változékony csibor – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 2004.VII.17., SD.

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – kis csibor – Dabas, Gyón, egyelés, 2012.IV.22., IS; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822 – fekete óriáscsibor – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1999.VII.29., SD; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Histeridae – Sutabogárfélék

Acritus homoeopathicus Wollaston, 1857 – fénytelen paránysutabogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Acritus nigricornis (Hoffmann, 1803) – fényes paránysutabogár – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.VI.9., 2012.VII.20., MO.

Carcinops pumilio (Erichson, 1834) – komposzt-sutabogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.

Dendrophilus punctatus (Herbst, 1792) – nagy fanedvsutabogár – Dabas, Rákóczi erdeje, homoki gyepek és nyáras, egyelés, 2015.IV.16., GA, MO & NT; Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO.

Epierus comptus Erichson, 1834 – tojásdad erdei-sutabogár – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, nyárfából egyelve, 2012.III.8., SV.

Exaesiopus grossipes (Marseul, 1855) – homoki sutabogár – Táborfalva-8, 2012.VI.17., MO.

Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758 – közönséges sutabogár – Dabas-1, 2012.VI.17., MO; Dabas-2, 2015.IV.26., 2015.V.31., 2015.VI.27., MO.

- Hololepta plana* (Sulzer, 1776) – lemez-sutabogár – „Örkény”, 2012.II.24., NL, NT & RN.
- Hypocacculus rubripes* (Erichson, 1834) – vöröslábú trágyasutabogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Hypocaccus metallicus* (Herbst, 1792) – fekete trágyasutabogár – „Örkény”, 1999.VII.21., PA; „Örkény”, homokpuszta, 2009.VI.16., NT & RN; „Örkény”, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, Vezetési pálya, homoki gye, egyelés, 2015.IV.26., MO.
- Margarinotus bipustulatus* (Schrank, 1781) – vörösfoltos sutabogár – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, egyelés, 2000.IV.12., MO; „Örkény”, 2007.III.15., NL.
- Margarinotus purpurascens* (Herbst, 1792) – vöröslő sutabogár – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.III.23., SV.
- Microsaprinus* sp. (31. ábra) – Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Paromalus flavicornis* (Herbst, 1792) – sárgabunkós kéregsutabogár – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Pseudepierus italicus* (Paykull, 1811) – olasz erdei-sutabogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., MO.
- Saprinus georgicus* Marseul, 1862 – mezei fémsutabogár – Táborfalva-5, 2015.IX.12., MO.
- Saprinus planiusculus* Motschulsky, 1849 – szurkos fémsutabogár – „Örkény”, homokpuszta, egyelés, 2005.IV.16., MO; Táborfalva-9, homoki gye, talajcsapda, 2015.V.17., MO; Táborfalva-10, talajcsapda, 2015.VI.21., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, homoki gye, egyelés, 2015.IV.26., MO.
- Saprinus semistriatus* (Scriba, 1790) – közönséges fémsutabogár – Dabas, Dabasi Turjános, boroscsapda, 2015.VII.17., MO; Dabas, Nagy robbantó, nyáras, boroscsapda, 2015.VII.17., MO; Táborfalva-10, 2015.VI.21., MO.
- Teretrius fabricii* Mazur, 1972 – éji sutabogár – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO.

Ptiliidae – Paránybogárfélék

- Acrotrichis grandicollis* (Mannerheim, 1844) – hatsörtés paránybogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.24., MO.
- Acrotrichis fascicularis* (Herbst, 1793) – keskeny paránybogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO.

Nossidium pilosellum (Marsham, 1802) – nagy paránybogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.VI.3., MO.

Leiodidae – Pecebogárfélék

Catops grandicollis Erichson, 1837 – szélestorú pecebogár – Táborfalva-5, 2015.X.10., MO; Táborfalva-10, 2015.X.10., MO.

Colenis immunda (Sturm, 1807) – recés gombabogárka – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.V.31., 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., 2012.VI.24., MO.

Colon angulare Erichson, 1837 – szögletescombú estbogár – Dabas, katonai lőtér, autós hálózás este, 2004.VII.22., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.V.11., 2012.V.20., 2012.VI.3., MO.

Colon fuscicorne Kraatz, 1852 – füstöscsápú estbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.VI.3., MO.

Colon murinum Kraatz, 1850 – egérszínű estbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., MO.

Colon serripes (C. R. Sahlberg, 1822) – fűrészeslábú estbogár – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1995.V.29., SGY.

Hydnobius punctatus (Sturm, 1807) – sötét szegélyes-gombabogárka – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.X.22., MO.

Leiodes ciliaris (W. L. E. Schmidt, 1841) – pillás gombabogárka – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., 1998.VII.13., SD; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.IX.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1995.V.29., 1998.VI.9., SGY; „Örkény”, homokpuszta, fényre, 1999.VI.17., MO; „Örkény”, 1999.VII.21., PA; „Örkény”, homokpusztarét, autóshálózás, 2000.V.16., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.

Leiodes rubiginosa (W. L. E. Schmidt, 1841) – homoki gombabogárka – Dabas, Gyón, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.25., MO; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., 1998.VII.13., SD; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1995.V.29., 1997.VII.3., SGY; „Örkény”, homokpuszta, egyelés úton, 1995.VI.30., SGY; „Örkény”, 1999.VII.21., PA; „Örkény”, homokpusztarét, autóshálózás, 2000.IV.23., 2000.V.16., MO; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VII.20., MO.

Leiodes rugosa Stephens, 1829 – harántbarázdás gombabogárka – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.X.22., MO.

Liocyrtusa vittata (Curtis, 1840) – közönséges törpe-gombabogárka – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.24., 2012.VII.20., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.

Zeadolopus latipes (Erichson, 1845) – lapátlábú gombabogárka – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.VI.9., 2012.VI.17., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.

Silphidae – Dögbogárfélék

Nicrophorus interruptus Stephens, 1830 – sárgaszőrű temetőbogár – Dabas, Dabasi Turjános, boroscsapda, 2015.VII.17., MO.

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) – közönséges temetőbogár – Dabas-2, 2015.VI.27., MO; Dabas-4, 2012.VI.24., 2012.VII.20., MO; Dabas, Dabasi Turjános, boroscsapda, 2015.VII.17., MO; Táborfalva-5, 2015.X.10., MO; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO.

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784 – feketecsápú temetőbogár – Dabas, Dabasi Turjános, boroscsapda, 2015.VII.17., MO.

Nicrophorus vestigator Herschel, 1807 – szőrösnyakú temetőbogár – Táborfalva-10, 2015.VI.13., MO.

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) – vörösnyakú dögbogár – Dabas-4, 2012.VI.24., MO.

Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – bordás csigarabló – Dabas-4, 2012.VII.6., MO.

Silpha carinata Herbst, 1783 – karimás dögbogár – Dabas-4, 2012.VI.24., 2012.VI.30., 2012.VII.6., 2012.VII.15., 2015.V.17., 2015.V.31., 2015.VI.12., 2015.VI.13., 2015.X.10., MO.

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) – ripacsos dögbogár – Táborfalva-5, 2015.X.10., MO.

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) – hegyesvállú dögbogár – Táborfalva, Vezetési pálya, egyelés, 2015.IV.26., MO.

Staphylinidae – Holyvafélék

Achenium depressum (Gravenhorst, 1802) – sókedvelő pocsolyaholyva – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., MO.

- Aleochara verna* Say, 1836 – délvidéki fürkészhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., 2012.VI.24., MO.
- Amischa analis* (Gravenhorst, 1802) – közönséges trapézfejűhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.
- Atheta trinotata* (Kraatz, 1856) – sujtásos penészhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Chennium steigerwaldi* Reitter, 1888 – Steigerwald-tapogatósbogár (32. ábra) – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.
- Ctenistes palpalis* Reichenbach, 1816 – pusztai tapogatósbogár (33. ábra) – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., MO.
- Falagria caesa* Erichson, 1837 – barázdás karcsúhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., 2012.VI.24., MO.
- Gabrius suffragani* Joy, 1913 – turjáni ganajhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO.
- Lathrobium furcatum* Czwalina, 1888 – sziki mocsárhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO.
- Lathrobium longulum* Gravenhorst, 1802 – apró mocsárhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Leptacinus intermedius* Donisthorpe, 1936 – barázdáshomlokú rovátkolt-hollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO.
- Lithocharis nigriceps* Kraatz, 1859 – sárgás réti-hollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO.
- Lomechusa pubicollis* C. Brisout de Barneville, 1860 – selymes pamacsos-hollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO.
- Luzea graeca* (Kraatz, 1857) – sziki lombhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., MO.
- Medon dilutus* (Erichson, 1839) – fakó lombhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.
- Mycetoporus erichsonianus* Fagel, 1965 – szenes gombászhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.X.22., MO.
- Mycetoporus rufescens* (Stephens, 1832) – vöröses gombászhollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.3., MO.
- Mycetota laticollis* (Stephens, 1832) – sömörös komposzthollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.
- Nehemitropia lividipennis* (Mannerheim, 1830) – orsócsápú komposzthollyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO.

- Neobisnius procerulus* (Gravenhorst, 1806) – kétszínű ganajholyva – Dabas-3, 2012.V.20., MO; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Ochtheophilum fracticorne* (Paykull, 1800) – közönséges posványholyva – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Ocypus mus* (Brullé, 1832) – egérszínű holyva – Dabas-3, 2015.IX.12., MO; Dabas-4, 2015.X.10., MO; Táborfalva-5, 2015.IX.12., MO.
- Ocypus nitens* (Schränk, 1781) – fekete holyva – Dabas-2, 2012.VI.9., MO.
- Ocypus olens* (Müller, 1764) – bűzös holyva – Dabas-2, 2012.VI.30., MO.
- Omalius oxyacanthae* Gravenhorst, 1806 – erdei barázdásholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.X.22., MO.
- Ontholestes haroldi* (Eppelsheim, 1884) – sárgatérdű holyva – Dabas-4, 2012.VI.24., 2012.VI.30., 2012.VII.15., 2012.VIII.5., MO.
- Paederus fuscipes* Curtis, 1826 – kis partiholyva – Dabas-4, 2012.V.20., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.3., MO.
- Pella lugens* (Gravenhorst, 1802) – fakó hangyászholva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.11., MO.
- Philonthus albipes* (Gravenhorst, 1802) – mezei ganajholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO.
- Philonthus debilis* (Gravenhorst, 1802) – kis ganajholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., MO.
- Philonthus fumarius* (Gravenhorst, 1806) – kormos ganajholyva – Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV.
- Philonthus micans* (Gravenhorst, 1802) – selyemfényű ganajholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO.
- Philonthus punctus* (Gravenhorst, 1802) – sokpontos ganajholyva – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Philonthus quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810) – zöldfényű ganajholyva – Dabas-3, 2012.V.20., MO; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Philonthus salinus* Kiesenwetter, 1844 – sziki ganajholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Platydacus fulvipes* (Scopoli, 1763) – fémkék holyva – Dabas-4, 2012.VI.30., MO.
- Proteinus laevigatus* Hochhuth, 1872 – domború sutaholyva – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.

- Proteinus ovalis*** Stephens, 1834 – széles sutaholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO.
- Pseudomedon obscurellus*** (Erichson, 1840) – selymes réti holyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., MO.
- Quedius dilatatus*** (Fabricius, 1787) – széles mohaholyva – Táborfalva, gyakorlótér, boroscsapda, 2012.VI.17., MO.
- Scaphidium quadrimaculatum*** Olivier, 1790 – négyfoltos sajkabogár – Dabas-4, 2015.VI.13., MO.
- Scopaeus debilis*** Hochhuth, 1851 – pusztai turzasholyva – Dabas-3, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2015.VI.13., MO; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.11., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Stenus flavipes*** Stephens, 1833 – sárgalábú szemesholyva – Dabas-3, 2012.X.22., MO.
- Tachyporus hypnorum*** (Fabricius, 1775) – közönséges kószaholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.17., MO.
- Tachyporus nitidulus*** (Fabricius, 1781) – kis kószaholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012.VI.24., MO.
- Tachyporus pusillus*** Gravenhorst, 1806 – apró kószaholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Tasgius winkleri*** (Bernhauer, 1906) – sarlós holyva – Dabas-4, 2012.VII.6., MO.
- Tetartopeus rufonitidus*** (Reitter, 1909) – mocsári mocsárholyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Trissemus antennatus serricornis*** (Schmidt-Goebel, 1838) – fésűscsápú tapogatósbogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., SD.
- Zyras collaris*** (Paykull, 1800) – vöröshátú hangyász holyva – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.30., MO.

Lucanidae – Szarvasbogárfélék

- Dorcus parallelipedus*** (Linnaeus, 1758) – kis szarvasbogár – Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; Dabas, Nagy robbantó, 2015.VI.27., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.IV.16., MO; „Örkény”, 2002.VI.16., NL; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO.

Glaresidae – Csorványfélék

- Glaresis rufa*** Erichson, 1848 – vörhenyes csorvány – Dabas, Nagy robbantó, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13.,

MO; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VII.24., 1993.VIII.10., 1994.VII.29., 1995.VIII.5., 1998.VII.13., SD; „Örkény”, 1993.VII.25., 1996.VII.7., MJ; „Örkény”, 1997.VII.3., 1997.VII.16., 1999.VII.6., NL; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.30., 2012.VI.3., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VII.20., MO; Táborfalva, HM-lőtér, 2014.VII.7., SV; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.

Ochodaeidae – Homoktúróbogár-félék

Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781) – alkonyati homoktúróbogár – Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; „Örkény”, homokpuszta, egyelés, 1995.VIII.5., SGY; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1996.VII.28., SGY; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1997.VII.3., SGY & SG; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 2004.VII.17., SD; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., MO.

Trogidae – Irhabogár-félék

Trox cadaverinus Illiger, 1802 – nagy irhabogár – „Örkény”, 1999.VII.6., NL; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO. – A korábbi adat szerepel NÁDAI és MERKL (2004) dolgozatában.

Trox evermannii Krynicki, 1832 – homoki irhabogár – „Örkény”, homokpuszta, autós hálózás, 2000.IV.23., MO. – Az adat szerepel NÁDAI és MERKL (2004) dolgozatában.

Trox hispidus niger P. Rossi, 1792 – gömböc irhabogár – Dabas, Göboly-járás, homokos rét, fűhálózás, egyelés, 2009.IV.11., MO & NT.

Trox perrisii Fairmaire, 1868 – fészeklakó irhabogár – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, egyelés, 1995.V.25., SGY.

Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) – közönséges irhabogár – Táborfalva-5, 2012.V.25., MO.

Geotrupidae – Álganéjtúró-félék

Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) – szarvas álganéjtúró (7. ábra) – Dabas, Gyón, fényre, 2012.V.20., IS; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VII.11., IS.

Geotrupes spiniger (Marsham, 1802) – közönséges álganéjtúró – „Örkény, Ilonamajor”, lótrágyából, 1993.VIII.3., 1993.VIII.10., 1994.VI.30., 1994.VIII.10., SD; „Örkény”, 1997.VII.3., NL.

Scarabaeidae – Ganéjtúrófélék

- Amphimallon assimile*** (Herbst, 1790) – kis sárgacserebogár – Táborfalva-5, 2012.V.25., MO.
- Amphimallon solstitiale*** (Linnaeus, 1758) – bordás sárgacserebogár – „Örkény”, 1993.VI.30., 1999.VII.1., NL; „Örkény, Ilonamajor”, 1998.VII.13., 2005.VII.19., SD; „Örkény”, homokpuszta, 1995.VI.30., SGY; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Anisoplia lata*** Erichson, 1847 – széles szipoly – „Örkény”, 2003.VI.10., MJ.
- Anomala dubia*** (Scopoli, 1763) – kis fináncbogár – „Örkény, Ilonamajor”, 1994.VII.20., SD; „Örkény”, 2002.VI.26., 2003.VI.7., MJ.
- Anomala solida*** Erichson, 1847 – déli fináncbogár – „Örkény”, 1999.VII.6., NL; „Örkény”, 2005.VI.21., MJ.
- Anomala vitis*** (Fabricius, 1775) – nagy fináncbogár – „Örkény”, 1993.VI.30., 1997.VII.3., 1997.VII.16., 1998.VII.23., 1999.VII.3., 1999.VII.6., NL; „Örkény, Ilonamajor”, 1994.VI.30., 2004.VII.17., SD; „Örkény”, 1999.VII.12., 2002.VI.24., 2003.VI.28., MJ; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Anoxia orientalis*** (Krynicky, 1832) – keleti cserebogár – Dabas, Halász-domb környéke, egyelés, 2002.VI.21., SV; „Örkény”, 1993.VI.30., 1999.VII.3., NL; „Örkény”, homokpuszta, egyelés, 1994.VI.30., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélyén, lámpázás, 1996.VII.8., SGY & SG; „Örkény, Ilonamajor”, 1998.VII.13., SD; „Örkény”, 2002.VII.2., MJ; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Anoxia pilosa*** (Fabricius, 1792) – pusztai cserebogár – „Örkény”, 1998.VI.11., 2001.VI.15., NL; „Örkény, Ilonamajor”, 2001.VI.15., SD; Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.3., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, 2015.VI.5., MO.
- Aphodius brevis*** Erichson, 1848 – zömök trágyabogár – Dabas, homoki gyepp, egyelés, 2015.IV.16., GA, MO & NT.
- Aphodius circumcinctus*** W. L. E. Schmidt, 1840 – sziki trágyabogár – Dabas, Rákóczi erdeje, fényre, 2015.VI.13., MO.
- Aphodius distinctus*** (O. F. Müller, 1776) – rajzos trágyabogár – Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV; „Örkény”, 1993.IV.3., MJ; „Örkény”, 1999.III.21., 2000.III.5., NL; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO; Táborfalva, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.
- Aphodius erraticus*** (Linnaeus, 1758) – barnáshátú trágyabogár – „Örkény”, 1994.VI.29., NL.

- Aphodius fimetarius* (Linnaeus, 1758) – feketehasú trágyabogár – „Örkény”, 1993. IV.3., MJ; „Örkény”, 1999.III.21., 2000.III.5., 2002.VI.16., 2007.III.15., NL.
- Aphodius fossor* (Linnaeus, 1758) – nagy trágyabogár – „Örkény”, 1993.VI.30., NL.
- Aphodius frater* Mulsant et Rey, 1870 – vaskos trágyabogár – „Örkény”, 1983. IV.16., NL.
- Aphodius granarius* (Linnaeus, 1767) – szurokszínű trágyabogár – Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV; „Örkény”, 1994.VI.29., 1994.VIII.29., NL; „Örkény”, 1996.VII.7., MJ; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012.IV.30., MO.
- Aphodius kraatzii* Harold, 1868 – karcsú trágyabogár – „Örkény”, fényre, 2013. VII.31., 2014.VII.17., NL; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., 1998.VIII.7., SD; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VII.31., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegély, lámpázás, 1996.VII.28., SGY; „Örkény”, homokpuszta, fényre, 1998.VI.9., SGY; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Aphodius lividus* (A. G. Olivier, 1789) – turjáni trágyabogár – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.V.31., MO; „Örkény”, homokpusztarét, 2000.V.16., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.11., 2012.V.20., 2012.VI.3., MO.
- Aphodius lugens* Creutzer, 1799 – borostyánsárga trágyabogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VIII.10., 1994.VII.29., 1998.VII.13., SD; „Örkény”, 1993.VI.30., 1999.VII.6., NL; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., 1996.VII.28., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VII.31., 1994.IX.8., SGY & SG; „Örkény”, 1996.VII.7., MJ.
- Aphodius luridus* (Fabricius, 1775) – tarka trágyabogár – „Örkény”, 1993.IV.3., MJ; „Örkény”, 2010.V.2., NL; Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV.
- Aphodius melanostictus* W. L. E. Schmidt, 1840 – foltos trágyabogár – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1994.VI.30., SGY & SG.
- Aphodius plagiatus* (Linnaeus, 1767) – réti trágyabogár – „Örkény”, 1999.VII.6., NL; „Örkény”, 1999.VII.21., HG & PA.
- Aphodius prodromus* (Brahm, 1790) – sárgalábú trágyabogár – Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV; „Örkény”, 1993.IV.3., MJ; „Örkény”, 1999.III.21., 2000.III.5., 2007.III.15., NL.
- Aphodius punctatosulcatus* Sturm, 1805 – pusztai trágyabogár – Dabas, Göbölj-járás, homokos rét, fűhálózás, egyelés, 2009.IV.19., MO & NT; Dabas, Gyón, esti rajzás, 2015.IV.16., NT; „Örkény”, 1992.VI.12., 1999.III.21., 2010.IV.25., 2010.V.2., NL; „Örkény”, 1993.IV.3., MJ.

- Aphodius quadriguttatus*** (Herbst, 1783) – négyecseppes trágyabogár – Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV; „Örkény”, homokpuszta, fényre, 1998.VI.9., SGY; „Örkény”, homokpusztarét, autóshálózás, 2000.IV.23., 2000.V.16., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.
- Aphodius rufus*** (Moll, 1782) – sárgászöld trágyabogár – Dabas, Göboly-járás, 2002.VII.19., SV; „Örkény”, 1993.VI.30., 1994.VI.29., NL; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VI.30., 1994.IX.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1995.V.29., SGY.
- Aphodius scrutator*** (Herbst, 1789) – vörös trágyabogár – „Örkény”, 1990.VIII.23., NL.
- Aphodius sordidus*** (Fabricius, 1775) – homoki trágyabogár – „Örkény”, 1993.VI.30., 1999.VII.6., NL ; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.IX.8., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1995.V.29., SGY.
- Aphodius sturmi*** Harold, 1870 – vöröses trágyabogár – „Örkény”, fényre, 2013.VII.25., NL; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Aphodius subterraneus*** (Linnaeus, 1758) – barázdás trágyabogár – Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV; Dabas, homoki gyepek, egyelés, 2015.IV.16., GA, MO & NT; „Örkény”, 1992.IV.12., 1993.VI.30., 1997.VII.13., 2002.VI.16., NL ; „Örkény”, 1997.VII.30., MJ.
- Aphodius varians*** Duftschmid, 1805 – változékony trágyabogár – Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV; „Örkény”, 1993.VI.30., 1997.VII.3., NL ; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1995.V.28., SGY; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1996.VII.28., SGY; „Örkény”, homokpuszta, fényre, 1998.VI.9., SGY; „Örkény”, 2004.VII.22., MJ.
- Caccobius schreberi*** (Linnaeus, 1767) – lakkfényű trágyatúró – „Örkény”, 1993.VI.30., 2002.VI.16., 2010.V.2., NL; „Örkény”, 1997.VII.30., MJ; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., 2012.VII.6., MO.
- Cetonia aurata*** (Linnaeus, 1758) – aranyos virágbogár – Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.17., MO; „Örkény”, 2002.VI.16., NL.
- Chaetopteroptia segetum*** (Herbst, 1783) – rozsszipoly – Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2004.V.30., 2004.V.31., SZG; Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO; „Örkény”, 1998.VI.16., 2003.VI.16., NL; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.3., MO.

- Copris lunaris*** (Linnaeus, 1758) – közönséges holdszarvú-ganéjtúró – „Örkény”, 1993.VI.30., 2010.V.2., NL; „Örkény, Ilonamajor”, lótrágyából, 1993.VIII.3., 1993.VIII.10., 1994.V.30., SD.
- Diastictus vulneratus*** (Sturm, 1805) – kétgödrös trágyabogár – Táborfalva-9, 2012.VI.17., MO.
- Euheptaulacus sus*** (Herbst, 1783) – bordás trágyabogár – Dabas, Gyón, autós-hálózás este, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, 1993.VI.30., NL; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VIII.3., 1993.VIII.10., 1998.VII.13., SD; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VII.31., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1995.VIII.3., SGY; „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1996.VII.28., SGY.
- Euoniticellus fulvus*** (Goeze, 1777) – halványfoltos trágyatúró – „Örkény”, 1993.VI.30., 2010.V.2., NL.
- Hoplia hungarica*** Burmeister, 1844 – homoki virágcserebogár – Dabas, Rákóczi erdeje, talajcsapda, 2015.VI.27., MO; „Örkény”, homokpusztarét, talajcsapda, 1999.VI.17., HG & MO.
- Maladera holosericea*** (Scopoli, 1772) – bársonyos kiscserebogár – Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2004.V.30., SG; „Örkény”, 2002.V.3., MJ; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO; Táborfalva-7, 2015.IV.16., MO.
- Omaloplia nigromarginata*** (Herbst, 1758) – szegélyes kiscserebogár – Dabas-2, 2012.VI.9., MO; „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 1995.VI.23., MO; „Örkény, Ilonamajor”, 2001.VI.15., SD.
- Omaloplia spiraeae*** (Pallas, 1773) – bajnóca-kiscserebogár – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 1996.VI.2., MO.
- Onthophagus coenobita*** (Herbst, 1783) – rezes trágyatúró – „Örkény”, 1993.IV.3., MJ.
- Onthophagus fracticornis*** (Preyssler, 1790) – bronzos trágyatúró – „Örkény”, 1993.IV.3., MJ; „Örkény”, 1994.VI.29., 2007.III.15., 2010.V.2., NL; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, 2012.IV.25., MO.
- Onthophagus furcatus*** (Fabricius, 1781) – villás trágyatúró – Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV; Dabas-3, 2012.VI.9., MO; „Örkény”, 1993.IV.3., 1997.VII.27., 1997.VII.30., MJ; „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 1996.VI.2., 2010.V.6., MO; „Örkény”, 1999.VII.6., 2002.VI.16., 2010.IV.25., 2010.V.2., NL; „Örkény, Ilonamajor”, trágyából, 2010.X.10., SD; „Örkény”, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva-5, 2015.VI.27., 2015.IX.12., 2015.X.10., MO; Táborfalva-6, 2015.IX.12., MO; Táborfalva-7, 2015.VI.13., MO; Táborfalva-9, 2015.VI.12., MO; Táborfalva,


- gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Onthophagus gibbulus*** (Pallas, 1781) – bütykös trágyatúró – „Örkény”, 1993.VI.30., 1994.VI.29., NL.
- Onthophagus illyricus*** (Scopoli, 1763) – tülkös trágyatúró – Dabas-3, 2012.VI.9., MO; „Örkény”, 1993.VI.30., NL; „Örkény, Ilonamajor”, trágyából, 1994.VIII.10., SD; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., MO.
- Onthophagus nuchicornis*** (Linnaeus, 1758) – homoki trágyatúró – „Örkény”, 1993.IV.3., 1997.VII.30., MJ; „Örkény”, 1993.VI.30., 1997.VII.3., 2002.VI.16., NL; Táborfalva, Vezetési pálya, homoki gyep, egyelés, 2015.IV.26., MO.
- Onthophagus ovatus*** (Linnaeus, 1767) – apró trágyatúró – Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.VIII.2., SG; „Örkény”, 1997.VII.30., MJ; „Örkény”, 2010.V.2., NL.
- Onthophagus ruficapillus*** (Brullé, 1832) – füstös trágyatúró – Dabas, Rektor-hegy környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV; „Örkény”, 1993.IV.3., 1997.VII.30., MJ; „Örkény”, 1994.VII.3., 2002.VI.16., NL.
- Onthophagus taurus*** (Schreber, 1759) – szarvas trágyatúró – „Örkény”, 1993.VI.30., 2010.V.2., NL.
- Onthophagus vitulus*** (Fabricius, 1776) – ürgevendég trágyatúró – „Örkény”, 1992.IV.12., NL.
- Oryctes nasicornis*** (Linnaeus, 1758) – orrszarvú bogár (26. ábra) – Dabas, Rákóczi erdeje, fényre, 2015.VI.13., MO; „Örkény, Ilonamajor”, 1994.VI.30., SD; „Örkény”, 1996.VII.7., MJ; „Örkény”, 1997.VII.16., NL; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Oxyomus sylvestris*** (Scopoli, 1763) – fogasvállú trágyabogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO.
- Oxythyrea funesta*** (Poda, 1761) – sokpettyes virágbogár – Dabas-2, 2012.V.20., MO; „Örkény”, 2002.VI.16., 2003.VI.16., NL; Táborfalva-9, 2012.VI.9., MO.
- Pentodon idiota*** (Herbst, 1789) – butabogár – „Örkény”, 1998.VI.16., NL; „Örkény”, homokpuszta, egyelés, 2006.V.14., GZ, MO & PA.
- Pleurophorus caesus*** (Panzer, 1796) – hengeres trágyabogár – Dabas, Felső-Eső, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VI.30., 1994.VII.29., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.IX.8., SGY & SG; „Örkény”, 1997.VII.3., 1999.VII.6., NL; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., 2012.VI.3., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Polyphylla fullo*** (Linnaeus, 1758) – csapó cserebogár – „Örkény”, 1993.VI.30., 1997.VII.3., NL; „Örkény, Ilonamajor”, 1994.VI.30., 1998.VII.13.,

- 2001.VI.15., 2001.VI.15., 2004.VII.17., SD; „Örkény”, 1999.VII.13., MJ; Táborfalva-8, 2012.VI.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Protaetia affinis*** (Andersch, 1797) – smaragdzöld virágbogár (28. ábra) – Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Dabas, Nagy robbantó, 2015.VII.17., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.VI.27., 2015.VII.17., MO; Dabas, Dabasi Turjános, boroscsapda, 2015.VII.17., MO; Táborfalva, gyakorlótér, boroscsapda, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, boroscsapda, 2015.VII.11., MO.
- Protaetia cuprea obscura*** (Andersch, 1797) – olajzöld virágbogár – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Dabasi Turjános, boroscsapda, 2015.VI.27., 2015.VII.17., MO; „Örkény”, 1997.VII.16., 2001.VI.15., 2002.VI.16., 2003.VI.16., NL; Táborfalva-9, 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; Táborfalva, gyakorlótér, boroscsapda, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO.
- Protaetia speciosissima*** (Scopoli, 1786) – pompás virágbogár (27. ábra) – Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Dabas, Nagy robbantó, boroscsapda, 2015.VI.27., 2015.VII.17., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, boroscsapda, 2015.VI.27., 2015.VII.17., MO; Dabas, Dabasi Turjános, boroscsapda, 2015.VI.27., 2015.VII.17., MO; „Örkény”, 1993.VII.25., 2003.IV.4., 2003.IV.10., MJ; „Örkény, Ilonamajor”, 2001.VI.15., SD; Táborfalva, gyakorlótér, boroscsapda, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, boroscsapda, 2015.VI.21., 2015.VII.11., MO.
- Protaetia ungarica*** (Herbst, 1790) – magyar virágbogár (25. ábra) – Dabas, HM-lőtér, egyelés, 20012.V.27., 2012.VI.7., SV; Dabas, Dabasi Turjános, mezei aszatról, 2015.VI.27., MO.
- Psammodius asper*** (Fabricius, 1775) – homoktúró trágyabogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.31., 2012.VI.3., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Psammodius pierottii*** Pittino, 1979 – sörtésarcú trágyabogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.20., 2012.V.31., 2012.VI.3., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Rhyssalus germanus*** (Linnaeus, 1767) – barázdásnyakú trágyabogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.3., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Scarabaeus typhon*** (Fischer von Waldheim, 1823) – óriás-galacsinhajtó – Dabas, katonai lőtér, autós hálózás este, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, 1993.VII.19.,

- 1993.VII.25., 1993.VIII.1., 1993.VIII.3., 1993.VIII.4., MJ; „Örkény, Ilonamajor”, lótrágyából, 1993.VIII.3., 1993.VIII.10., 1994.VI.30., 1994.VII.29., 1994.VIII.7., 1994.VIII.10., SD; „Örkény”, homokpuszta, lótrágyából, 1994.VI.30., SGY; „Örkény”, homokpuszta, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, lótrágyából, 1994.VII.31., SGY & SG; „Örkény”, 1994.VIII.1., NL; „Örkény”, homokpuszta, egyelés, trágyából, 1995.V.21., SGY; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, egyelés, 1995.V.29., SGY; „Örkény”, homokpuszta, egyelés trágyából, 1995.V.31., SGY; Táborfalva (Örkény-Tatárszentgyörgy), 100 m, *Festucetum vaginatae*, friss lótrágyából, 1993.VIII.5., ÁL; Táborfalva, 2005.V.6., 2008.IX.16., BS, SK & BZS; Táborfalva, 2017.X.6., BZS.
- Serica brunnea*** (Linnaeus, 1758) – homoki kiscserebogár – „Örkény”, 1994.VI.30., 1999.VII.6., NL; „Örkény”, 1996.VII.7., MJ; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.24., MO.
- Tropinota hirta*** (Poda, 1761) – bundás virágbogár – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2004.V.31., SZG; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.8., SV; „Örkény”, 2007.III.15., NL.

Buprestidae – Díszbogárfélék

- Acmaeoderella mimonti*** (Boieldieu, 1865) – homoki zömökdíszbogár (15. ábra) – Dabas-1, 2012.VI.24., MO; Dabas-4, 2012.VI.30., MO; Dabas, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Dabas, Nagy robbantó, *Eryngium campestre* virágzatáról, 2015.VII.17., 2015.VIII.1., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, *Eryngium campestre* virágzatáról, 2015.VIII.1., MO; „Örkény, Ilonamajor”, *Eryngium campestre*, 1994.VII.20., SD; „Örkény, Ilonamajor”, virágon, 1998.VI.11., SD; „Örkény”, 2002.V.23., 2002.V.30., 2002.VI.24., 2002.VII.2., 2003.V.28., 2003.VI.4., 2003.VI.7., 2003.VI.10., 2004.VI.9., 2005.VI.21., 2005.VII.26., MJ; „Örkény”, homoki gyepek, fűhálózás, egyelés, 2011.VI.26., MO & BN; Táborfalva, gyakorlótér, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., 2015.VII.12., 2012.VII.15., MO.
- Agrilus albogularis*** Gory, 1841 – öröm-karcsúdíszbogár (35. ábra) – Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2004.V.31., 2004.VIII.1., SZG; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; „Örkény”, 2000.VIII.3., 2002.VI.26., MJ; „Örkény”, fűhálózás, 2003.VI.10., GA, GZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, 2012.VI.3., MO.
- Agrilus ater*** (Linnaeus, 1767) – hatpettyes karcsúdíszbogár – „Örkény”, 2002.V.16., 2002.V.23., 2002.V.25., 2003.V.28., 2003.VI.4., 2004.VI.9., MJ.



35–43. ábrák. Díszbogarak a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótérrel. 35 = üröm-karcsúdíszbogár (*Agrilus albogularis*); 36 = cinegefűz-karcsúdíszbogár (*Agrilus salicis*); 37 = tűzeshasú díszbogár (*Chrysobothris igniventris*); 38 = nyárfadíszbogár (*Dicerca aenea*); 39 = redős hengerdíszbogár (*Paracylindromorphus subuliformis*); 40 = szeplős díszbogár (*Poecilonota variolosa*); 41 = sávós gyalogdíszbogár (*Sphenoptera substriata*); 42 = foltos fürgedíszbogár (*Trachypteris picta decastigma*); 43 = varfű-vájárdíszbogár (*Trachys troglodytes*). Az ábrák nem méretarányosak (fotók: Rahmé Nikola)

- Agrilus hyperici* (Creutzer, 1799) – orbáncfű-karcsúdíszbogár – „Örkény”, homokpusztaréti, fűhálózás, 1994.VII.3–5., 1999.VI.17., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-8, 2012.V.11., 2012.VI.9., 2012.VI.17., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SZG.
- Agrilus pratensis* (Ratzeburg, 1837) – kétszínű karcsúdíszbogár – „Örkény”, 2002.V.16., 2003.VI.4., MJ.
- Agrilus salicis* J. Frivaldszky, 1877 – cinegefűz-karcsúdíszbogár (36. ábra) – „Örkény”, 1994.VII.3–5., 1996.VI.2., 1999.VI.17., MO; „Örkény, Ilonamajor”, *Salix rosmarinifolia*, 1998.VI.11., SD; „Örkény”, 1995.VI.25., 2002.V.16., 2002.V.23., 2002.V.30., 2002.VI.26., 2003.V.28., 2004.V.30., 2005.VI.21., MJ; Táborfalva-8, 2012.V.11., 2012.VI.9., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO.
- Agrilus suvorovi* Obenberger, 1935 – nyárfa-karcsúdíszbogár – „Örkény”, 2002.V.8., 2002.V.16., 2002.V.23., 2002.V.30., 2003.V.28., MJ.
- Anthaxia cichorii* (Olivier, 1790) – katáng-virágdíszbogár – Dabas-2, 2012.VI.30., MO.
- Anthaxia fulgurans* (Schrank, 1789) – közönséges virágdíszbogár – Dabas-4, 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO.
- Anthaxia godeti* Gory et Laporte, 1839 – Godet-virágdíszbogár – „Örkény”, 2002.V.16., 2004.VI.9., MJ.
- Anthaxia nitidula* (Linnaeus, 1758) – ragyogó virágdíszbogár – Dabas-4, 2012.V.20., MO; „Örkény”, 2005.V.29., MO.
- Anthaxia quadripunctata* (Linnaeus, 1758) – fekete virágdíszbogár – „Örkény”, 2005.V.21., MJ.
- Anthaxia signaticollis* Krynicki, 1832 – keleti virágdíszbogár – „Örkény”, 2005.V.22., MJ.
- Aphanisticus emarginatus* (Olivier, 1790) – szegélyes törpedíszbogár – „Örkény”, 2003.V.28., MJ; „Örkény”, 2006.V.14., GZ, MO & PA.
- Aphanisticus pusillus* (Olivier, 1790) – zömök törpedíszbogár – Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., SZG.
- Chrysobothris igniventris* Reitter, 1895 – tűzeshasú díszbogár (37. ábra) – „Örkény”, 2002.V.15., 2002.V.21., MJ.
- Coraebus elatus* (Fabricius, 1787) – pimpó-díszbogár – Dabas-1, 2012.VI.30., MO; Dabas-2, 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., 2004.VIII.2., SZG; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.VIII.10., SZG; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2004.VIII.10., SZG; „Örkény, Ilonamajor”, fűhálózva, 1998.VI.11., SD; „Örkény”, homokpusztaréti, fűhálózás, 1999.VI.17., 2005.V.29., MO; „Örkény”, 2003.VI.4., MJ; Táborfalva-7, 2012.V.20., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG.

- Cylindromorphus filum*** (Gyllenhal, 1817) – nagyfejű hengerdíszbogár – Dabas-1, 2012.VI.3., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.30., MO; „Örkény”, 1994.VII.3–5., MO; „Örkény, Ilonamajor”, fűhálózva, 1998.VI.11., SD; „Örkény”, 2003.V.28., 2003.VI.4., 2005.V.30., 2005.VI.21., MJ; „Örkény”, homokpuszta, 2009.VI.16., NT & RN; Táborfalva-5, 2012.VI.9., 2012.VI.24., MO; Táborfalva-7, 2012.V.20., 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., MO; Táborfalva-10, 2012.V.11., 2012.VI.3., 2012.VII.20., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepp, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Dicerca aenea*** (Linnaeus, 1760) – nyárfadíszbogár (38. ábra) – Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.IV.16., GA, MO & NT; Dabas, Rektor-hegy környéke, kopogtatás, 2013.IV.29., NT; Dabas, Külső-Mántekek környéke, egyelés, 2014.VI.27., SV; „Örkény”, 1994.VII.3., MO; „Örkény”, 2000.VII.3., 2002.V.16., 2002.V.23., 2002.V.25., 2002.VI.24., 2002.VI.26., 2002.VII.2., 2003.V.28., 2003.VI.4., 2003.VI.7., 2003.VI.10., 2004.VI.9., 2005.V.22., 2005.VI.21., MJ; Táborfalva-6, 2012.VI.17., MO.
- Paracylindromorphus subuliformis*** (Mannerheim, 1837) – redős hengerdíszbogár (39. ábra) – Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., 2004.VIII.2., SZG; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG.
- Phaenops formaneki*** Jakobson, 1913 – Formának-fürgedíszbogár – „Örkény”, 2004.VI.9., MJ.
- Poecilontha variolosa*** (Paykull, 1799) – szeplős díszbogár (40. ábra) – „Örkény”, 2002.V.8., 2002.V.23., 2002.VI.24., 2002.VI.26., 2002.VII.2., 2003.V.28., 2003.VI.4., 2003.VI.7., 2003.VI.10., 2003.VI.28., 2004.VI.9., 2005.VI.21., MJ.
- Sphenoptera cauta*** Jakovlev, 1904 – apró gyalogdíszbogár – Dabas-4, 2012.VI.30., MO; „Örkény”, 2002.V.30., 2002.VI.24., MJ; Táborfalva-6, 2012.VI.30., MO.
- Sphenoptera substriata*** (Krynicky, 1834) – sávós gyalogdíszbogár (41. ábra) – Dabas, HM-lőtér, 2004.VIII.1., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; „Örkény, Ilonamajor”, fűhálózva, 2001.VI.15., SD; „Örkény”, 2002.VI.24., 2002.VI.26., 2002.VII.2., 2003.VI.4., 2003.VI.10., 2005.VI.21., MJ.
- Trachypteris picta decastigma*** (Fabricius, 1787) – foltos fürgedíszbogár (42. ábra) – „Örkény”, 2002.V.16., 2002.V.23., 2002.V.25., 2003.V.28., 2003.VI.4., 2003.VI.10., 2004.VI.9., 2005.VI.21., MJ.
- Trachys minuta*** (Linnaeus, 1758) – fűz-vájárdíszbogár – Dabas-1, 2012.VI.24., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., 2004.VIII.2., SZG; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; „Örkény, Ilonamajor”, *Salix rosmarinifolia*, 1998.VI.11., SD; „Örkény”,

2002.V.16., 2002.V.30., 2003.VI.7., MJ; Táborfalva-8, 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2012.VII.15., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., MO; Táborfalva-10, 2012.V.11., 2012.VI.9., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SZG.

Trachys puncticollis rectilineatus Abeille de Perrin, 1900 – szulák-vájárdíszbogár – Dabas-2, 2012.VI.30., MO.

Trachys troglodytes Gyllenhal, 1817 – varfű-vájárdíszbogár (43. ábra) – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.VI.9., MO; Táborfalva, XX. csatorna, rostálás, 2010.III.8., SV.

Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918 – mályva-vájárdíszbogár – Dabas, Dabasi Turjános, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.

Limnichidae – Partibogárfélék

Pelochares versicolor (Waltl, 1838) – fogasnyakú partibogár – Táborfalva, gyakorkorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Byrrhidae – Labdacsbogárfélék

Chaetophora spinosa (Rossi, 1794) – parti labdacsbogár – Táborfalva, gyakorkorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., MO.

Morychus aeneus (Fabricius, 1775) – fémes labdacsbogár – „Örkény”, homokpusztaréti, fűhálózás, 1995.VII.19., OA; „Örkény”, homokbánya, egyelés, 1999.VI.17., MO; „Örkény”, homokpusztaréti, fűhálózás, egyelés, 2000.IV.12., MO.

Heteroceridae – Iszapbogárfélék

Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) – foltos iszapbogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 2004.VII.17., SD.

Heterocerus fuscus Kiesenwetter, 1843 – sárgatérdű iszapbogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., SD.

Heterocerus obsoletus Curtis, 1828 – sötét iszapbogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., SD.

Eucnemidae – Tövisnyakúbogár-félék

Dirrhagofarsus attenuatus (Mäklin, 1845) – keskeny tövisnyakúbogár – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorkorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., MO.

Microrhagus lepidus (Rosenhauer, 1847) – csinos tövisnyakúbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.

Elateridae – Pattanóbogár-félék

Adrastus limbatus (Fabricius, 1777) – ligeti cserjepattanó – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Adrastus rachifer (Geoffroy, 1785) – közönséges cserjepattanó – Dabas, Gyón, kiszáradó láprét, fűhálózás, 1994.VII.3., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.24., 2012.VII.6., MO.

Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) – vetési pattanó – Dabas, Göboly-járás, 2009.IV.11., MO, NT & BG.

Agriotes modestus Kiesenwetter, 1858 – szürke pattanó – Dabas, Rákóczi erdeje, fényre, 2015.VI.13., MO; „Örkény”, homokpuszta, fényre, 1995.V.29., 1998.VI.9., SGY; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 2004.VII.17., SD.

Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) – réti pattanó – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Dabas-3, 2012.V.25., 2012.VI.3., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, egyelés, 2009.IV.11., MO & NT.

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – egérszínű pikkelyespattanó – Dabas-3, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.3., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) – cinóbervörös pattanó – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.

Ampedus glycerus (Herbst, 1784) – hosszúkás pattanó – „Örkény”, nyáras, egyelés, 2007.IV.22., MO.

Ampedus pomonae (Stephens, 1830) – ráncosnyakú pattanó – Táborfalva, gyakorlótér, egyelve, 2012.III.8., SV.

Ampedus pomorum (Herbst, 1784) – rozsdás pattanó – Táborfalva, gyakorlótér, egyelve, 2012.III.8., SV.

Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) – rőtörös pattanó – „Örkény”, nyáras, egyelés, 2007.IV.22., MO.

Ampedus sanguinolentus (Schränk, 1776) – középfoltos pattanó – Dabas, HM-lőtér, kérgezés, 2013.II.13., SV; Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.IV.16., GA, MO & NT; Táborfalva, homoki gyeper, fűhálózás, 2012.IV.25., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO.

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) – szurkos pattanó – Dabas-4, 2012.V.20., MO; Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.17., MO.

- Cardiophorus asellus*** Erichson, 1840 – homoki szívespattanó – „Örkény”, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Tatárszentgyörgy, HM-lőtér, hálózva, 2015. IV.16., SV; Táborfalva, HM-lőtér, talajcsapda, 2014.IV.6., 2014.IV.12., 2016. IV.14., 2015.III.26., 2017.III.15., SV; Táborfalva, 2015.IV.16., GA, NT & MO.
- Cardiophorus discicollis*** (Herbst, 1806) – korongfoltos szívespattanó – Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-7, 2015.VI.21., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Cidnopus pilosus*** (Leske, 1785) – szőrös pattanó – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO.
- Cidnopus ruzenae*** (Laibner, 1977) – fémfekete pattanó – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, egyelés, 2000.IV.12., MO; Táborfalva, lőtér, homoki gyep, egyelés, 2008.IV.4., MO.
- Dicronychus cinereus*** (Herbst, 1784) – szürke szívespattanó – Dabas-1, 2012. VI.3., MO; Dabas-4, 2012.V.20., 2012.VI.3., 2012.VII.15., MO.
- Dicronychus equiseti*** (Herbst, 1784) – zsurló-szívespattanó – Dabas-4, 2015. IV.16., MO; Dabas, Nagy robbantó, 2015.IV.16., MO; „Örkény”, homokpusztarét, egyelés, 2005.IV.16., MO; „Örkény”, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, HM-lőtér, 2014.IV.6., 2014.IV.12., SV; Táborfalva-5, 2015. IV.16., MO.
- Dicronychus equisetioides*** Lohse, 1976 – ólmos szívespattanó – Dabas, Göboly-járás, homokos rét, fűhálózás, egyelés, 2009.IV.11., MO & NT; Tatárszentgyörgy, HM-lőtér, 2017.III.15., KA & SV.
- Dicronychus rubripes*** (Germar, 1824) – kis szívespattanó – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.V.25., 2012.VI.3., MO; Dabas-2, 2012.V.20., 2012.V.25., 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; Dabas-3, 2012.V.25., 2012.VI.3., 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; „Örkény, Ilonamajor”, fűhálózva, 1998.VI.11., SD; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva-7, 2012.V.20., MO; Táborfalva-8, 2012.V.11., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Drasterius bimaculatus*** (Rossi, 1790) – változékony pattanó – Dabas-4, 2012. VII.15., MO; „Örkény”, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV.
- Drilus concolor*** Ahrens, 1812 – fekete csigabogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO.
- Melanotus crassicollis*** (Erichson, 1841) – vállas gyáspattanó – Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.24., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.V.31., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012. VI.9., MO; Táborfalva, gyakorlótér, boroscsapda, 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Melanotus villosus*** (Geoffroy, 1785) – vöröslábú gyáspattanó – Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.30., MO.

Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840) – pusztai szívespattanó (17. ábra) – „Örkény”, homokpuszta, 2009.VI.16., NT & RN.

Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) – kis kockáspattanó – Dabas-4, 2012.VI.3., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO.

Selatosomus pasticus (Ménétriés, 1832) – széles pattanó – Dabas-2, 2012.V.25., 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2015.IV.26., 2015.V.31., MO.

Lampyridae – Szentjánosbogár-félék

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767) – nagy szentjánosbogár – Dabas-2, 2015.IX.12., MO; Dabas-3, 2015.IX.12., MO; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., 1998.VII.13., SD; Táborfalva-5, 2015.X.10., MO; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.24., MO.

Cantharidae – Lágybogárfélék

Cantharis lateralis Linnaeus, 1758 – szegélyes lágybogár – Dabas-1, 2012.VI.9., MO.

Cantharis rufa Linnaeus, 1758 – rőt lágybogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Cantharis rustica Fallén, 1807 – suszterbogár – Táborfalva-9, 2012.V.11., MO.

Malthodes minimus (Linnaeus, 1758) – sárganyakú törpelágybogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) – feketevégű lágybogár – Dabas-4, 2012.VII.15., MO.

Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860 – feketecombú lágybogár – Dabas-3, 2012.V.20., MO.

Dermestidae – Porvafélék

Dermestes bicolor Fabricius, 1781 – fészeklakó porva – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Dermestes frischii Kugelann, 1792 – nyakszegélyes porva – Táborfalva-10, 2015.VI.13., MO.

Dermestes laniarius Illiger, 1801 – gyászos porva – Dabas-1, 2012.VI.24., MO.

Dermestes undulatus Brahm, 1790 – márványos porva – Táborfalva-7, 2015.VI.13., MO; Táborfalva-10, 2015.VI.13., MO.

Phradonoma villosulum (Duftschmid, 1825) – pusztai porva – Dabas-3, 2012. VI.9., 2012.VI.30., MO; Dabas-4, 2012.VI.30., MO; Dabas, Gyón, homoki gyep, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Dabas, Nagy robbantó, 2015.VII.17., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.VIII.1., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-6, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, 2015.VII.11., MO.

Ptinidae – Álszűfélék

Dignomus nitidus (Duftschmid, 1825) – fényes tolvajbogár (16. ábra) – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Dorcatoma substriata Hummel, 1829 – rövidszőrű taplóálszű – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., MO.

Ernobius mollis (Linnaeus, 1758) – közönséges tobozálszű – Dabas, Gyón, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.25., MO.

Gastrallus laevigatus (A. G. Olivier, 1790) – simított álszű – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Lasioderma redtenbacheri (Bach, 1852) – halvány imolaálszű – Dabas-2, 2012. VI.24., 2012.VI.30., MO; Dabas-3, 2012.VI.9., 2012.VI.30., 2012.VII.6., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.6., 2012.VII.20., MO.

Ptinomorphus regalis (Duftschmid, 1825) – rajzos álszű – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Ptinus rufipes A. G. Olivier, 1790 – vöröslábú tolvajbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.3., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fűhálózás, kopogtatás, 2012.V.11., SV.

Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758) – kenyérbogár – Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.

Xestobium rufovillosum (DeGeer, 1774) – nagy álszű – Táborfalva-8, 2012. VI.17., MO.

Xyletinus distinguendus Kofler, 1970 – ligeti szerecsenálszű – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Xyletinus fibyensis Lundblad, 1949 – északi szerecsenálszű – Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.

Xyletinus laticollis (Duftschmid, 1825) – szélesnyakú szerecsenálszű – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.V.20., MO; „Örkény”, 2001.VI.12., PA; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.11., 2012.VI.17., MO.

Xyletinus longitarsis Jansson, 1942 – hosszúlábú szerecsenálszú – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Xyletinus pseudoblongulus Gottwald, 1977 – félkörös szerecsenálszú – „Örkény”, homokpusztarét, autóshálózás, 2000.V.16., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Xyletinus subrotundatus Lareynie, 1852 – sörtésnyakú szerecsenálszú – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 2006.V.14., GZ, MO & PA; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Bostrichidae – Csuklyásszúfélék

Lichenophanes varius (Illiger, 1801) – tarka csuklyásszú – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Scobicia chevrieri (A. Villa et J. B. Villa, 1835) – pilláshomlokú csuklyásszú – „Örkény”, homokpuszta, nyáras szegélye, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.IX.8., 1995.V.29., SGY & SG.

Biphyllidae – Álporvafélék

Biphyllus lunatus (Fabricius, 1792) – kétfoltos álporva – Dabas, Dabasi Turjános, taplóról, 2015.IV.12., MO.

Trogossitidae – Korongbogárfélék

Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758) – lisztmentő korongbogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VIII.10., SD.

Cleridae – Szúfarkasfélék

Necrobia rufipes (DeGeer, 1775) – vöröslábú hullabogár – Táborfalva-7, 2012.IX.29., MO; Táborfalva-8, 2012.VII.15., MO.

Necrobia violacea (Linnaeus, 1758) – kék hullabogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Táborfalva-7, 2012.IX.29., MO.

Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) – vöröslábú szúfarkas – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, egyelés, 2010.III.23., SV.

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – szalagos méhészbogár – Dabas, Nagy robbantó, *Eryngium campestre* virágzatáról, 2015.VII.17., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, *Eryngium campestre* virágzatáról, 2015.VIII.1., MO.

Dasytidae – Karimásbogár-félék

- Dasytes fuscus*** (Illiger, 1801) – sárgalábú karimásbogár – Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO.
- Dasytes plumbeus*** (O. F. Müller, 1776) – ólmos karimásbogár – Dabas-2, 2012.VI.24., MO; Dabas-3, 2012.VI.24., MO.
- Dolichosoma lineare*** (Rossi, 1792) – ösztövér karimásbogár – Dabas-3, 2012.V.20., MO; Táborfalva-7, 2012.V.20., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO.

Malachiidae – Bibircsesbogár-félék

- Axinotarsus marginalis*** (Laporte, 1840) – feketefüggős bibircsesbogár – Dabas-4, 2012.V.20., MO; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO.
- Axinotarsus ruficollis*** (Olivier, 1790) – vöröstorú bibircsesbogár – Dabas, Gyón, kiszáradó láprét, fűhálózás, 1994.V.17., MO.
- Charopus concolor*** (Fabricius, 1801) – egyszínű bibircsesbogár – Dabas, Gyón, kiszáradó láprét, fűhálózás, 1994.V.17., MO; Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO.
- Charopus thoracicus*** Morawitz, 1861 – homoki bibircsesbogár – „Örkény”, homokpusztaréti, fűhálózás, 2005.V.29., MO.
- Clanoptilus ambiguus*** (Peyron, 1877) – alföldi bibircsesbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Clanoptilus geniculatus*** (Germar, 1824) – sárgaarcú bibircsesbogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.V.25., MO.
- Clanoptilus strangulatus*** (Abeille de Perrin, 1885) – feketecsápú bibircsesbogár – Dabas-2, 2012.V.25., MO.
- Cordylepherus viridis*** (Fabricius, 1787) – zöld bibircsesbogár – Dabas-3, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO.
- Ebaeus flavicornis*** Erichson, 1840 – sárgacsápú bibircsesbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., MO.
- Malachius bipustulatus*** (Linnaeus, 1758) – kétfoltos bibircsesbogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., MO.
- Protapalochrus flavolimbatus*** (Mulsant et Rey, 1853) – déli bibircsesbogár – Dabas, kiszáradó láprét, fűhálózás, 2015.VII.17., MO.

Sphindidae – Áltaplószú-félék

Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) – barázdáshomlokú gömböc-áltaplószú – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO.

Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) – közönséges áltaplószú – „Örkény”, 1999.VII.21., PA; „Örkény”, homokpuszta, 2009.VI.16., NT & RN; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.V.20., 2012.VII.20., MO.

Nitidulidae – Fénybogárfélék

Amphotis marginata (Fabricius, 1781) – hangyász fénybogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.

Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775) – repce-fénybogár – Dabas-3, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.30., MO.

Carpophilus bipustulatus (Heer, 1841) – kétjegyű gyümölcsfénybogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835) – amerikai fénybogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.III.23., MO.

Soronia grisea (Linnaeus, 1758) – pettyezetett fénybogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., 1994.VII.29., SD; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Stelidota geminata (Say, 1825) – számóca-fénybogár – Dabas-2, 2012.VI.3., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Xerogethes discoideus (Erichson, 1845) – repcsény-fénybogár – „Örkény”, homokpusztaréti, fűhálózás, 2005.VII.6., MO & GA; „Örkény”, homokpuszta, 2010.V.8., MO.

Cybocephalidae – Pajzstetvézbogárfélék

Cybocephalus pulchellus Erichson, 1845 – zöldfényű pajzstetvézbogár – „Örkény”, homokpusztaréti, fűhálózás, 1994.VII.3–5., MO.

Monotomidae – Törekbogárfélék

Monotoma longicollis Gyllenhal, 1827 – hosszúnyakú törekbogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.V.3., 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VII.6., MO.

Monotoma picipes Herbst, 1793 – közönséges törekbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO.

Silvanidae – Fogasnyakú-lapbogárfélék

Ahasverus advena (Waltl, 1834) – alomlakó fogasnyakú-lapbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Psammoecus bipunctatus (Fabricius, 1792) – kétpettyes fogasnyakú-lapbogár – Táborfalva-10, 2012.VI.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.30., 2012.VII.20., MO.

Silvanus unidentatus (Olivier, 1790) – rozsdás fogasnyakú-lapbogár – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO.

Uleiota planatus (Linnaeus, 1760) – hosszúcsápú fogasnyakú-lapbogár – Dabas-4, 2012.V.20., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Cucujidae – Lapbogárfélék

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – skarlátbogár (8. ábra) – Dabas-4, 2012.V.20., MO; Dabas, Esső, egyelés, 2013.II.13., SV; Dabas, Nagy robbantó, 2015.IV.16., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.IV.16., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kéreg alól; 2012.IV.30., 2012.V.25., 2015.IX.12., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, egyelés, 2013.II.13., SV; Táborfalva, Betyár-domb, egyelés, 2015.II.12., CA, NA & SV.

Laemophloeidae – Szegélyeslapbogár-félék

Notolaemus castaneus (Erichson, 1845) – gesztenyebarna szegélyeslapbogár – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO.

Placonotus testaceus (Fabricius, 1787) – tölgy-szegélyeslapbogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO.

Cryptophagidae – Penészbogárfélék

Atomaria apicalis Erichson, 1846 – végfoltos kispénészbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO.

Cryptophagus acutangulus Gyllenhal, 1828 – horgas penészbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás délután, 2012.X.22., MO.

Cryptophagus denticulatus Heer, 1841 – fogacskás penészbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.11., 2012.X.22., MO.

Cryptophagus punctipennis C. Brisout de Barneville, 1863 – közönséges penészbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO.

Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758) – svéd penészbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás délután, 2012.X.22., MO.

Telmatophilus brevicollis Aubé, 1862 – barna gyékénybogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Telmatophilus caricis (Olivier, 1790) – keskenytorú gyékénybogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.IV.30., MO.

Phalacridae – Kalászbogárfélék

Phalacrus fimetarius (Fabricius, 1775) – közönséges kalászbogár – Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyeper, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.

Erotylidae – Tarbogárfélék

Cryptophilus integer (Heer, 1841) – halvány szőröstarbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.

Leucohimatium langii (Solsky, 1866) – sárgás karcsútarbogár – „Örkény”, homokpusztaréti fényre, 1999.VII.21., HG & PA. – Az adat szerepel MERKL (2004) dolgozatában, melyben a fajokat a magyarországi faunára újként közölte.

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 – feketenyakú tarbogár – „Örkény”, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV.

Teredidae – Humuszbogárfélék

Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796) – hengeres humuszbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Endomychidae – Álbödefélék

Lycoperdina succincta (Linnaeus, 1767) – szalagos pöfetegálböde – Dabas, Rákóczi erdeje, rostálás, 2015.III.31., SV.

Holoparamesus caularum (Aubé, 1843) – közönséges szénaálböde – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO.

Coccinellidae – Katicabogár-félék

Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – szemfoltos katica – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VII.31., SGY & SG.

- Anisosticta novemdecimpunctata*** (Linnaeus, 1758) – tizenkilencpettyes katica – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VII.31., SGY & SG; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 2004.VII.17., SD; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Calvia quatuordecimguttata*** (Linnaeus, 1758) – tizennégycseppes füsskata – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Chilocorus bipustulatus*** (Linnaeus, 1758) – szalagos szerecsenkata – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.
- Chilocorus renipustulatus*** (Scriba, 1791) – vesefoltos szerecsenkata – „Örkény”, gyakorlótér, egyelve, 2012.IV.13., NT & SV.
- Clitostethus arcuatus*** (Rossi, 1794) – liszteske-bödice – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO.
- Coccinella magnifica*** Redtenbacher, 1843 – hangyáskatica (18. ábra) – Dabas-1, 2012.VI.30., MO; Dabas-3, 2012.VII.6., MO; „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 1994.VII.3–5., 1996.VI.2., 1999.VI.17., 2005.V.29., 2011.VII.9., MO; „Örkény”, fűhálózás, 2003.VI.10., GZ, GA & MO; „Örkény”, homoki gyepterület, fűhálózás, egyelés, 2011.VI.26., MO & BN; Táborfalva-5, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.24., 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepterület, fűhálózás, 2012.IV.30.; Táborfalva, XX. csatorna, rostálás, 2012.III.8., SV.
- Coccinella septempunctata*** Linnaeus, 1758 – hétpettyes katica – Dabas-1, 2012.VI.30., MO; Dabas-3, 2012.VI.30., MO; Dabas-4, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-6, 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.17., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, egyelés, 2012.III.23., SV.
- Coccinula quatuordecimpustulata*** (Linnaeus, 1758) – feketesárga katóka – Dabas, Gyón, kiszáradó láprét, fűhálózás, 1994.VII.3., MO; Dabas-1, 2012.VI.24., MO; Dabas-3, 2012.VII.6., MO; Dabas-4, 2012.VI.3., MO; „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 1994.VII.3–5., MO; Táborfalva-6, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-8, 2012.V.11., 2012.VI.24., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., 2012.VI.17., MO.
- Exochomus quadripustulatus*** (Linnaeus, 1758) – négyfoltos szerecsenkata – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, egyelés, 2012.III.23., SV.
- Harmonia axyridis*** (Pallas, 1773) – harlekinkatica – „Örkény”, gyakorlótér, nyárfából egyelve, 2012.III.8., SV; „Örkény”, gyakorlótér, egyelés, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, egyelés, 2012.III.8., SV.

- Harmonia quadripunctata*** (Pontoppidan, 1763) – négypettyes katica – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VI.30., 1994.VII.31., 1994.IX.8., SGY & SG; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., SD.
- Hippodamia tredecimpunctata*** (Linnaeus, 1758) – mocsári katica – Dabas-3, 2012.VI.24., MO; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1997.VII.3., SGY & RI; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO.
- Hippodamia variegata*** (Goeze, 1777) – tizenhárompettyes katica – Dabas-1, 2012.VI.30., MO; Dabas-2, 2012.VI.24., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.24., MO; Dabas-4, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-6, 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.9., 2012.VI.17., MO.
- Hyperaspis erythrocephala*** (Fabricius, 1787) – homoki szerecsenbőde – „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 1994.VII.3–5., MO.
- Hyperaspis pseudopustulata*** Mulsant, 1853 – vállcseppes szerecsenbőde – Dabas, Gyón, kiszáradó láprét, fűhálózás, 1994.V.17., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.30., MO.
- Hyperaspis reppensis*** (Herbst, 1783) – tojásdad szerecsenbőde – Dabas-3, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Myrrha octodecimguttata*** (Linnaeus, 1758) – tizennyolccseppes füsskata – „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 2010.V.8., MO.
- Oenopia globata*** (Linnaeus, 1758) – rózsás katica – Dabas-4, 2012.VI.3., MO; „Örkény”, homokpuszta, egyelés, 2005.IV.16., MO; „Örkény”, lőtér, egyelés, 2012.IV.13., NT & SV.
- Parexochomus nigromaculatus*** (Goeze, 1777) – egyszínű szerecsenkata – Dabas-3, 2012.VII.6., MO; Dabas-4, 2012.VI.30., 2012.VII.6., MO; Dabas, Gyón, homoki gyep, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Dabas, Nagy robbantó, 2015.VI.27., 2015.VII.17., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.VI.27., MO; „Örkény, Ilonamajor”, fűhálózva, 2001.VI.15., SD; „Örkény”, fűhálózás, 2003.VI.10., GZ, GA & MO; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, egyelés, 2009.IV.11., MO & NT; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 1994.VII.3–5., 2004.V.16., 2005.V.29., 2010.VII.19., MO; „Örkény”, homoki gyep, fűhálózás, egyelés, 2011.VI.26., MO & BN; Táborfalva-5, 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.24., 2012.VI.30., 2012.IX.29., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, rostálás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, 2015.VI.21., 2015.VI.27., MO; Táborfalva,

- Vezetési pálya, 2015.VII.11., 2015.VII.31., MO; Táborfalva, lőtér, talajcsapda, 2015.III.26., SV.
- Platynaspis luteorubra* (Goeze, 1777) – négypettyes szerecsenkata – Dabas-1, 2012.VI.3., MO; Dabas-4, 2012.VI.17., MO.
- Propylea quatuordecimguttata* (Linnaeus, 1758) – tizennégypettyes fűsskata – Dabas-1, 2012.VI.30., MO; Dabas-3, 2012.VI.24., MO; Dabas-4, 2012.VI.3., 2012.VI.17., MO.
- Psyllobora vigintiduopunctata* (Linnaeus, 1758) – huszonkétpettyes katica – Dabas, Gyón, kiszáradó láprét, fűhálózás, 1994.VII.3., MO; Dabas-2, 2012.VI.30., MO; Dabas-4, 2012.VI.30., 2012.VII.15., MO.
- Rhyzobius chrysomeloides* (Herbst, 1792) – szalagos félböde – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, egyelés, 2012.III.23., SV.
- Scymnus auritus* Thunberg, 1795 – sárgafejű bödice – Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.
- Scymnus doriae* Capra, 1924 – széleslábú bödice – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 1995.VII.19., PA; „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 2000.VI.20., MO; „Örkény”, 2001.VI.12., PA.
- Scymnus frontalis* (Fabricius, 1787) – közönséges bödice – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Dabas-3, 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 2005.VII.6., MO & GA; „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 2006.V.29., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-6, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, fűhálózás, 2012.IV.25., MO.
- Scymnus haemorrhoidalis* Herbst, 1797 – sárgavégű bödice – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.IV.30., MO.
- Scymnus rubromaculatus* (Goeze, 1777) – vörösfoltos bödice – Dabas-4, 2012.VI.3., MO.
- Scymnus schmidtii* Fürsch, 1958 – pontsoros bödice – Táborfalva-9, 2012.V.11., MO.
- Scymnus suffrianioides apetzoides* Capra et Fürsch, 1967 – nagy kerekbödice – Dabas-1, 2012.VI.30., MO; Dabas-4, 2012.VIII.5., MO.
- Stethorus pusillus* (Herbst, 1797) – atkász bödice – Dabas-4, 2012.VI.30., MO; „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 2004.V.16., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.3., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* (Linnaeus, 1758) – lucernaböde – Dabas-4, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.9., 2012.VI.24., MO.
- Tytthaspis sedecimpunctata* (Linnaeus, 1760) – tizenhatpettyes katica – Dabas-1,

2012.VI.3., 2012.VI.30., MO; Dabas-3, 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., MO.

Corylophidae – Pontbogárfélék

Arthrolips obscura (C. R. Sahlberg, 1833) – sötét pontbogár – „Örkény”, nyáras, *Fomes igniarius*-szal benőtt törzsekről, 1999.VI.17., MO.

Arthrolips picea (Comolli, 1837) – szurkos pontbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Latridiidae – Pudvabogárfélék

Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827) – nyúlánk pudvabogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, homokpusztarét, autóshálózás, 2000.IV.23., MO.

Corticaria serrata (Paykull, 1798) – fűrészkesnyakú pudvabogár – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 1999.VI.17., MO; „Örkény”, homokpusztarét, autóshálózás, 2000.IV.23., MO.

Melanophthalma maura Motschulsky, 1866 – mór pudvabogár – „Örkény”, 1999.VII.21., PA.

Mycetophagidae – Gombabogárfélék

Berginus tamarisci Wollaston, 1854 – hengeres gombabogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.

Litargus balteatus LeConte, 1856 – amerikai gombabogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.V.31., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VII.6., MO.

Litargus connexus (Geoffroy, 1785) – szalagos gombabogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO.

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) – hegyi gombabogár – Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) – egyszínű gombabogár – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.V.31., MO; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., SD; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.20., 2012.VI.3., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.

Ciidae – Taplószufélék

- Cis castaneus*** (Herbst, 1793) – sima taplószu – Dabas, Dabasi Turjános, taplóról, 2015.IV.12., MO; „Örkény”, nyáras, *Fomes igniarius*-szal benőtt törzsek-ről, 1999.VI.17., MO.
- Cis micans*** (Fabricius, 1792) – közönséges taplószu – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., MO.
- Ennearthron pruinosulum*** (Perris, 1864) – hárs-taplószu – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.

Zopheridae – Héjbogárfélék

- Bitoma crenata*** (Fabricius, 1775) – szalagos héjbogár – Táborfalva, gyakorlótér, nyárfából, egyelve, 2012.III.8., SV.
- Colobicus hirtus*** (Rossi, 1790) – szegélyes héjbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Pycnomerus terebrans*** (A. G. Olivier, 1790) – bordás héjbogár – Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Synchita separanda*** (Reitter, 1882) – barna héjbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Ripiphoridae – Darázsbogárfélék

- Macrosiagon bimaculata*** (Fabricius, 1787) – sarkantyús darázsbogár (19–20. ábrák) – Dabas-3, 2012.VII.6., MO; Dabas, Nagy robbantó, 2015.VII.17., MO; „Örkény, Ilonamajor”, *Eryngium campestre*, 1994.VI.30., 1994.VII.20., 1995.VII.8., 1998.VII.13., SD; „Örkény”, 1997.VII.30., MJ; Táborfalva-8, 2012.VII.15., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.6., MO.

Melandryidae – Komorkafélék

- Anisoxya fuscata*** (Illiger, 1798) – barna komorka – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VII.20., MO.
- Osphya bipunctata*** (Fabricius, 1775) – kétalakú komorka – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.

Tenebrionidae – Gyászbogárfélék

- Alphitophagus bifasciatus* (Say, 1823) – alomlakó gyászbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012.VI.30., MO.
- Blaps halophila* Fischer von Waldheim, 1822 – pontusi bűzbogár – „Örkény”, katonai lőtér, 2007.IV.22., RN, MO & NT.
- Blaps lethifera* Marsham, 1802 – közönséges bűzbogár – Dabas-2, 2012.VI.17., 2012.VI.30., 2015.V.31., 2015.VI.13., 2015.VII.17., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2015.VII.17., 2015.IX.12., MO; „Örkény, Ilonamajor”, 1994.VI.30., 1994.VII.29., 1994.VIII.10., SD; Táborfalva-5, 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2015.IV.16., 2015.V.17., 2015.IX.12., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva-8, 2015.IV.16., 2015.IV.26., 2015.V.17., 2015.VI.21., 2015.VII.12., 2015.IX.12., MO; Táborfalva-9, 2015.V.31., 2015.VII.12., 2015.IX.12., MO; Táborfalva-10, 2015.V.17., 2015.IX.12., MO.
- Blaps mortisaga* (Linnaeus, 1758) – hosszúlábú bűzbogár – Dabas-4, 2012.V.20., MO.
- Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus, 1767) – bordás taplóbogár – Dabas, Gyón, telepített nyáras, farakásról, 1994.V.17., MO; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG; „Örkény”, homokpusztarét, egyelés, 2000.IV.12., MO.
- Cnemeplatia atropos* Costa, 1847 – törpegyászbogár (34. ábra) – „Örkény, Ilonamajor”, talajon, 1998.VIII.7., SD.
- Crypticus quisquilius* (Linnaeus, 1760) – fűrge gyászbogár – Dabas-3, 2012.VI.9., 2012.VI.17., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-9, 2015.V.17., MO.
- Ctenopus sulphureus* (Linnaeus, 1758) – közönséges kénbogár – Dabas-4, 2012.VII.15., MO.
- Gonocephalum pygmaeum* (Steven, 1829) – homoki gyászbogár – „Örkény, Ilonamajor”, talajon egyelve, 1995.VII.8., SD; „Örkény”, homokpuszta, egyelés, 2005.IV.16., MO; „Örkény”, gyakorlótér, egyelés, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva-8, 2015.V.17., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.24., MO.
- Hymenalia rufipes* (Fabricius, 1792) – rótlábú alkonybogár – Dabas-3, 2012.VI.17., MO; Dabas-4, 2012.VI.30., MO; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VIII.10., 1994.VI.30., 2001.VI.15., 2005.VII.15., SD; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1994.VI.30., SGY & SG; „Örkény”, 1999.VII.6., RN; Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.9., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Isomira antennata* (Panzer, 1798) – vastagsápú alkonybogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

- Isomira murina* (Linnaeus, 1758) – egérszürke alkonybogár – Dabas-3, 2012.V.20., MO.
- Lagria hirta* (Linnaeus, 1758) – réti gyapjasbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO.
- Latheticus oryzae* Waterhouse, 1880 – hosszúfejű lisztbogár – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VII.31., SGY & SG; „Örkény”, homokpusztarét, fényre, 1999.VII.21., HG & PA. – Mindkét adat szerepel MERKL (2006) dolgozatában, melyben a fajt a magyar faunára újként közölte.
- Leichenium pictum* (Fabricius, 1801) – pikkelyes gyászbogár (21. ábra) – „Örkény, Ilonamajor”, talajon, 1995.VIII.5., 1998.VIII.7., 1999.VII.26., SD; „Örkény”, homokpuszta, egyelés, 1995.VIII.5., SGY; „Örkény”, 1998.VIII.7., RN; Táborfalva, 1998.VII.18., RN.
- Melanimon tibiale* (Fabricius, 1781) – gyászos homokbogár – „Örkény, Ilonamajor”, 1994.VII.20., SD; „Örkény”, homokpusztarét, egyelés, 2005.IV.16., MO; „Örkény”, 2011.III.26., NT & RN; Táborfalva-9, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, egyelés nyárfából, 2012.III.23., SV; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Mycetochara flavipes* (Fabricius, 1792) – sárgalábú taplász – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., MO.
- Nalassus dermestoides* (Illiger, 1798) – rövidszárnyú gyászbogár – Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.IX.29., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.
- Neatus picipes* (Herbst, 1797) – fűz-gyászbogár – Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva, gyakorlótér, egyelés nyárfából, 2012.III.8., SV; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.25., MO; Táborfalva, gyakorlótér, nyáras-borókás, elhalt nyárfából, 2012.VII.6., MO.
- Omophlus lividipes* Mulsant, 1856 – kis pejbogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.V.20., 2012.V.25., MO; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva-7, 2012.V.20., MO; Táborfalva-8, 2012.V.11., MO.
- Opatrum sabulosum* (Linnaeus, 1760) – sároshátú gyászbogár – Dabas-1, 2012.V.25., 2012.VI.3., MO; Dabas-2, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2015.IV.26., 2015.V.17., 2015.V.31., 2015.VI.13., 2015.VI.27., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.17., 2012.VI.30., 2015.IV.26., 2015.V.17., 2015.VI.27., MO; Táborfalva-5, 2015.IV.16., 2015.IV.26., 2015.V.17., MO.
- Palorus depressus* (Fabricius, 1790) – szögleteshomlokú kislisztbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Palorus subdepressus* (Wollaston, 1864) – ívelthomlokú kislisztbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

- Pedinus femoralis*** (Linnaeus, 1767) – gyökérrágó gyászbogár – Dabas, Göboly-járás, 2009.IV.11., MO, NT & BG; „Örkény”, homokpuszta, egyelés, úton, 1994.VI.30., 1995.VI.30., SGY; „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 2006.V.14., GZ, MO & PA; „Örkény, Ilonamajor”, talajon egyelve, 1994.VIII.10., 1995.VII.8., SD; „Örkény”, gyakorlótér, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, gyakorlótér, egyelés, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, fűhálózás, 2012.IV.25., MO.
- Prionychus ater*** (Fabricius, 1775) – sötét alkonybogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Prionychus melanarius*** (Germar, 1813) – komor alkonybogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Tenebrio molitor*** Linnaeus, 1758 – közönséges lisztbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Tenebrio obscurus*** Fabricius, 1792 – kéreglakó lisztbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Tribolium confusum*** Jacquelin du Val, 1868 – közönséges kislisztbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Tribolium madens*** (Charpentier, 1825) – apró kislisztbogár – Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Uloma culinaris*** (Linnaeus, 1758) – nagy rágványbogár – „Örkény”, gyakorlótér, nyárfából egyelve, 2012.III.8., SV; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Oedemeridae – Álcincérfélék

- Chrysanthia viridissima*** (Linnaeus, 1758) – aranyos álcincér – Dabas-1, 2012.V.20., MO.
- Ischnomera caerulea*** (Linnaeus, 1758) – zöldeskék álcincér – „Örkény”, egyelés, 2011.IV.12., NL, NT & PA.
- Nacerdes carniolica*** (Gistel, 1834) – karnióliai álcincér – Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.30., MO.
- Oedemera croceicollis*** Gyllenhal, 1827 – pirostorú álcincér – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO.
- Oedemera lurida*** (Marsham, 1802) – mezei álcincér – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., MO.
- Oedemera podagrariae*** (Linnaeus, 1767) – székfű-álcincér – Dabas-1, 2012.VI.3., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., MO; Dabas-4, 2012.VI.3., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.9., 2012.VI.17., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.3., MO.

Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) – zöldes álcincér – Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepek, fűhálózás, 2012.IV.25., MO.

Meloidae – Hólyaghúzófélék

Hycleus tenerus (Germar, 1834) – kis hólyaghúzó – „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 1994.VII.3–5., MO; „Örkény, Ilonamajor”, 1994.VII.20., SD.

Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) – kőrisbogár – „Örkény, Ilonamajor”, 2002.VII.3., SD.

Meloe cicatricosus Leach, 1815 – óriásnünöke – „Örkény, Ilonamajor”, 2010.V.2., SD.

Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 – közönséges nünöke – „Örkény, Ilonamajor”, 2010.V.2., SD.

Mylabris crocata (Pallas, 1781) – pettyes hólyaghúzó – Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.VIII.1., MO; „Örkény, Ilonamajor”, *Eryngium campestre*, 1983.VIII.3., 1994.VII.20., 1995.VII.8., 1998.VII.13., SD; „Örkény”, 1997.VII.3., NL; „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 1994.VII.3–5., MO; „Örkény”, 1999.VI.9., PA; „Örkény”, fűhálózás, 2003.VI.10., GZ, GA & MO; Táborfalva-10, 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, 2015.VI.21., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, 2015.VII.31., MO.

Mylabris pannonica Kaszab, 1956 – pannon hólyaghúzó – Dabas, Dabasi Turjános, fűhálózás, 1979.VI.12., HS.

Mylabris variabilis (Pallas, 1782) – szalagos hólyaghúzó – „Örkény”, homokpuszta, fűhálózás, 1999.VI.17., MO.

Stenoria apicalis (Latreille, 1804) – keskenyfedős élősdibogár – Dabas, Nagy robbantó, 2015.VIII.1., MO; „Örkény”, *Eryngium campestre* virágán, 1994.VII.20., 1994.VII.29., 1998.VIII.7., SD; „Örkény”, 1994.VII.23., SGY.

Zonitis flava Fabricius, 1775 – rőt élősdibogár – Dabas-3, 2012.VI.9., MO; „Örkény”, homoki gyepek, fűhálózás, egyelés, 2011.VI.26., MO & BN; Táborfalva, 2015.VI.27., MO.

Anthicidae – Fűgebogárfélék

Anthicus antherinus (Linnaeus, 1787) – közönséges fűgebogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VI.30., SD; „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VI.30., 1994.VII.29., 1994.VII.31., SGY & SG; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, XX. csatorna, rostálás, 2010.III.8., SV; Táborfalva, gyakorlótér, autóhálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO.

- Anthicus axillaris*** W. L. E. Schmidt, 1842 – vállfoltos fűrgebogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VII.20., SD; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO.
- Anthicus bimaculatus*** (Illiger, 1801) – kétfoltos fűrgebogár – „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG; „Örkény”, homokpuszta, fényre, 1999.VII.21., HG & PA; „Örkény”, homokpuszta, autóshálózás, 2000.IV.23., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., 2012.VII.6., 2012.VII.20., MO.
- Anthicus flavipes*** (Panzer, 1796) – sárgalábú fűrgebogár – „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO.
- Cyclodinus humilis*** (Germar, 1824) – sziki fűrgebogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1994.VII.29., SD; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.
- Endomia tenuicollis*** (Rossi, 1792) – keskenynyakú fűrgebogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VII.20., MO.
- Hirticollis hispidus*** (Rossi, 1792) – szőrös fűrgebogár – „Örkény”, homokpuszta és nyáras szegélyén, lámpázás, 1994.VII.29., 1994.VII.31., 1994.IX.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO.
- Mecynotarsus serricornis*** (Panzer, 1796) – kis nyakszárvbogár – Dabas, Nagy robbantó, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; „Örkény, Ilonamajor”, talajon, 1998.VIII.7., 1999.VII.26., SD; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., 2012.VII.6., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Notoxus appendicinus*** Desbrochers des Loges, 1874 – déli nyakszárvbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., MO.
- Notoxus monoceros*** (Linnaeus, 1760) – sárgahasú nyakszárvbogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VII.24., SZK; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VIII.3., 1994.VI.30., 1998.VII.13., SD; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VII.31., SGY & SG; Táborfalva-6, 2012.VII.6., MO; Táborfalva-8, 2012.V.11., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Notoxus trifasciatus*** Rossi, 1792 – szalagos nyakszárvbogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VII.24., SZK; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VII.24., 1994.VIII.10., 1994.

VIII.13., 1998.VII.13., SD; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.VII.31., SGY & SG; „Örkény”, 1999.VII.21., PA; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.24., 2012.VI.30., 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.

Omonadus bifasciatus (Rossi, 1792) – kétöves fűgebogár – Dabas, Gyón, autóshálózás este, 2004.VII.22., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO.

Omonadus floralis (Linnaeus, 1758) – virágjáró fűgebogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VII.24., SZK; „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VIII.10., 1994.VI.30., 1994.VII.29., SD; „Örkény”, homokpuszta, lámpázás nyáras szegélyén, 1994.IX.8., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012.VI.17., MO.

Pseudotomoderus compressicollis (Motschulsky, 1839) – szegettnyakú fűgebogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.24., MO.

Striticollis tobias Marseul, 1879 – fűzöttnyakú fűgebogár – „Örkény, Ilonamajor”, fényre, 1993.VIII.10., SD; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., MO.

Aderidae – Korhóbogárfélék

Aderus populneus (Creutzer, 1796) – selymes korhóbogár – Dabas, Gyón, autóshálózás, 2004.VII.22., MO; „Örkény”, homokpusztarét, autóshálózás, 2000.IV.23., 2000.V.16., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.X.22., MO.

Anidorus nigrinus (Germar, 1842) – fekete korhóbogár – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1995.V.29., SGY.

Otolelus pruinus (Kiesenwetter, 1861) – deres korhóbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.

Mordellidae – Marókafélék

Mordella velutina pannonica Horák, 1985 – Táborfalva-8, 2012.VII.20., MO.

Mordellistena brevicauda (Bohemann, 1849) – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.V.25., 2012.VI.3., MO; Dabas-2, 2012.V.20., 2012.V.25., 2012.VI.3., MO; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO.

Mordellistena secreta Horák, 1983 – Dabas-1, 2012.VI.3., 2012.VI.24., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.3., MO.

Variimorda basalis (A. Costa, 1854) – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO.

Scraptiidae – Cérnanyakúbogár-félék

- Anaspis flava* (Linnaeus, 1758) – Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.VI.9., MO.
- Anaspis frontalis* (Linnaeus, 1758) – Dabas-4, 2012.V.20., MO.
- Anaspis pulicaria* Costa, 1854 – Dabas-1, 2012.VI.3., MO.
- Cyrtanaspis phalerata* (Germar, 1831) – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.VI.3., MO.
- Pentaria badia* (Rosenhauer, 1847) – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás este, 2012.VI.9., 2012.VI.24., MO.
- Trotommidea salonae* Reitter, 1883 – törpe-cérnanyakúbogár – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.24., MO.

Cerambycidae – Cincérfélék

- Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1792) – szürke daliáscincér – „Örkény”, homokpuszta, lámpázás, 1994.IX.8., SGY & SG.
- Aegomorphus clavipes* (Schrank, 1781) – tarka cincér – „Örkény”, homokpuszta, 2009.VI.16., NT & RN.
- Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763) – diófacincér (29. ábra) – Dabas, Nagy robbantó, 2015.VI.27., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.IV.16., MO; Táborfalva, nyáras-borókás, elhalt nyárfáról, 2012.VII.6., MO.
- Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767) – sávós bogáncscincér – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, egyelés, 2007.V.13., SV.
- Aromia moschata* (Linnaeus, 1758) – pézsmacincér (30. ábra) – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, egyelés, 2012.VI.7., SV.
- Calamobius filum* (Rossi, 1790) – hosszúcsápú szalmacincér – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.V.25., 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2004.V.31., 2007.V.13., SV & SZG; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2004.V.30., 2004.V.31., 2012.V.21., SV & SZG; Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., 2004.VIII.2., SZG; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Gyóni-erdő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Dabas, Gyón, 2012.VI.9., MO; „Örkény”, 2002.VII.2., MJ; „Örkény”, homokpusztarét, 1995.V.23., 1996.VI.2., 2005.V.29., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG.
- Carinatodorcadion aethiops* (Scopoli, 1763) – fekete gyalogcincér – Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Gyón, 2012.V.25., MO; Dabas-1, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Dabas-2, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., 2015.V.17., 2015.V.31.,

- 2015.VI.13., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2015.V.17., 2015.V.31., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO.
- Cerambyx cerdo*** Linnaeus, 1758 – nagy hőscincér (9. ábra) – Táborfalva, gyakorlótér, boroscsapda, 2012.VI.24., MO.
- Cerambyx scopolii*** Füsslin, 1775 – kis hőscincér – Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.17., MO; Dabas, Dabasi Turjános, 2013.VI.1., CA; Dabas, Rákóczi erdeje, boroscsapda, 2015.VI.27., MO.
- Chlorophorus sartor*** (Müller, 1766) – feketevállú darázscincér – Dabas-2, 2012.VI.30., MO; Dabas-3, 2012.VII.6., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.6., MO.
- Chlorophorus varius*** (Müller, 1766) – díszes darázscincér – Dabas-3, 2012.VII.6., MO; Dabas-4, 2012.VII.15., MO; „Örkény”, homokpuszta, 1994.VII.31., SGY & SG; Táborfalva-10, 2012.VII.6., MO.
- Clytus rhamni*** Germar, 1817 – benge-darázscincér – Dabas, Gyón, 2012.V.20., 2012.VI.9., MO; „Örkény”, 2002.V.23., 2002.V.30., MJ.
- Exocentrus adpersus*** Mulsant, 1846 – tölgyfa-rőzsecincér – Táborfalva, katonai gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Oberea erythrocephala*** (Schrank, 1776) – pirosfejű kutyatejcincér – Dabas, Gyón, 2012.V.20., MO; „Örkény”, homokpusztarét, 1999.VI.17., 2005.V.29., MO.
- Obrium cantharinum*** (Linnaeus, 1767) – rőt hengercincér – Dabas, központi lőtér, boroscsapda, 2012.VI.24., MO.
- Opsilia coerulescens*** (Scopoli, 1763) – kígyósziszscincér – „Örkény”, homokpusztarét, 1995.VI.23., 1999.VI.17., MO; „Örkény”, 1999.VI.9., PA; Táborfalva-7, 2012.V.25., 2012.VI.30., MO.
- Pedestredorcadion decipiens*** (Germar, 1824) – homoki gyalogcincér (22–23. ábrák) – Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.IV.16., GA, MO & NT; „Örkény”, 2002.IV.28., MJ; „Örkény”, homokpuszta, 2000.IV.12., 2005.IV.16., 2012.III.17., MO; „Örkény”, katonai lőtér, homokpusztarét, 2009.IV.11., MO & NT; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, 2012.IV.13., 2017.III.17., SV; Táborfalva-10, 2015.IV.12., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, 2015.IV.26., MO.
- Phymatodes testaceus*** (Linnaeus, 1758) – változékony korongcincér – Táborfalva, Vezetési pálya, nyáras, boroscsapda, 2015.VI.21., MO.
- Phytoecia caerulea*** (Scopoli, 1772) – fémszöld fűcincér – Dabas, Nagy robbantó, homoki gyep, egyelés, 2015.IV.16., MO; Táborfalva, 1999.VI.9., PA.
- Phytoecia cylindrica*** (Linnaeus, 1758) – medvelapucincér – „Örkény”, 2002.VI.26., MJ.
- Phytoecia nigricornis*** (Fabricius, 1781) – ürömcincér – Táborfalva-7, 2012.VI.30., MO.

- Phytoecia pustulata*** (Schrank, 1776) – parányi fűcincér – Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Göboly-járás, homokos rét, 2009.IV.11., MO & NT; „Örkény”, homokpuszta, 2010.V.8., MO.
- Phytoecia virgula*** (Charpentier, 1825) – pirospontos fűcincér – Dabas, Gyón, 2012.V.25., 2012.VI.3., MO.
- Plagionotus floralis*** (Pallas, 1773) – lucerna-darázscincér – Dabas-3, 2012.VI.9., MO; „Örkény, Ilonamajor”, *Eryngium campestre* virágán, 1994.VI.30., SD; Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO.
- Pogonocherus fasciculatus*** (De Geer, 1775) – öves ecsetcincér – Táborfalva, katonai gyakorlótér, 2012.III.23., SV.
- Pseudovadonia livida*** (Fabricius, 1776) – barnás virágcincér – Dabas-1, 2012.V.25., 2012.VI.3., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva-5, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.3., MO.
- Purpuricenys budensis*** (Götz, 1783) – bíborcincér – „Örkény”, 1998.VI.20., 2002.VI.26., MJ.
- Saperda perforata*** (Pallas, 1773) – díszes nyárfacincér – „Örkény”, 2002.V.16., MJ; „Örkény”, katonai lőtér, nyáras, fehér nyárból nevelve, 2012.II.24., NT.
- Semanotus ruscicus*** (Fabricius, 1776) – borókacincér – Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.IV.16., MO; „Örkény”, 2012.II.24., NL, NT & RN.
- Spondylis buprestoides*** (Linnaeus, 1758) – erdei félcincér – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO.
- Stenurella nigra*** (Linnaeus, 1758) – fekete karcsúcincér – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas-4, 2012.VI.3., MO.
- Tetrops praeustus*** (Linnaeus, 1758) – közönséges négyszeműcincér – Táborfalva, Vezetési pálya, homoki gyepterület, 2015.IV.26., MO.
- Theophilea subcylindricollis*** Hladil, 1988 – hengeres szalmacincér – Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2004.V.31., SZG; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, Gyón, 2012.V.20., MO; Dabas-1, 2012.V.20., 2012.V.25., MO; Dabas-3, 2012.V.20., 2012.V.25., MO; „Örkény”, homokpuszta, 2005.V.29., MO; Táborfalva, homoki gyepterület, 2012.IV.30., 2012.V.11., MO.
- Trichoferus pallidus*** (Olivier, 1790) – sápadt éjcincér – Dabas, Dabasi bucka, egytel, 2015.II.25., SV.
- Xylotrechus rusticus*** (Linnaeus, 1758) – egérszínű darázscincér – Dabas, Rákóczi erdeje, 2015.VI.13., MO; „Örkény”, 2002.V.23., 2002.VI.24., 2003.VI.4., MJ.

Chrysomelidae – Levélbogárfélék

- Acanthoscelides pallidipennis* (Motschulsky, 1874) – gyalogakác-zsizsik – Dabas, Gyón, gyakorlótér, 2012.VI.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.
- Aphthona flava* Guillebeau, 1895 – sárgás kutyatej-földibolha – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO.
- Aphthona nigriscutis* Foudras, 1860 – gyakori kutyatej-földibolha – Dabas-3, 2012.VI.9., MO; Dabas-4, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-6, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.30., MO.
- Bruchidius cinerascens* (Gyllenhal, 1833) – iringózsizsik – Táborfalva-10, 2012.VI.24., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.
- Bruchidius pubicornis* Lukjanovitsh et Ter-Minassian, 1957 – vékonylábú zsi-zsik – Dabas-1, 2012.VI.3., MO.
- Bruchus brachialis* Fahraeus, 1839 – laposlábú bükkönyzsizsik – Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.
- Bruchus luteicornis* Illiger, 1794 – kis bükkönyzsizsik – Dabas-4, 2012.VIII.5., MO.
- Cassida bergeali* Bordy, 1995 – Bergeal-pajzsbogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.11., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO.
- Cassida berolinensis* Suffrian, 1844 – sárgászöld pajzsbogár – „Örkény”, homokpusztaré, fűhálózás, 1994.VII.3–5., MO.
- Cassida denticollis* Suffrian, 1844 – fogacskás pajzsbogár – Dabas, Göbolyjárás, homokos rét, fűhálózás, egyelés, 2009.IV.11., MO & NT; Táborfalva-8, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.9., MO.
- Cassida ferruginea* Goeze, 1777 – rozsdabarna pajzsbogár – Dabas-3, 2012.X.22., MO.
- Cassida hemisphaerica* Herbst, 1799 – gömbölyded pajzsbogár – Táborfalva, 1999.VI.9., PA; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, kopogtatás, fűhálózás, 2012.III.23., SV.
- Cassida margaritacea* Schaller, 1783 – szalmasárga pajzsbogár – Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO.
- Cassida nebulosa* Linnaeus, 1758 – laboda-pajzsbogár – „Örkény”, homokpusztaré, fűhálózás, 2005.V.29., MO.
- Cassida pannonica* Suffrian, 1844 – pannon pajzsbogár – „Örkény”, 1999.VI.17., 1999.VII.28., PA; „Örkény”, egyelés, 2011.IV.12., NL, NT & PA; Táborfalva, 1999.VI.9., PA; Táborfalva-8, 2012.V.11., 2012.VII.15., MO.

- Cassida prasina*** Illiger, 1798 – hagymazöld pajzsbogár – Dabas-4, 2012.V.11., 2012.VI.3., MO; Dabas, Göbolyjárás, homokos rét, fűhálózás, egyelés, 2009.IV.11., MO & NT; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Cassida rubiginosa*** O. F. Müller, 1776 – lapos pajzsbogár – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 1995.VI.23., MO.
- Cassida sanguinolenta*** O. F. Müller, 1776 – cickafark-pajzsbogár – Dabas, Göbolyjárás, homokos rét, fűhálózás, egyelés, 2009.IV.11., MO & NT; Dabas, Gyón, kiszáradó láprét, fűhálózás, 1994.V.17., MO; Örkény, homoki gye, fűhálózás, egyelés, 2011.VI.26., MO & BN.
- Cassida seladonia*** Gyllenhal, 1827 – szemcsés pajzsbogár – „Örkény”, fűhálózás, 1999.VI.17., PA.
- Cassida subreticulata*** Suffrian, 1844 – aranyfényű pajzsbogár – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 2005.V.29., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.6., 2012.VII.20., MO.
- Cassida vibex*** Linnaeus, 1767 – szőrös pajzsbogár – Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.20., MO.
- Chaetocnema aridula*** (Gyllenhal, 1827) – fekete pázsitfű-földibolha – Dabas-3, 2012.VI.24., 2012.X.22., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.X.22., MO.
- Chaetocnema conducta*** (Motschulsky, 1838) – kétszínű sás-földibolha – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VII.6., 2012.X.22., MO.
- Chaetocnema confusa*** (Boheman, 1851) – domború sás-földibolha – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.V.25., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., MO.
- Chaetocnema hortensis*** (Geoffroy, 1785) – rezes pázsitfű-földibolha – Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., MO.
- Chrysolina gypsophilae*** (Küster, 1845) – ragyás szegélyeslevelész – Dabas, Gyón, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO.
- Chrysolina hyperici*** (Forster, 1771) – zöld orbáncfűlevelész – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 1996.VI.2., 2005.V.29., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.9., MO.
- Chrysolina kuesteri*** (Helliesen, 1912) – ráncos szegélyeslevelész – „Örkény”, homokpusztarét, fűhálózás, 2005.V.29., MO.
- Chrysolina marginata*** (Linnaeus, 1758) – nyúlánk szegélyeslevelész – Dabas, Gyón, kiszáradó láprét, fűhálózás, 1994.V.17., MO.
- Chrysolina polita*** (Linnaeus, 1758) – réti mentalevelész – Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, fűhálózás, 2012.IV.25., MO.

- Chrysolina pseudolurida lineata*** Papp, 1949 – kétszínű levelész – „Örkény”, homokpuszta, 2005.V.29., MO.
- Chrysolina rossia*** (Illiger, 1802) – trapézható szegélyeslevelész – Dabas, Gyón, fűhálózás, 2012.VI.9., MO.
- Chrysomela collaris*** Linnaeus, 1758 – szegettnyakú fűzlevelész – Dabas, Nagy robbantó, 2015.IV.16., MO; „Örkény”, 1999.VII.28., PA; „Örkény”, fűhálózás, 2003.VI.10., GZ, GA & MO; „Örkény”, homokpuszta, 2010.VII.19., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.9., 2012.VI.24., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO.
- Chrysomela cuprea*** Fabricius, 1775 – fémcs fűzlevelész – „Örkény”, gyakorlótér, homokpusztaréti, egyelve, 2012.III.17., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, egyelve, 2012.III.23., SV; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepr, fűhálózás, 2012.IV.25., MO.
- Clytra laeviuscula*** (Ratzeburg, 1837) – fűzfazsákhordóbogár – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO.
- Clytra quadripunctata*** (Linnaeus, 1758) – négyfoltos zsákhordóbogár – „Örkény”, gyakorlótér, homoki gyepr, fűhálózás, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepr, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Coptocephala unifasciata*** (Scopoli, 1763) – sárgalábú hullóbogár – Dabas-3, 2012.VII.6., 2012.VIII.5., 2012.IX.29., MO; Dabas-4, 2012.VII.15., MO; „Örkény”, homokpusztaréti, 1994.VII.3–5., MO; „Örkény”, homokpuszta, egyelés, 1995.VIII.5., SGY; Táborfalva-8, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.6., 2012.VII.20., MO.
- Crepidodera aurata*** (Marsham, 1802) – ékes fűzföldibolha – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO.
- Crepidodera aurea*** (Geoffroy, 1785) – nagy nyárföldibolha – Dabas-4, 2012.VI.3., MO.
- Crioceris quatuordecimpunctata*** (Scopoli, 1763) – tizennégy pontos spárgabogár – Dabas, Gyón, kiszáradó lápréti, fűhálózás, 1994.V.17., MO; Dabas-3, 2012.VII.6., MO; „Örkény”, fűhálózás, 1994.VII.3–5., MO; „Örkény”, 2004.V.16., 2010.V.8., MO; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-7, 2012.V.20., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepr, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Cryptocephalus anticus*** Suffrian, 1848 – réti zömökbogár – Dabas-1, 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Dabas-3, 2012.VI.9., 2012.VI.24., MO.
- Cryptocephalus bameuli*** Duhaldeborde, 1999 – Bameul-zömökbogár – Dabas-1, 2012.V.25., 2012.VI.3., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO.

- Cryptocephalus bilineatus*** (Linnaeus, 1767) – rovátkolt zömökbogár – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Dabas-2, 2012.V.25., 2012.VI.9., 2012.VI.24., MO; Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO.
- Cryptocephalus bipunctatus*** (Linnaeus, 1758) – kétpettyes zömökbogár – Dabas-1, 2012.VI.9., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., MO.
- Cryptocephalus chrysopus*** Gmelin, 1790 – sárgavégű zömökbogár – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.
- Cryptocephalus connexus*** Olivier, 1808 – sávós zömökbogár – Dabas-3, 2012.VII.6., 2012.VIII.5., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.6., MO.
- Cryptocephalus fulvus*** (Goeze, 1777) – sárgafarú zömökbogár – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; Dabas-4, 2012.IX.29., MO.
- Cryptocephalus janthinus*** Germar, 1824 – zafir lizinka-zömökbogár – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Táborfalva, 1999.VI.9., PA.
- Cryptocephalus laetus*** Fabricius, 1792 – ékes zömökbogár – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; Dabas, Nagy robbantó, 2015.VIII.1., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, 2015.VII.31., MO.
- Cryptocephalus moraei*** (Linnaeus, 1758) – közönséges zömökbogár – Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.30., MO.
- Cryptocephalus sericeus*** (Linnaeus, 1758) – nagy fészkesbogár – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Táborfalva-5, 2012.V.25., 2012.VI.9., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.9., MO.
- Cryptocephalus transiens*** Franz, 1949 – déli fészkesbogár – Dabas-1, 2012.VI.9., MO.
- Cryptocephalus virens*** Suffrian, 1847 – zöldeskék zömökbogár – Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepek, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Diabrotica virgifera*** LeConte, 1858 – amerikai kukoricabogár – Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO.
- Dibolia timida*** (Illiger, 1807) – bronzfényű iringó-földibolha – Táborfalva-6, 2012.VI.24., MO.
- Eumolpus asclepiadeus*** (Pallas, 1773) – tündöklő méreggyiloklevelész – „Örkény”, fűhálózás, 2003.VI.10., GA, GZ & MO; Táborfalva-8, 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2012.VII.15., MO.
- Galeruca interrupta*** Illiger, 1802 – bordás olajosbogár – Tatárszentgyörgy, árok-ból, 2015.X.10., MO.
- Galeruca pomonae*** (Scopoli, 1763) – barna olajosbogár – Dabas-3, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-6, 2012.VI.24., MO.
- Galeruca tanaceti*** (Linnaeus, 1758) – fekete olajosbogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO.

- Gastrophysa viridula*** (DeGeer, 1775) – sóska-levélbogár – Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.25., MO.
- Gonioctena fornicata*** Bruggemann, 1873 – közönséges lucernabogár – Dabas-2, 2012.VI.9., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO.
- Hispa atra*** Linnaeus, 1767 – fekete sünbogár – Dabas-3, 2012.X.22., MO.
- Hypocassida cornea*** (Marseul, 1868) – rozsdáshasú bordáspajzsbogár – Dabas-2, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-10, 2015.VI.13., MO.
- Hypocassida subferruginea*** Schrank, 1776 – közönséges bordáspajzsbogár – „Örkény”, homokpusztaréti, fűhálózás, 2005.V.29., MO; Táborfalva, 1999. VI.9., PA.
- Labidostomis cyanicornis*** Germar, 1822 – sárgahátú zsákbogár – Dabas-1, 2012. VI.3., MO.
- Labidostomis longimana*** (Linnaeus, 1760) – zöldnyakú zsákbogár – Dabas-1, 2012.VI.9., MO; Dabas-3, 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO; Dabas, Gyón, homoki gyep, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO.
- Labidostomis pallidipennis*** (Gebler, 1829) – szőröshátú zsákbogár – „Örkény”, homokpusztaréti, fűhálózás, 2000.VI.20., MO.
- Lema cyanella*** (Linnaeus, 1758) – kék aszatbogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO.
- Lilioceris merdigera*** (Linnaeus, 1758) – hagymabogár – Dabas-3, 2012.VI.30., MO.
- Longitarsus tabidus*** (Fabricius, 1775) – nagy ökörfarkkóró-földibolha – Dabas-3, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-9, 2012. VI.17., MO.
- Neocrepidodera transversa*** (Marsham, 1802) – réti aszat-földibolha – Dabas-3, 2012.VI.3., MO.
- Oulema melanopus*** (Linnaeus, 1758) – veresnyakú árpabogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.VI.9., MO.
- Oulema tristis*** (Herbst, 1786) – sárgalábú fehérítőbogár – Táborfalva-10, 2012. VII.20., MO.
- Pachybrachis fimbriolatus*** (Suffrian, 1848) – feketevégű tömzsibogár – Dabas-1, 2012.V.25., 2012.VI.3., MO; Dabas-2, 2012.V.25., 2012.VI.3., 2012. VI.9., MO.
- Psylliodes picinus*** (Marsham, 1802) – gesztenyebarna lizinka-földibolha – Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO.
- Smaragdina affinis*** (Illiger, 1794) – tölgy-zsáklevelész – Dabas-4, 2012.V.20., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Smaragdina salicina*** (Scopoli, 1763) – kék zsáklevelész – Dabas-3, 2012.V.20., MO.

Spermophagus calystegiae (Lukjanovitsh et Ter-Minassian, 1957) – sövényszulák-magfűró – Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.30., MO.

Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) – selymes magfűró – Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.IV.29., SV.

Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758) – kékes gyaloglevelész – Dabas-3, 2012.IX.29., MO.

Anthribidae – Orrosbogárfélék

Anthribus nebulosus (Forster, 1771) – ködfoltos pajzstetvész-orrosbogár – Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.III.23., 2012.IV.25., SV.

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) – fehérfarú orrosbogár – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SG.

Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797) – szalagos orrosbogár – Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.

Tropideres albirostris (Herbst, 1784) – fehérfoltos orrosbogár – Dabas, Külső-Mántekek környéke, egyelés, 2014.VI.27., SV.

Bruchelidae – Rezedabogár-félék

Bruchela kaszabi Strejček, 1973 – keleti rezedabogár – Dabas-3, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-5, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.17., MO.

Bruchela schusteri (Schilsky, 1912) – Schuster-rezedabogár – Dabas, Gyón, 1994.VII.3., MO; „Örkény”, 1995.VII.19., OA; „Örkény”, 1999.VII.2., HG & PA; Táborfalva-5, 2012.V.25., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-9, 2012.VI.17., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.15., MO. – A 2012 előtti adatok szerepelnek PODLUSSÁNY (2001) dolgozatában.

Rhynchitidae – Eszelényfélék

Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) – szőlőeszeleny – „Örkény”, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.IV.13., SV; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2014.IV.12., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2014.VIII.28., SV.

Byctiscus populi (Linnaeus, 1758) – nyárfaeszeleny – Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, kopogtatás, 2015.IV.30., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2014.V.12., SV.

Neocoenorhinidius pauxillus (Germar, 1824) – bordafűró eszelény – Dabas, Kosaras-domb, kopogtatás, 2014.IV.10., SV.

- Neocoenorrhinus germanicus*** (Herbst, 1797) – közönséges számócaeszeleny – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV.
- Involvulus caeruleus*** (DeGeer, 1775) – hajtástörő eszelény – Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2013.IX.6., 2014.V.12., 2015.IX.24., SV.
- Involvulus pubescens*** (Fabricius, 1775) – szőrös eszelény – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SG.
- Rhynchites auratus*** (Scopoli, 1763) – aranyos eszelény – Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2014.V.12., SV.
- Rhynchites giganteus*** (Krynicky, 1832) – fémes körteeszeleny – Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2013.VI.23., SV.
- Tatianaerhynchites aequatus*** (Linnaeus, 1767) – piros kökényeszeleny – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.IV.25., 2014.V.12., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2014.V.12., SV.
- Temnocerus coeruleus*** (Fabricius, 1798) – fogacskás törpeeszeleny – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2012.IV.29., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.

Brentidae – Pálcaormányos-félék

- Apion haematodes*** Kirby, 1808 – madársóska-cickányormányos – „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Aspidapion validum*** (Germar, 1817) – magaspajzsocskájú cickányormányos – Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, kopogtatás, 2014.VIII.28., 2015.IX.24., SV.
- Catapion jaffense*** (Desbrochers, 1895) – görbeorrú cickányormányos – Dabas-1, 2012.VI.9., MO; Dabas-3, 2012.VII.6., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.VIII.10., 2007.V.13., 2012.VI.7., 2013.VII.23., 2013.VIII.13., SV & SZG; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SZG; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.IX.6., SV.
- Catapion pubescens*** (Kirby, 1811) – széles cickányormányos – Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2015.VIII.27., 2015.IX.24., SV.
- Catapion seniculus*** (Kirby, 1808) – lóhereszár-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.VI.7., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.IX.3., SV; Dabas, Külső-Mántelek környéke, rostálás, 2015.II.25., SV; „Örkény”, 2009.VI.16., NT & RN.

- Ceratapion cylindricolle*** (Gyllenhal, 1839) – vasvirág-cickányormányos – Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2013.VII.23., SV; Dabas, Göboly-járás környéke, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV.
- Ceratapion gibbirostre*** (Gyllenhal, 1813) – agyaras cickányormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Dabas, Külső-Mántelek környéke, fűhálózás, 2015.VIII.14., SV.
- Ceratapion onopordi*** (Kirby, 1808) – számarbogatás-cickányormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.31., SV.
- Ceratapion penetrans*** (Germar, 1817) – lapátlábú cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., 2012.VI.7., 2013.VII.23., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., 2014.VI.27., SV; Dabas, Göboly-járás környéke, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.IX.3., SV; Dabas-1, 2012.VI.9., MO; Dabas-2, 2012.VI.30., MO; Dabas-3, 2012.VII.6., MO; „Örkény”, 2001.V.17., PA; „Örkény”, 2003.VI.10., MO, GZ & PA; „Örkény”, 2010.VII.19., MO; „Örkény”, 2009.VI.16., NT & RN; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., 2014.VII.17., SV & SZG; Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, 2012.IV.25., 2012.V.11., 2014.VIII.28., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.29., SV.
- Diplapion confluens*** (Kirby, 1808) – vésetthomlokú cickányormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2014.VI.27., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV.
- Diplapion stolidum*** (Germar, 1817) – lékeltfejű cickányormányos – Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SG.
- Eutrichapion ervi*** (Kirby, 1808) – szempillás cickányormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.23., SV.
- Eutrichapion punctiger*** (Paykull, 1792) – bükkönyrontó cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., SV; „Örkény”, 2001.V.17., PA.
- Eutrichapion viciae*** (Paykull, 1800) – bükköny-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., 2012.VI.7., 2013.VIII.13., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Exapion corniculatum*** (Germar, 1817) – zanót-cickányormányos – Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., 2004.VIII.1., SG.
- Exapion difficile*** (Herbst, 1797) – rekettye-cickányormányos – Táborfalva-9, 2012.V.11., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO.

- Exapion formaneki*** (Wagner, 1929) – Formának-cickányormányos – Dabas-3, 2012.VI.24., MO; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV; Dabas, Göboly-járás, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV.
- Hemitrichapion pavidum*** (Germar, 1817) – koronafürt-cickányormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2013.VII.23., SV.
- Holotrichapion ononis*** (Kirby, 1808) – szakállas cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., 2007.VIII.20., 2010.IV.25., 2012.VI.7., 2013.VIII.13., SV; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Dabas, Rektor-hegy környéke, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Táborfalva, HM-lőtér, rostálás, 2012.III.8., SV.
- Holotrichapion pisi*** (Fabricius, 1801) – lucernarügy-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., 2008.IV.23., SV; Dabas-4, 2012.V.20., 2012.VI.3., 2012.VI.3., MO; „Örkény”, 1995.V.29., SGY; „Örkény”, 2001.V.17., PA; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., 2014.VIII.28., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2013.IX.6., SV.
- Holotrichapion pullum*** (Gyllenhal, 1833) – lucerna-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV.
- Ischnopterapion fallens*** (Marseul, 1888) – alföldi cickányormányos – Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2013.VII.23., SV.
- Ischnopterapion loti*** (Kirby, 1808) – kerep-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2012.VI.7., SZG; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas, Rektor-hegy környéke, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV.
- Ischnopterapion virens*** (Herbst, 1797) – lóheregyökér-cickányormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV.
- Melanapion minimum*** (Herbst, 1797) – fűz-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., 2010.IV.25., SV.
- Mesotrichapion punctirostre*** (Gyllenhal, 1839) – pontosorrú cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2010.IV.25., SV & SZG; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.VI.12., 2013.VII.23., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV; Dabas, Gyón, homoki gyepek,

- fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.30., 2012.VII.6., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fűhálózás, kopogtatás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.11., 2013.VI.15., SV.
- Perapion affine*** (Kirby, 1808) – kék cickányormányos – „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Protapion assimile*** (Kirby, 1808) – virágrontó cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., 2007.VIII.20., SV.
- Protapion filirostre*** (Kirby, 1808) – fekete cickányormányos – „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Protapion fulvipes*** (Geoffroy, 1785) – vadhere-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.VIII.20., 2012.VI.7., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV; Dabas-1, 2012.V.20., MO; „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Protapion nigrítarse*** (Kirby, 1808) – kis cickányormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Protapion ononidis*** (Gyllenhal, 1827) – iglice-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., 2012.VI.7., 2013.IV.23., 2013.VII.23., SV; Dabas-2, 2012.V.20., 2012.V.25., MO; Dabas-3, 2012.VII.6., MO; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.31., SV.
- Protapion trifolii*** (Linnaeus, 1768) – lóherevirág-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2004.VIII.10., 2007.V.13., 2010.IV.25., SV & SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., 2008.IV.23., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., 2004.VIII.1., SG.
- Protapion varipes*** (Germar, 1817) – görbelábú cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., SV; Táborfalva, gyakorlótér, autós-hálózás, 2012.V.11., MO.
- Pseudoperapion brevirostre*** (Herbst, 1797) – fényesorrú cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.VI.7., SV; „Örkény”, 2006.V.14., MO, GZ & PA; Táborfalva-5, 2012.VI.9., 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-7, 2012.V.20., 2012.VI.24., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.9., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.31., SV.
- Pseudoprotapion astragali*** (Paykull, 1800) – csüdfű-cickányormányos – Táborfalva-10, 2012.VI.30., MO.
- Pseudoprotapion ergenense*** (Becker, 1864) – aranyoszöld cickányormányos – Dabas, Gyón, homoki gyepek, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.VI.12., 2013.VII.23., SV; Dabas, Rektor-hegy,

fűhálózás, 2013.V.27., 2014.VI.27., SV; Táborfalva-6, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.3., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.11., SV.

Squamapion elongatum (Germar, 1817) – zsálya-cickányormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, kopogtatás, 2012.V.11., 2014.V.12., SV.

Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) – lucernaszár-cickányormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2013.VII.23., SV; Táborfalva, 2015.VI.5., MO.

Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) – csalán-cickányormányos – Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.

Nanophyidae – Füzenyormányos-félék

Dieckmanniellus chevrieri (Boheman, 1845) – Chevrier-füzenyormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.V.5., SV.

Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838) – fogascombú füzenyormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2013.VIII.13., SV.

Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807) – háromszöges füzenyormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., 2013.VIII.13., SV.

Nanophyes brevis (Boheman, 1845) – szörszálás füzenyormányos – Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.

Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – simacombú füzenyormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., 2013.VII.23., 2013.VIII.13., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., 2013.VII.23., 2014.VIII.28., 2014.IX.3., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.

Curculionidae – Ormányosbogár-félék

Acalyptus sericeus (Gyllenhal, 1836) – selymes füzormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., 2013.IV.23., SV.

Amalus scortillum (Herbst, 1795) – barna keserűfű-ormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV.

Anthonomus humeralis (Panzer, 1794) – törökmeggy-bimbólikasztó – Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.IV.13., SV.

- Anthonomus kirschi*** (Desbrochers, 1868) – Kirsch-rüglylikasztó – „Örkény”, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.IV.13., SV; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Anthonomus pedicularius*** (Linnaeus, 1758) – galagonya-bimbólikasztó – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., SV; Dabas, Rektor-hegy, kopogtatás, 2012.IV.29., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, kopogtatás, 2015.IV.30., SV; „Örkény”, 2010.IV.12., PA; „Örkény”, gyakorlótér, egyelés, 2012.IV.13., NT & SV; Tatárszentgyörgy, HM-lőtér, kopogtatás, 2015.IV.16., SV; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.IV.25., SV.
- Anthonomus pomorum*** (Linnaeus, 1758) – alma-bimbólikasztó – Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Anthonomus pyri*** (Gyllenhal, 1835) – pompás rüglylikasztó – Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Anthonomus rubi*** (Herbst, 1795) – szamóca-bimbólikasztó – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV.
- Anthonomus rubripes*** Gyllenhal, 1835 – pimpó-bimbólikasztó – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Apsis albolineata*** (Fabricius, 1792) – alföldi rozsormányos – Dabas, Felső-Esső-dűlő, fűhálózás, 2011.V.28., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV; Dabas, Rákóczi erdeje, egyelés, 2016.IV.19., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.V.5., SV; Tatárszentgyörgy, HM-lőtér, fűhálózás, 2015.IV.16., SV; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; „Örkény”, 1995.V.29., SGY; „Örkény”, 2006.V.14., MO, GZ & PA; „Örkény”, 2008.V.12., RD; „Örkény”, 2010.IV.12., PA; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva-7, 2012.V.20., 2012.VI.9., MO; Táborfalva-10, 2012.V.11., 2012.VI.9., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, talajcsapdázás, 2012.IV.25., 2012.V.11., 2014.IV.6., 2014.IV.12., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Archarius crux*** (Fabricius, 1776) – keresztes gubaczsuzsósóka – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2007.V.13., SV.
- Archarius pyrrhoceras*** (Marsham, 1802) – tölgy-gubaczsuzsósóka – Dabas-4, 2012.VI.3., MO; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.IV.25., SV.
- Archarius salicivorus*** (Paykull, 1792) – fűz-gubaczsuzsósóka – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2013.IV.23., SV.
- Aulacobaris coerulescens*** (Scopoli, 1763) – fémes repcebáris – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., 2013.VI.15., SV.
- Aulacobaris picicornis*** (Marsham, 1802) – közönséges rezedabáris – Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.

- Bagous argillaceus*** Gyllenhal, 1836 – lakkfényű víziormányos – „Örkény”, 1994.VII.31., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.
- Bagous collignensis*** (Herbst, 1797) – süllőhínár-víziormányos – Dabas, Sári, XX. csatorna, rostálás, 2017.IX.27., SV; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO.
- Bagous glabrirostris*** (Herbst, 1795) – kolokán-víziormányos – Dabas, Sári, XX. csatorna, egyelés, 2014.VIII.28., 2017.X.20., SV.
- Bagous majzlani*** (Kodada, Holecová et Behne, 1992) – harmatkása-víziormányos – Dabas, Sári, XX. csatorna, rostálás, 2017.IX.8., 2017.X.18., 2017.X.20., SV.
- Bagous nodulosus*** (Gyllenhal, 1836) – négypúpú víziormányos – Dabas, Sári, XX. csatorna, rostálás, 2017.IX.8., SV.
- Bagous subcarinatus*** (Gyllenhal, 1836) – tócsagaz-víziormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, rostálás, 2012.V.27., 2012.X.3., SV; Örkény, XX. csatorna környéke, rostálás, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, gyakorlótér, egyelés, 2012.IV.13., NT & SV; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, rostálás, 2012.III.8., 2013.VI.23., 2013.VII.31., SV; Táborfalva, XX/d. csatorna környéke, fűhálózás, rostálás, 2012.III.23., 2013.VI.15., SV.
- Bagous tempestivus*** (Herbst, 1795) – boglárka-víziormányos – Dabas, Sári, XX. csatorna, rostálás, 2017.X.20., SV.
- Bagous validus*** (Rosenhauer, 1847) – virágkaka-víziormányos – Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX/d. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.VI.15., SV.
- Baris artemisiae*** (Herbst, 1795) – fekete ürömbáris – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., SV.
- Bothynoderes affinis*** (Schränk, 1781) – sávós barkó – „Örkény”, 2004.V.16., 2006.V.14., MO; „Örkény”, 2007.III.15., SZK.
- Bothynoderes declivis*** (Olivier, 1807) – libatopbarkó – Táborfalva-5, 2012.VI.9., 2012.VI.24., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.17., 2012.VI.9., MO; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, 2012.IV.13., SV.
- Brachonyx pineti*** (Paykull, 1792) – fenyőtűragó ormányos – Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, kopogtatás, 2015.IV.8., SV; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.III.23., SV.
- Brachypera dauci*** (Olivier, 1807) – gólyaorr-gubósormányos – Dabas, Rákóczi erdeje, egyelés, 2016.IV.19., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, egyelés, 2016.IV.18., SV; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, talajcsapdázás, 2015. III.26., 2016.IV.14., 2017.III.17., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.V.12., NA; Táborfalva-8, 2015.IX.12., MO.

- Brachypera zoilus*** (Scopoli, 1763) – lucerna-gubósormányos – Dabas, Kül-ső-Mántelek környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.8., SV.
- Brachysomus setiger*** (Gyllenhal, 1840) – vastagsápú gyepormányos – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO.
- Brachytemnus porcatus*** (Germar, 1824) – négyzetestorú szuormányos – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Örkény, HM-lőtér, egyelés, 2012.III.8., SV.
- Bradybatus kellneri*** (Bach, 1854) – közönséges juharormányos – Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2014.IV.11., SV.
- Bradybatus tomentosus*** (Desbrochers, 1892) – molyhos juharormányos – Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2014.IV.6., 2014.IV.11., 2014.IV.12., SV.
- Cathormiocerus aristatus*** (Gyllenhal, 1827) – szálkás éjiormányos – Dabas, HM-lőtér, rostálás, 2012.V.27., SV; Dabas, Rektor-hegy, rostálás, 2013.IV.29., SV.
- Centricnemus leucogrammus*** (Germar, 1824) – kis kendermagbogár – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Táborfalva-5, 2012.V.25., 2012.VI.9., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., 2004.VIII.1., SG.
- Ceutorhynchus assimilis*** (Paykull, 1792) – repcegyökér-ceutormányos – Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV.
- Ceutorhynchus carinatus*** (Gyllenhal, 1837) – tarsóka-ceutormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2007.V.13., 2012.V.21., 2012.VI.7., SV & SZG; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Ceutorhynchus chalybaeus*** Germar, 1824 – fémes ceutormányos – „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Ceutorhynchus chlorophanus*** (Rouget, 1857) – zöldes repcsény-ceutormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.V.5., 2015.VI.11., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.IV.13., SV.
- Ceutorhynchus coarctatus*** (Gyllenhal, 1837) – ráspolyostorú ceutormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.VI.7., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Ceutorhynchus contractus*** (Marsham, 1802) – vadrepce-ceutormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, rostálás, 2014.IV.6., 2014.IV.10., 2014.V.12., SV; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, fűhálózás, 2012.IV.25., 2012.V.11., 2014.IV.6., 2014.IV.12., SV.
- Ceutorhynchus erysimi*** (Fabricius, 1787) – kis repcsény-ceutormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.VI.7., 2013.IV.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29.,

- SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, fűhalózás, 2012.V.11., 2014.IV.10., SV.
- Ceutorhynchus hirtulus*** (Germar, 1824) – lúdfű-ceutormányos – Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhalózás, 2015.V.5., SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Táborfalva, HM-lőtér, fűhalózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhalózás, 2014.V.12., SV.
- Ceutorhynchus inaeffectatus*** (Gyllenhal, 1837) – estike-ceutormányos – Táborfalva, XX. csatorna környéke, egyelés, fűhalózás, 2012.IV.25., 2014.V.12., SV.
- Ceutorhynchus nanus*** (Gyllenhal, 1837) – homoki ceutormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhalózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhalózás, 2012.VI.12., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhalózás, 2013.IV.29., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhalózás, 2014.IV.6., 2014.IV.10., SV; „Örkény”, 1999.VI.17., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhalózás, 2012.V.11., 2014.IV.12., SV.
- Ceutorhynchus nigrifolius*** (Schultze, 1896) – ikravirág-ceutormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhalózás, 2007.V.13., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhalózás, 2014.IV.10., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhalózás, 2015.V.5., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhalózás, 2014.IV.6., 2014.IV.12., SV.
- Ceutorhynchus niyazii*** (Hoffmann, 1957) – pirosorrú ceutormányos – Dabas, Pap-hegy, fűhalózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhalózás, 2013.IV.29., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhalózás, 2012.V.11., SV.
- Ceutorhynchus obstrictus*** (Marsham, 1802) – repcebecő-ceutormányos – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhalózás, 2012.V.21., 2012.VI.7., 2013.IV.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhalózás, 2012.IV.29., 2013.V.27., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhalózás, 2012.IV.29., 2012.V.27., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhalózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhalózás, 2012.VI.12., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhalózás, 2014.V.12., SV; „Örkény”, 2010.IV.12., PA; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gye, fűhalózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshalózás, 2012.V.11., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhalózás, 2012.IV.25., 2012.V.11., SV.
- Ceutorhynchus pallidactylus*** (Marsham, 1802) – szőrös repce-ceutormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhalózás, 2008.IV.23., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhalózás, 2012.VI.7., SV; „Örkény”, 1995.V.29., SGY; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.III.23., SV.
- Ceutorhynchus parvulus*** (Ch. Brisout, 1869) – kis zsázsa-ceutormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhalózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhalózás, 2013.IV.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhalózás, 2013.IV.29., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhalózás, 2012.V.11., SV.

- Ceutorhynchus picitarsis* (Gyllenhal, 1837) – fekete káposzta-ceutormányos – Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Ceutorhynchus pulvinatus* (Gyllenhal, 1837) – kis zsombor-ceutormányos – Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, 2012.IV.25., 2014.IV.6., SV.
- Ceutorhynchus puncticollis* Boheman, 1845 – pontozott ceutormányos – „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Ceutorhynchus scrobicollis* Neresheimer & H. Wagner, 1924 – erdei ceutormányos – „Örkény”, 2006.V.14., MO, GZ & PA.
- Ceutorhynchus sisymbrii* (Dieckmann, 1966) – szürke zsombor-ceutormányos – Dabas, Gyón, homoki gye, fűhálózás, 2012.VI.9., MO.
- Ceutorhynchus sophiae* (Gyllenhal, 1837) – sebforrasztófű-ceutormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV.
- Ceutorhynchus striatellus* (Schultze, 1900) – kis ternye-ceutormányos – Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, 2012.IV.25., SV.
- Ceutorhynchus sulcatus* (Ch. Brisout, 1869) – fémkék ceutormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Ceutorhynchus syrites* (Germar, 1824) – szír ceutormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2014.IV.6., SV.
- Ceutorhynchus talickyi* (Korotyaev, 1980) – pusztai ceutormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.V.5., SV; Tatárszentgyörgy, HM-lőtér, fűhálózás, 2015.IV.16., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Ceutorhynchus typhae* (Herbst, 1795) – pásztortáska-ceutormányos – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.V.20., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., 2010.IV.25., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2012.IV.29., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Ceutorhynchus unguicularis* (Thomson, 1871) – hosszúkarmú ceutormányos – Dabas-1, 2012.VI.3., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., 2012.VI.7., SV; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2015.VIII.27., SV.
- Ceutorhynchus varius* Rey, 1895 – fekete ceutormányos – Dabas-1, 2012.VI.3., MO.
- Charagmus griseus* (Fabricius, 1775) – szürke csipkézőbogár – Táborfalva-5, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.30., MO.

- Chlorophanus excisus*** (Fabricius, 1801) – kerektorú zöldormányos – „Örkény”, 2004.V.16., 2010.V.8., MO; „Örkény”, 2006.V.14., MO, GZ & PA; „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Cionus clairvillei*** Boheman, 1838 – nyúlánk gömbormányos – Dabas-3, 2012.VI.30., MO.
- Cionus gebleri*** (Gyllenhal, 1838) – lilaökörfarkkóró-gömbormányos – Dabas-3, 2012.VI.30., MO; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Táborfalva-5, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO.
- Cionus leonhardi*** (Wingelmüller, 1914) – alföldi gömbormányos – „Örkény”, 2004.V.16., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Cionus olivieri*** Rosenschöld, 1838 – nagy ökörfarkkóró-gömbormányos – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; Dabas-4, 2012.VI.3., MO; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2013.VII.23., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, egyelés, 2015.VI.11., SV.
- Cionus thapsus*** (Fabricius, 1792) – kis ökörfarkkóró-gömbormányos – Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.30., MO; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2013.VII.23., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, egyelés, 2015.VI.11., SV; Táborfalva-10, 2012.VI.3., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2014.VII.17., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., 2013.VII.29., SV.
- Cleonis pigra*** (Scopoli, 1763) – közönséges bogáncsbarkó – Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, egyelés, 2014.VIII.28., SV.
- Coniocleonus nigrosuturatus*** (Goeze, 1777) – nyíljegyes barkó – Táborfalva, HM-lőtér, talajcsapdázás, 2014.IV.6., SV; Dabas, Kosaras-domb, egyelés, 2016.IV.14., SV.
- Cosmobaris scolopacea*** (Germar, 1824) – pikkelyes bárís – Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Curculio elephas*** (Gyllenhal, 1836) – gesztenyészuzsóka – Dabas, Külső-Mántelek környéke, higanygőzlámpázás, 2015.VIII.14., SV.
- Curculio glandium*** (Marsham, 1802) – tölgymakkzsuzsóka – Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.IV.25., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, higanygőzlámpázás, kopogtatás, 2013.VI.23., 2013.VII.29., SV.
- Curculio nucum*** Linné, 1758 – mogyorózsuzsóka – „Örkény”, 1994.VII.31., SGY & SG.
- Curculio pellitus*** (Boheman, 1843) – makklikasztó zsuzsóka – Táborfalva, XX. csatorna környéke, higanygőzlámpázás, 2013.VII.29., SV.

- Cycloderes pilosulus*** (Herbst, 1795) – pikkelyeslábú ormányos – Dabas-3, 2012. VI.3., 2012.VI.30., 2012.VIII.5., MO; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013. IV.29., SV; Dabas, Kosaras-domb, talajcsapdázás, 2014.V.12., SV; Dabas, Külső-Mántelek környéke, rostálás, talajcsapdázás, 2015.II.25., 2015.III.31., SV; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.11., SV; „Örkény”, 2005.V.29., 2012.VI.9., MO; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, rostálás, talajcsapdázás, 2012.IV.25., 2012.IX.26., 2015.III.26., 2015.IV.11., 2016.IV.14., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, egyelés, fűhálózás, 2012.IV.25., 2013.VI.15., 2014.V.12., SV.
- Cyphocleonus dealbatus*** (Gmelin, 1790) – márványos barkó – „Örkény”, 2005.V.29., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014. VIII.28., NA.
- Datonychus arquatus*** (Herbst, 1795) – vízipeszérce-ormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.27., SV.
- Datonychus melanostictus*** (Marsham, 1802) – nyúlánk mentaormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., 2014.IX.3., SV.
- Dodecastichus mastix*** (Olivier, 1807) – lécesorrú gyalogormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2013.VIII.13., SV.
- Donus tessellatus*** (Boheman, 1834) – ökörfarkkóró-szálkásormányos – Dabas-3, 2012.V.25., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, egyelés, 2012.III.8., 2012.IV.13., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Dorytomus dejeani*** (Faust, 1883) – közönséges hangormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Dorytomus hirtipennis*** (Bedel, 1884) – szőrös hangormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.21., SV.
- Dorytomus longimanus*** (Forster, 1771) – kétalakú hangormányos – Táborfalva, Essői-legelő, egyelés, fűhálózás, 2004.VI.1., 2015.II.12., SV & SZG; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2014.IV.12., SV.
- Dorytomus melanophthalmus*** (Paykull, 1792) – sárgaorrú hangormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., SV; Dabas, Rektor-hegy, kopogtatás, 2013. IV.29., SV.
- Dorytomus minutus*** (Gyllenhal, 1836) – parányi hangormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., SV.
- Dorytomus puberulus*** (Boheman, 1843) – feketenyár-hangormányos – Dabas-4, 2012.VI.3., MO; Dabas, Pecsényi-tanya, kopogtatás, 2008.IV.20., SV; Dabas,

- Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., 2011.V.28., 2012.VI.7., SV; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.IV.25., SV.
- Dorytomus rubirostris*** (Gravenhorst, 1807) – tavaszi hangormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., 2011.V.28., SV.
- Dorytomus suratus*** (Gyllenhal, 1836) – sárgalábú hangormányos – „Örkény”, 2004.V.16., MO; Táborfalva, gyakorlótér, fűhálózás, kopogtatás, 2010.V.11., SV.
- Dorytomus taeniatus*** (Fabricius, 1781) – kecskefűz-hangormányos – Dabas-2, 2012.V.20., 2012.V.25., MO.
- Dorytomus tremulae*** (Fabricius, 1787) – rezgőnyár-hangormányos – Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Dorytomus villosulus*** (Gyllenhal, 1835) – sárgás hangormányos – „Örkény”, 2010.IV.12., PA; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Dryocoetes villosus*** (Fabricius, 1792) – gesztenyeszú – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.20., MO.
- Dryophthorus corticalis*** (Paykull, 1792) – erdei korhadékszuzsok – „Örkény”, 2010.IV.12., PA; Örkény, HM-lőtér, egyelés, 2012.III.8., SV; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., 2012.VI.17., 2012.VI.24., MO.
- Ellescus scanicus*** (Paykull, 1792) – sápadt nyárfaormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2012.V.21., SV.
- Eusomus ovulum*** (Germar, 1824) – közönséges cickafarkormányos – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.V.25., 2012.VI.3., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2007.V.13., 2012.VI.7., SV & SZG; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.VI.12., 2013.VII.23., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV; Örkény, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.23., SV.
- Gasterocercus depressirostris*** (Fabricius, 1792) – laposorrú ormányos – Dabas, Dabasi-bucka, egyelés, 2015.II.25., SV; Dabas, Mántelek, egyelés, 2015.III.31., SV.
- Glocianus distinctus*** (Ch. Brisout, 1869) – pitypang-gömbdedormányos – Dabas-4, 2012.VII.15., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV.
- Glocianus lethierryi*** (Ch. Brisout, 1866) – Lethierry-gömbdedormányos – Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.8., SV.
- Glocianus pilosellus*** (Gyllenhal, 1837) – szőrös gömbdedormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV.

- Glocianus punctiger*** (Gyllenhal, 1837) – ékeltfarú gömbdedormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., 2012.VI.7., 2013.IV.23., SV.
- Gymnetron aper*** Desbrochers des Loges, 1892 – apró veronika-ormányos – „Örkény”, 2005.V.29., MO.
- Gymnetron melanarium*** (Germar, 1821) – kakukkveronika-ormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; „Örkény”, 2006.V.14., MO, GZ & PA; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Gymnetron niloticum*** (Kirsch, 1881) – parányi veronika-ormányos – Dabas, Halász-domb, fűhálózás, 2011.V.28., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV.
- Gymnetron rostellum*** (Herbst, 1795) – piroslábszárú veronika-ormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; „Örkény”, 2005.V.29., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Gymnetron villosulum*** (Gyllenhal, 1838) – virágrontó veronika-ormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV.
- Herpes porcellus*** (Lacordaire, 1863) – bütököshátú ormányos (24. ábra) – „Örkény”, 1994.VII.3–5., MO; „Örkény”, 1995.VI.23., MO & PA; „Örkény”, 1995.VII.19., PA & ROI; „Örkény”, 1999.VI.9., PA; Tatárszentgyörgy, Gyóni-erdő környéke, egyelés, 2017.III.20., SV; Táborfalva-9, 2015.X.10., MO; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, rostálás, 2012.III.23., 2016.IV.14., 2017.III.15., 2017.III.16., 2017.III.17., BS, CA, KA, NA & SV; Dabas, Kosaras-domb, egyelés, 2016.IV.14., BS, CA, NA & SV.
- Hylobius transversovittatus*** (Goeze, 1777) – fűzény-fenyőormányos – Dabas, Halász-domb környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2013.VIII.13., SV.
- Hylurgus ligniperda*** (Fabricius, 1787) – gyökérhánccsszú – Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, egyelés, 2012.III.23., SV; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., MO.
- Hypera arator*** (Linnaeus, 1758) – szegfű-pikkelyesormányos – Dabas, Külső-Mántelek környéke, egyelés, 2015.II.25., SV; „Örkény”, 1994.VII.3–5., 1995.VI.23., 1996.VI.2., 1999.VI.17., 2005.V.29., MO; „Örkény”, 1995.VII.19., 2001.V.17., PA; „Örkény”, 1999.VI.9., PA & ROI; „Örkény”, 2009.IV.11., MO & NT; „Örkény”, 2001.VI.12., ROI; „Örkény”, 2001.VII.11., 2007.III.15., SZK; „Örkény”, 2011.VI.28., MO & BN; Örkény, XX. csatorna környéke, rostálás, 2012.

- IV.13., SV; Táborfalva-7, 2012.VI.9., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, rostálás, 2012.IX.26., SV.
- Hypera meles*** (Fabricius, 1792) – lóhere-pikkelyesormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Tatárszentgyörgy, HM-lőtér, fűhálózás, 2015.IV.16., SV.
- Hypera miles*** (Paykull, 1792) – lednek-pikkelyesormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., 2010.IV.25., SV; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., 2008.IV.23., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., 2014.VI.27., SV; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.11., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SG.
- Hypera nigrirostris*** (Fabricius, 1775) – pompás pikkelyesormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2010.IV.25., 2013.IV.23., SV & SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., 2008.IV.23., SV.
- Hypera plantaginis*** (DeGeer, 1775) – útifű-pikkelyesormányos – Dabas, Frigyesi-legelő, fűhálózás, 2012.VI.7., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., SV.
- Hypera postica*** (Gyllenhal, 1813) – lucerna-pikkelyesormányos – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, egyelés, 2016.IV.18., SV; „Örkény”, 1999.VI.9., 2001.V.17., PA; „Örkény”, 2005.V.29., MO.
- Hypera rumicis*** (Linnaeus, 1758) – sóska-pikkelyesormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Hypera viciae*** (Gyllenhal, 1813) – bükköny-pikkelyesormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV.
- Isochnus sequensi*** (Stierlin, 1894) – nyár-bolhaormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2007.V.13., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Labiatricula atricolor*** (Boheman, 1844) – hasznostisztesfű-báris – Dabas-4, 2012.VI.3., MO; Dabas, Rákóczi erdeje, talajcsapda, 2015.VI.27., MO; „Örkény”, 1995.V.29., SGY.
- Lachnaeus crinitus*** (Boheman, 1836) – réti sünbarkó – Dabas, Frigyesi-legelő, fűhálózás, 2012.VI.7., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.IX.3., SV.
- Larinus iacea*** (Fabricius, 1775) – sávosnyakú púderbarkó (25. ábra) – Dabas, Felső-Esső-dűlő, fűhálózás, 2011.V.28., SV; „Örkény”, 2005.V.29., MO; „Örkény”, 2005.V.27., SZK; Táborfalva, Vezetési pálya, homoki gyeper, egyelés, 2015.VII.31., MO.

Larinus minutus (Gyllenhal, 1836) – apró púderbarkó – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Dabas-3, 2012.VI.9., MO; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; Dabas, Kül-ső-Mántelek környéke, egyelés, 2015.VIII.14., SV; „Örkény”, 2005.V.29., 2010.VII.19., MO; „Örkény”, 2009.VI.16., NT & RN; Táborfalva-6, 2012.VI.24., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.9., 2012.VI.30., MO; Táborfalva-10, 2012.VII.6., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2014.VII.17., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, kopogtatás, 2012.V.11., 2013.VI.15., SV.

Larinus obtusus (Gyllenhal, 1836) – imola-púderbarkó – Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2013.VII.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2014.VI.27., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SZG; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.

Larinus planus (Fabricius, 1792) – foltos púderbarkó – Dabas-3, 2012.V.20., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.

Larinus pollinis (Laicharting, 1781) – bábakalács-púderbarkó – Dabas-3, 2012.VI.30., MO.

Larinus sturnus (Schaller, 1783) – aszat-púderbarkó – Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV.

Larinus syriacus Gyllenhal, 1835 – szír púderbarkó – „Military area between villages Örkény and Tatárszentgyörgy, 4.V.1996, leg. J. Pumr”. – A fajt a magyarországi faunára újként KRÁTKÝ és PODLUSSÁNY (2008) közölte, egyetlen hím példány alapján, mely J. Krátký (Hradec Králové, Csehország) magángyűjteményében található.

Larinus turbinatus (Gyllenhal, 1836) – kúposorrú púderbarkó – Dabas-3, 2012.VI.9., MO; Dabas-4, 2012.VIII.5., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG.

Lepyrus capucinus (Schaller, 1783) – pettyes fűzormányos – Dabas-1, 2012.VI.3., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., SV; Dabas, Göboly-járás, egyelés, 2013.IV.8., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.16., SV.

Lepyrus palustris (Scopoli, 1763) – kétpettyes fűzormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., 2012.VI.7., 2013.VII.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, kopogtatás, 2013.IV.29., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2014.IX.3., SV.

- Leucophyes pedestris*** (Poda, 1761) – négyettyes barkó – Dabas, gödörből egyelve, 2012.V.20., MO; Dabas, egyelés, 2012.IV.22., IS; Dabas, Göboly-járás, egyelés, 2013.IV.8., SV; „Örkény”, 2006.IV.22., SZK; Táborfalva, HM-lőtér, talajcsapdázás, 2014.IV.9., SV.
- Lignyodes enucleator*** (Panzer, 1798) – foltos kőrismagormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., SV.
- Lignyodes suturatus*** (Fairmaire, 1859) – barázdált kőrismagormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., 2008.IV.23., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., 2012.VI.7., SV.
- Limnobaris dolorosa*** (Goeze, 1777) – szálkás bárís – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.IV.29., 2012.V.21., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Dabas, Rektor-hegy környéke, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.11., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Limnobaris t-album*** (Linnaeus, 1758) – réti bárís – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2007.V.13., 2010.IV.25., SV & SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.23., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV.
- Lixus albomarginatus*** Boheman, 1842 – fehérszegélyes dudvabarkó – „Örkény”, 2005.V.29., MO.
- Lixus bardanae*** (Fabricius, 1787) – lórom-dudvabarkó – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Lixus brevipes*** (Ch. Brisout, 1866) – vaskosorrú dudvabarkó – Dabas-3, 2012.VI.9., 2012.VI.30., MO; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; „Örkény”, 2005.V.29., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepp, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Lixus cinerascens*** Schönherr, 1832 – hamvas dudvabarkó – „Örkény”, 2005.V.29., MO.
- Lixus fasciculatus*** (Boheman, 1836) – nyurgalábú dudvabarkó – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Lixus filiformis*** (Fabricius, 1781) – karcsú dudvabarkó – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; „Örkény”, 2005.V.29., MO; „Örkény”, 2005.V.27., SZK; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepp, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Lixus ochraceus*** (Boheman, 1843) – retek-dudvabarkó – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.

- IX.3., SV; „Örkény”, 2005.V.29., MO; Tatárszentgyörgy, Rohanka-dűlő, fűhálózás, 2007.IX.16., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Lixus paraplecticus*** (Linnaeus, 1758) – fecskefarkú dudvabarkó – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., 2014.IX.3., SV.
- Lixus pulverulentus*** (Scopoli, 1763) – mályvafűró dudvabarkó – „Örkény”, 2005.V.27., SZK; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.25., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Lixus punctiventris*** (Boheman, 1836) – aggófű-dudvabarkó – Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Lixus vilis*** (Rossi, 1790) – gémorrr-dudvabarkó – Dabas, Külső-Mántelek környéke, egyelés, 2015.II.25., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Magdalis cerasi*** (Linnaeus, 1758) – meggyfa-magdolnaormányos – Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.IV.25., SV.
- Magdalis linearis*** (Gyllenhal, 1827) – egyenes magdolnaormányos – Táborfalva, lődomb környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Magdalis memnonia*** (Gyllenhal, 1837) – fekete magdolnaormányos – Dabas, Rektor-hegy környéke, kopogtatás, 2011.V.28., SV.
- Magdalis ruficornis*** (Linnaeus, 1758) – sárgacsápú magdolnaormányos – Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, kopogtatás, 2015.V.5., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2014.V.12., SV.
- Magdalis violacea*** (Linné, 1758) – ibolyaszínű magdolnaormányos – „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Mecinus ictericus*** (Gyllenhal, 1838) – bundás útifűormányos – Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2013.VII.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2014.VI.27., SV; „Örkény”, 2010.VII.19., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2014.VII.17., SV; Táborfalva-5, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.17., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.29., 2014.VIII.28., SV.
- Mecinus janthiniformis*** Caldara et Tosevski, 2011 – déli gyújtóványfű-ormányos – Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2014.IV.12., SV.
- Mecinus janthinus*** (Germar, 1817) – kék gyújtóványfű-ormányos – Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; „Örkény”, 2010.IV.12., PA; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Mecinus labilis*** (Herbst, 1795) – tarka útifűormányos – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas, Gyón, homoki gyep, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Dabas, Vi-

- zes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., 2013.VIII.13., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Mecinus pascuorum*** (Gyllenhal, 1813) – közönséges útifűormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2004.VIII.10., 2007.V.13., 2012.VI.7., SV & SZG; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV; Dabas, Halász-domb, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; „Örkény”, 1999.VI.9. ROI; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Mecinus pirazzolii*** (Stierlin, 1867) – homoki útifűormányos – Dabas, Göboly-járás környéke, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV; Táborfalva-7, 2012.VI.24., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV; Táborfalva, lőtér, 2015.VI.27., SD.
- Mecinus pyraster*** (Herbst, 1795) – szélesnyakú útifűormányos – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., 2008.IV.23., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SG.
- Melanobaris atramentaria*** (Boheman, 1836) – fekete bárís – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV; „Örkény”, 2010.IV.12., PA; „Örkény”, 2011.IV.12., NL, NZ & PA; „Örkény”, 2005.V.19., 2010.V.8., MO; „Örkény”, 2006.V.14., MO, GZ & PA; Táborfalva, HM-lőtér, talajcsapdázás, 2014.IV.6., SV.
- Melicius cylindrus*** (Boheman, 1838) – hosszúkás szúormányos – „Örkény”, 2008.II.28., GA, MO & NT; Táborfalva, gyakorlóter, autóshálózás, 2012.VI.9., MO.
- Metadonus distinguendus*** (Boheman, 1842) – keleti pikkelyesormányos – „Örkény”, 1994.VII.31., SGY & SG.
- Minyops variolosus*** (Fabricius, 1775) – nyugati bordásormányos – Dabas, Göboly-járás, egyelés, 2009.IV.11., SV; Dabas-1, 2012.VI.3., MO.
- Mogulones albosignatus*** (Gyllenhal, 1837) – gyöngyköles-tarkaormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2012.IV.29., SV.
- Mogulones crucifer*** (Pallas, 1776) – keresztes tarkaormányos – Táborfalva, HM-lőtér, rostálás, 2012.III.23., SV.
- Mogulones cynoglossi*** (Frauenfeld, 1866) – közönséges ebnyelvűfű-tarkaormányos – Táborfalva, lődomb környéke, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Mogulones euphorbiae*** (Ch. Brisout, 1866) – nefelejcs-tarkaormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SG.
- Mogulones geographicus*** (Goeze, 1777) – térképes tarkaormányos – Dabas, Rákóczi erdeje, egyelés, 2016.IV.19., SV; „Örkény”, 2011.VI.28., MO & BN.

- Mogulones venedicus*** (J. Weise, 1879) – sárgapikkelyes tarkaormányos – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SG.
- Mononychus punctumalbum*** (Herbst, 1784) – egykarmú ormányos – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2007.V.13., SV & SZG; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Nedyus quadrimaculatus*** (Linnaeus, 1758) – közönséges csalánormányos – Dabas-4, 2012.V.20., MO; Tatárszentgyörgy, Rohanka-dűlő környéke, fűhálózás, 2015.IV.24., SV.
- Notaris acridulus*** (Linnaeus, 1758) – közönséges sásormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV.
- Notaris scirpi*** (Fabricius, 1792) – kákafűró sásormányos – „Örkény”, 1996. VII.28., SGY & SG; Táborfalva, gyakorlótér, fényre, 2012.VI.17., SZ & MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, higanygőzlámpázás, 2013.VII.29., SV.
- Omius globulus*** (Boheman, 1843) – szürke gömböcbarkó – Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV; „Örkény”, 2010.IV.12., PA; „Örkény”, 2011.IV.12., NL, NT & PA; „Örkény”, 2009.IV.11., MO & NT; „Örkény”, 2004.V.16., MO; Örkény, XX. csatorna környéke, rostálás, 2012.IV.13., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva-8, 2012.V.11., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepp, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, rostálás, 2012.III.23., 2012.IV.25., 2012.V.11., 2014.IV.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.V.12., SV.
- Omius puberulus*** (Boheman, 1834) – fémesszőrű gömböcbarkó – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2013.IV.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Omius seminulum*** (Fabricius, 1792) – magalakú gömböcbarkó – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., 2012.VI.9., 2012.VI.30., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2010.IV.25., SV & SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.VI.12., 2013. VII.23., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV; Dabas, Rektor-hegy környéke, fűhálózás, 2014.VI.27., SV; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Oprohinus consputus*** (Germar, 1824) – hamvas hagymaormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; „Örkény”, 2005.V.29., MO.
- Orchestes testaceus*** (O. F. Müller, 1776) – nyír-bolhaormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2007.V.13., 2010.IV.25., 2013.IV.23., SV.

- Orthotomicus laricis*** (Fabricius, 1792) – vörösfenyő-fogasszú – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.V.31., 2015.VI.13., MO.
- Otiorhynchus hystrix*** (Gyllenhal, 1834) – sörtés gyalogormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Rektor-hegy, egyelés, 2016.IV.14., SV; „Örkény”, 1995.VIII.5., SGY; Táborfalva, HM-lőtér, rostálás, 2016.IV.14., SV.
- Otiorhynchus ligustici*** (Linnaeus, 1758) – vincellér-gyalogormányos – Dabas-2, 2012.V.20., 2015.V.31., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Rektor-hegy, egyelés, 2016.IV.14., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV; Dabas, Kosaras-domb, talajcsapdázás, 2014.IV.10., 2014.V.12., SV; „Örkény”, 1995.V.29., SGY; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Otiorhynchus ovatus*** (Linnaeus, 1758) – apró gyalogormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.VIII.28., 2014.IX.3., SV; „Örkény”, 1994.VII.31., SGY & SG; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, rostálás, 2012.III.23., SV.
- Otiorhynchus raucus*** (Fabricius, 1776) – molyhos gyalogormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.IX.3., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV.
- Otiorhynchus rugosostriatus*** (Goeze, 1777) – számóca-gyalogormányos – Dabas, Sári, XX. csatorna, egyelés, 2014.VIII.28., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, rostálás, 2014.IX.3., SV; Táborfalva-5, 2015.IV.16., MO.
- Pelenomus canaliculatus*** (Fahraeus, 1843) – árkostorú keserűfű-ormányos – Dabas, Sári, XX. csatorna, rostálás, 2017.IX.27., SV.
- Pelenomus commari*** (Panzer, 1794) – közönséges keserűfű-ormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.23., 2014.VIII.28., SV.
- Peritelus familiaris*** (Boheman, 1834) – közönséges kendermagbogár – Dabas-1, 2012.VI.3., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., 2012.VI.7., 2013.IV.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2012.IV.29., 2013.IV.29., 2013.V.27., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; „Örkény”, 2001.V.17., 2010.IV.12., PA; „Örkény”, 2006.V.14., MO, GZ & PA; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Örkény, XX. csatorna környéke, rostálás, 2012.IV.13., SV; Tatárszentgyörgy, Rohanka-dűlő környéke, fűhálózás, 2015.IV.24., SV; Táborfalva-5, 2012.V.25., MO; Táborfalva-6,

- 2012.V.25., MO; Táborfalva-7, 2012.V.20., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.9., MO; Táborfalva-10, 2012.V.11., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, kopogtatás, 2012.V.11., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, fűhálózás, 2012.IV.25., 2012.V.11., 2014.IV.12., 2016.IV.14., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.11., 2013.VI.15., SV.
- Phyllobius argentatus*** (Linnaeus, 1758) – ezüstös levélormányos – Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, kopogtatás, 2015.IV.30., SV; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.IV.25., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Phyllobius oblongus*** (Linnaeus, 1758) – közönséges levélormányos – Dabas-4, 2012.V.20., MO; Dabas, Pecsényi-tanya, kopogtatás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, kopogtatás, 2012.IV.25., 2012.5.11., SV.
- Phyllobius pyri*** (Linnaeus, 1758) – gyümölcsfa-levélormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, kopogtatás, 2008.IV.20., SV; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyep, fűhálózás, 2012.IV.30., MO.
- Phyllobius vespertinus*** (Fabricius, 1792) – pufók levélormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Tatárszentgyörgy, Rohanka-dűlő környéke, fűhálózás, 2015.IV.24., SV.
- Phyllobius virideaeris*** (Laicharting, 1781) – halványzöld levélormányos – Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2012.IV.29., SZG; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV; Táborfalva, gyakorlótér, fűhálózás, kopogtatás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Phyllobius viridicollis*** (Fabricius, 1792) – zömök levélormányos – Dabas-1, 2012.V.25., MO; Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., MO.
- Phytobius leucogaster*** (Marsham, 1802) – süllőhínár-ormányos – Dabas, Sári, XX. csatorna, rostálás, 2017.IX.27., SV.
- Pityogenes conjunctus*** Reitter, 1887 – kampós firkálószerű – „Örkény”, lámpázás, 1994.VII.31., SGY & SG.
- Polydrusus cervinus*** (Linnaeus, 1758) – aranyporos lombormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, kopogtatás, 2008.IV.20., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.21., SV; Tatárszentgyörgy, Rohanka-dűlő környéke,

- fűhálózás, 2015.IV.24., SV; Táborfalva, HM-lőtér, kopogtatás, 2012.IV.25., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Polydrusus confluens*** (Stephens, 1831) – sávós lombormányos – Dabas-2, 2012.V.20., 2012.V.25., MO; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV; Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO.
- Polydrusus corruscus*** (Germar, 1824) – kecskefűz-lombormányos – Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2014.V.12., SV.
- Polydrusus formosus*** (Mayer, 1779) – selymes lombormányos – Dabas-4, 2012.VI.3., MO.
- Polydrusus gracilicornis*** (Kiesenwetter, 1864) – mediterrán lombormányos – Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2013.VII.31., 2014.VIII.28., 2015.VIII.27., SV. – E táborfalvai adatok alapján a fajt SZÉNÁSI (2016) a magyarországi faunára újként közölte.
- Polydrusus impar*** (Des Gozis, 1882) – fenyves-lombormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SV; Dabas, Rektor-hegy környéke, kopogtatás, 2011.V.28., SV.
- Polydrusus picus*** (Fabricius, 1792) – foltos lombormányos – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.21., SV; „Örkény”, 1999.VI.9. ROI; „Örkény”, 2006.V.14., MO, GZ & PA; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.
- Polydrusus tibialis*** (Gyllenhal, 1834) – gyepi lombormányos – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.V.20., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Prisistus obsoletus*** (Germar, 1824) – bársonyos ormányos – Dabas-3, 2012.X.22., MO; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Külső-Mántelek környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.11., SV; „Örkény”, 1999.VI.9., 2001.V.17., PA; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Prisistus suturaalba*** (Schultze, 1903) – fehérvarratú ormányos – Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Pseudocleonus cinereus*** (Schrank, 1781) – hamvas barkó – Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, egyelés, talajcsapdázás, 2015.IV.8., 2015.IV.11., SV.
- Pseudomylloceris sinuatus*** (Fabricius, 1801) – szeder-levélmormányos – Dabas, Dabas-belső, egyelés, 2006.VIII.9., SV.
- Pseudorchestes ermischii*** (Dieckmann, 1958) – Ermisch-bolhaormányos – Dabas, Gyón, homoki gyepek, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., 2013.VIII.13., SV; Dabas, Pecsényi-tanya,

- fűhálózás, 2008.IV.23., SV; Dabas, Halász-domb, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.IV.25., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Pseudorchestes pratensis*** (Germar, 1821) – imola-bolhaormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2004.VIII.10., 2007.VIII.20., 2012.VI.7., 2013.IV.23., SV & SZG; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV.
- Pteleobius kraatzii*** (Eichhoff, 1864) – tarka szilszú – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.IV.26., MO.
- Ranunculiphilus faeculentus*** (Gyllenhal, 1837) – szarkalábormányos – Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Rhabdorrhynchus echii*** Brahm, 1790 – kígyósziszbarkó – Dabas-3, 2012.VI.30., MO.
- Rhinocyllus conicus*** (Frölich, 1792) – tömpeorrú barkó – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.VI.7., SV.
- Rhinoncus albicinctus*** (Gyllenhal, 1837) – fehérfoltos keserűfű-ormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.IX.3., SV.
- Rhinoncus bruchoides*** (Herbst, 1784) – mocsári keserűfű-ormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV.
- Rhinoncus castor*** (Fabricius, 1792) – élénkfoltos juhsóskaormányos – Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD.
- Rhinoncus inconspectus*** (Herbst, 1795) – nagy keserűfű-ormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Rhinoncus pericarpus*** (Linnaeus, 1758) – vöröslábú keserűfű-ormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, rostálás, 2012.V.21., 2012.V.27., 2012.X.3., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.31., SV.
- Rhinoncus perpendicularis*** (Reich, 1797) – foltos keserűfű-ormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, rostálás, 2012.V.21., 2012.V.27., 2012.X.3., 2014.IX.3., SV.
- Rhinusa antirrhini*** (Paykull, 1800) – fekete gyújtoványfű-ormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV.
- Rhinusa asellus*** (Gravenhorst, 1807) – szöröcsillagos gyújtoványfű-ormányos – Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepek, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.

- Rhinusa florum*** (Rübsaamen, 1895) – kerekded gyújtoványfű-ormányos – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; „Örkény”, 2010.VII.19., MO; Táborfalva-8, 2012.VI.30., MO.
- Rhinusa linariae*** (Panzer, 1792) – gubacsképző gyújtoványfű-ormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV.
- Rhinusa neta*** (Germar, 1821) – drapp gyújtoványfű-ormányos – Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV.
- Rhinusa tetra*** (Fabricius, 1792) – magtoklakó gyújtoványfű-ormányos – Dabas-2, 2012.V.20., MO; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., 2013.VII.23., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV; „Örkény”, 2008.V.12., 2009.VI.14., RD; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Rhyncolus elongatus*** (Gyllenhal, 1827) – nyurga szúormányos – Dabas, Dabasi-bucka környéke, egyelés, 2015.III.31., SV; Örkény, HM-lőtér, egyelés, 2012.III.8., SV; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.3., MO; Táborfalva, Betyár-domb, egyelés, 2015.II.12., SV.
- Rhyncolus reflexus*** Boheman, 1838 – szegélyes szúormányos – „Örkény”, 2010.IV.12., PA.
- Rutidosoma graminosus*** (Gistel, 1857) – rezgőnyár-gömbölyűormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.IV.29., 2014.VIII.28., SV.
- Scolytus intricatus*** (Ratzeburg, 1837) – tölgykéregszú – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.V.20., 2012.VI.24., MO.
- Sibinia femoralis*** (Germar, 1824) – habszegfűormányos – Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.VI.12., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., 2013.VII.29., SV.
- Sibinia hopffgarteni*** (Tournier, 1873) – egyszínű madárhúormányos – Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Sibinia pellucens*** (Scopoli, 1772) – mécsvirágormányos – Dabas-3, 2012.VI.30., MO; Dabas, Gyón, homoki gyep, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., SV; „Örkény”, 2004.V.16., 2005.V.29., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.

- Sibinia phalerata*** (Gyllenhal, 1836) – közepfoltos madárhúormányos – Dabas, Külső-Mántelek környéke, rostálás, 2015.III.31., SV.
- Sibinia subelliptica*** (Desbrochers, 1873) – barátságfű-ormányos – Dabas-1, 2012.V.20., 2012.VI.3., MO; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Táborfalva, gyakorlótér, homoki gyepp, fűhálózás, 2012.IV.30., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Sibinia tibialis*** (Gyllenhal, 1836) – szikárhabszegfű-ormányos – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., 2013.VII.23., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; „Örkény”, 2010.VII.19., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2014.VII.17., SV; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.30., 2012.VII.20., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.29., SV.
- Sibinia unicolor*** (Fahraeus, 1843) – fátyolvirág-ormányos – Dabas-1, 2012.VI.3., MO; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.VI.12., 2013.VII.23., SV; Dabas, Halász-domb, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., 2013.V.27., SV; Dabas, Kosaras-domb, fűhálózás, 2014.V.12., SV; Táborfalva-10, 2012.V.11., 2012.VI.9., 2012.VI.17., 2012.VI.30., 2012.VII.20., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., 2004.VIII.1., 2014.VII.17., SV & SZG; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., 2013.VII.29., 2014.V.12., 2014.VIII.28., SV.
- Sibinia viscaria*** (Linnaeus, 1760) – rendezettpikkelyű habszegfűormányos – Dabas-3, 2012.VI.30., MO; Dabas, Gyón, homoki gyepp, fűhálózás, 2012.VI.9., MO.
- Sibinia vittata*** (Germar, 1824) – csíkos szegfűormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Táborfalva-6, 2012.V.25., MO; Táborfalva-8, 2012.V.11., MO; Táborfalva-9, 2012.V.11., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Sitona callosus*** (Gyllenhal, 1834) – szempillás csipkézőbogár – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.VIII.10., SZG; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2014.VI.27., SV; Dabas, Göboly-járás környéke, fűhálózás, 2014.VIII.28.,

- SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.IX.3., SV; Dabas, Külső-Mántelek környéke, higanygőztlámpázás, 2015.VIII.14., SV; „Örkény”, 1999.III.21., NL; Táborfalva, gyakorlótér, kopogtatás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SZG; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Sitona cylindricollis*** (Fahraeus, 1840) – hengerestorú csipkézőbogár – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2013.VIII.13., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Sitona hispidulus*** (Fabricius, 1776) – szőrös csipkézőbogár – Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.23., SV; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.16., SV; „Örkény”, 2007.III.15., SZK; Táborfalva-7, 2012.IX.29., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., 2014.VIII.28., 2017.III.17., BS & SV.
- Sitona humeralis*** (Stephens, 1831) – lucerna-csipkézőbogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-3, 2012.VIII.5., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2004.VIII.10., SZG; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; „Örkény”, 2006.V.14., MO, GZ & PA; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Örkény, XX. csatorna környéke, rostálás, 2012.IV.13., 2013.VI.23., SV; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, kopogtatás, talajcsapdázás, 2012.III.23., 2012.V.11., 2014.IV.10., 2014.VIII.28., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.31., 2017.III.17., BS & SV.
- Sitona inops*** (Gyllenhal, 1832) – laposzemű csipkézőbogár – Tatárszentgyörgy, Rohanka-dűlő, fűhálózás, 2007.IX.16., SV.
- Sitona languidus*** (Gyllenhal, 1834) – koronafürt-csipkézőbogár – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Táborfalva, HM-lőtér, rostálás, 2012.III.8., SV.
- Sitona lateralis*** (Gyllenhal, 1834) – iglice-csipkézőbogár – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SG.
- Sitona lineatus*** (Linnaeus, 1758) – sávcsipkézőbogár – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, Külső-Mántelek környéke, rostálás, 2015.II.25., 2015.III.31., SV; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.11., SV; Tatárszentgyörgy, HM-lőtér, fűhálózás, 2015.IV.16., SV.
- Sitona longulus*** (Gyllenhal, 1834) – hosszú csipkézőbogár – Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.31., SV.

- Sitona macularius*** (Marshall, 1802) – borsó-csipkézőbogár – Dabas-3, 2012. VI.30., 2012.VII.6., MO; Dabas-4, 2012.V.20., MO; Dabas, Külső-Mántelek környéke, rostálás, 2015.II.25., SV; „Örkény”, 2007.III.15., SZK; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, fűhálózás, 2012.III.23., 2012.V.11., CA & SV.
- Sitona obsoletus*** (Gmelin, 1790) – sárga csipkézőbogár – Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Sitona puncticollis*** (Stephens, 1831) – nagy csipkézőbogár – Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SZG; Táborfalva-8, 2012.VI.17., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.V.12., SV.
- Sitona striatellus*** (Gyllenhal, 1834) – bükköny-csipkézőbogár – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2012.VI.7., SZG; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., 2004.VIII.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Sitona suturalis*** (Stephens, 1831) – színes csipkézőbogár – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2010.IV.25., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV.
- Sitona waterhousei*** (Walton, 1846) – dülledtszemű csipkézőbogár – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.23., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SG.
- Sitophilus zeamais*** Motschulsky, 1855 – barnás kukoricazsuzsok – Táborfalva, Vezetési pálya, autóshálózás, 2015.VI.5., MO.
- Smicronyx jungermanniae*** (Reich, 1797) – közönséges arankaormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2013.VIII.13., SV & SZG; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2014.VIII.28., SV.
- Smicronyx swertiae*** (Voss, 1953) – gyásztárnicsormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VII.31., 2014.VIII.28., SV.
- Sphenophorus striatopunctatus*** (Goeze, 1777) – mezei zsuzsok – Dabas, Halász-domb környéke, egyelés, 2003.IV.25., SV.
- Stenocarus cardui*** (Herbst, 1784) – pipacsgyökérormányos – Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., 2008.IV.23., SV; Tatárszentgyörgy, HM-lőtér, fűhálózás, 2015.IV.16., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Stenocarus ruficornis*** (Stephens, 1831) – mákgyökérormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV.

- Stereonychus fraxini*** (DeGeer, 1775) – kőris-gömbormányos – Dabas-4, 2012. VI.3., MO; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.20., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, kopogtatás, 2010.IV.25., 2012.IV.29., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.27., SV.
- Strophosoma faber*** (Herbst, 1785) – homoki mesterormányos – Dabas, Külső-Mántelek környéke, rostálás, 2015.III.31., SV; „Örkény”, 1995.VIII.5., SGY; „Örkény”, 2005.V.29., MO; Táborfalva-6, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-7, 2012.VI.30., MO; Táborfalva-10, 2012.VI.9., 2012.VI.30., MO; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., 2004.VIII.1., SZG; Táborfalva, HM-lőtér, egyelés, rostálás, 2012.III.23., 2016.IV.14., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., 2013.VII.29., 2013.VII.31., SV.
- Stuebenius frivaldszkyi*** (Kuthy, 1887) – Frivaldszky-éjiormányos – Dabas, HM-lőtér, rostálás, 2012.V.27., SV; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.11., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015. VI.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, rostálás, 2014.VIII.28., SV.
- Tachyerges stigma*** (Germar, 1821) – fehérjegyes bolhaormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.27., 2014.IX.3., SV; Dabas, Essői-legelő, kopogtatás, 2013.VI.15., SV.
- Tanymecus palliatus*** (Fabricius, 1787) – hegyesfarú barkó – Dabas-1, 2012.V.20., MO; Dabas-2, 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; Dabas-3, 2012.VI.3., 2012.VI.9., MO; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2007.V.13., 2012. VI.7., SV & SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.23., SV; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VIII.1., SG.
- Tanysphyrus lemnae*** (Paykull, 1792) – békalencse-ormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2007.V.13., 2013.VIII.13., SV & SZG; Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, rostálás, 2012.V.21., 2012.V.27., 2012.X.3., SV; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.17., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Tapeinotus sellatus*** (Fabricius, 1794) – díszes lizinkaormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Thamiocolus pubicollis*** (Gyllenhal, 1837) – hosszúorrú fésűslábú-ormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., 2010.IV.25., 2012.V.21., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., 2014.VI.27., SV; Dabas, Essői-legelő, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Thamiocolus viduatus*** (Gyllenhal, 1837) – barnás fésűslábú-ormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, rostálás, 2012.V.21., 2012.X.3., 2014. IX.3., SV.

- Thryogenes festucae* (Herbst, 1795) – közönséges nádormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.V.27., SV.
- Thryogenes scirrhus* (Gyllenhal, 1836) – karcsú békabuzogány-ormányos – Dabas, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.21., 2014.VIII.28., SV.
- Trachyphloeus alternans* Gyllenhal, 1834 – bordás éjiormányos – Dabas, Sári, XX. csatorna, rostálás, 2017.IX.27., SV.
- Trachyphloeus spinimanus* (Germar, 1824) – töviseslábú éjiormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV; Dabas, Külső-Mántelek környéke, rostálás, 2015.III.31., SV; Dabas, Külső-Mántelek környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.11., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, rostálás, 2004.VI.1., 2004.VIII.1., 2014.VII.17., SV & SZG.
- Trichosirocalus troglodytes* (Fabricius, 1787) – kis útifűormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., 2010.IV.25., 2012.V.21., SV & SZG; Dabas, Pecsényi-tanya, fűhálózás, 2008.IV.23., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.V.27., SV; Dabas, Halász-domb környéke, talajcsapdázás, 2015.IV.11., SV.
- Trypophloeus granulatus* (Ratzeburg, 1837) – fehérnyárszú – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO.
- Tychius brevisculus* (Desbrochers, 1873) – laposzemű tímárormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2007.V.13., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2013.VI.15., SV.
- Tychius crassirostris* (Kirsch, 1871) – levélgubacs-tímárormányos – Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Tychius flavus* Becker, 1864 – lucernamag-tímárormányos – „Örkény”, 2001.VI.12., ROI.
- Tychius junceus* (Reich, 1797) – őszi tímárormányos – Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV.
- Tychius kulzeri* (Penecke, 1934) – dülledtszemű tímárormányos – Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV.
- Tychius medicaginis* (Ch. Brisout, 1862) – lucerna-tímárormányos – Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2004.V.30., SZG; Dabas, Felső-Esső, fűhálózás, 2012.VI.1., SV; „Örkény”, 1999.VI.9. ROI; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.
- Tychius meliloti* (Stephens, 1831) – nagyfogú tímárormányos – Dabas, Gyón, homoki gyp, fűhálózás, 2012.VI.9., MO; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2013.IV.23., SV; Dabas, Rektor-hegy környéke, fűhálózás, 2014.VI.27., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák

környéke, fűhálózás, 2015.V.5., SV; „Örkény”, 2001.VI.12., ROI; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SZG; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.VI.30., MO; Táborfalva, XX. csatorna környéke, kopogtatás, 2012.V.11., SV.

Tychius picirostris (Fabricius, 1787) – szurkosorrú tímárormányos – Dabas, Hálsz-domb, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.VI.7., SV; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; Táborfalva, Essői-legelő, fűhálózás, 2004.VI.1., SG.

Tychius pumilus Ch. Brisout, 1862 – törpe tímárormányos – Dabas-1, 2012.VI.3., MO.

Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) – borsó-tímárormányos – Dabas-2, 2012.VI.9., MO; Dabas-3, 2012.V.20., MO; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.V.21., 2012.VI.12., SV; Dabas, Rektor-hegy, fűhálózás, 2013.IV.29., SV; „Örkény”, 2008.V.12., RD; Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO; Táborfalva, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.11., SV; Táborfalva, XX. csatorna környéke, fűhálózás, 2012.V.11., SV.

Tychius schneideri (Herbst, 1795) – nyúlzapuka-tímárormányos – Táborfalva-5, 2012.V.25., MO.

Tychius squamulatus (Gyllenhal, 1836) – somkóró-tímárormányos – Dabas-2, 2012.VI.9., MO; Dabas, Pap-hegy, fűhálózás, 2012.VI.12., SV; Kunpeszér, Gyóni-buckák környéke, fűhálózás, 2015.VI.11., SV.

Tychius stephensi (Schönherr, 1836) – rétihere-tímárormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.27., SV; Dabas, Vizes-Nyilas-erdő, fűhálózás, 2012.VI.7., SV; Táborfalva-10, 2012.VII.20., MO.

Tychius tridentinus (Penecke, 1922) – hamvas tímárormányos – Dabas, HM-lőtér, fűhálózás, 2012.V.21., SV.

Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) – cser-szarvasszú – Dabas, Rákóczi erdeje, autóshálózás, 2015.VI.13., MO; Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.VI.9., 2012.VI.17., MO.

Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) – tölgy-szarvasszú – Táborfalva, gyakorlótér, autóshálózás, 2012.IV.30., 2012.V.20., 2012.VI.3., 2012.VI.17., MO.

*

Köszönetnyilvánítás – A szerzők köszönik a munkáját mindazon gyűjtőknek (nevük az előkerült bogárfajok felsorolása előtt szerepel), akik hozzájárultak a fajok és adatok látványos bővítéséhez. Az engedélyhez kötött gyűjtések szervezését Csóka Annamária és Verő György (DINPI) végezte. Az egyes családok anyagainak részbeni vagy teljes meghatározásában jelentős részt vállalt Hegyessy Gábor (Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely), György Zoltán, Makranczy György, Németh Tamás, Szél Győző (az MTM munkatársai), Mus-

kovits József, Nádai László, Rahmé Nikola, Podlussány Attila, Seres Gábor, Szalóki Dezső (budapesti amatőr bogárgyűjtők, a Magyar Rovartani Társaság tagjai), Jan Horák (Prága, Csehország), Wolfgang H. Rücker (Neuwied, Németország), Lukáš Sekerka (Národní muzeum, Prága, Csehország) és Mikael Sörensson (Lunds universitet, Lund, Svédország). Az adatok számítógépre vitelében sokat segített Grabant Aranka (MTM). A fényképeket Kalotás Zsolt, Németh Tamás, Rahmé Nikola, Retezár Imre és Szőke Viktória bocsátotta rendelkezésünkre.

IRODALOMJEGYZÉK

- BERNARDINELLI, I. és MOSSSENTA, M. (2009): Flight period of *Gasterocercus depressirostris* in relation to temperature in North-eastern Italy. – *Bulletin of Insectology* **62**(2): 209–213.
- BÉRCES, S., SZÉL, GY., KUTASI, CS. és KÖDÖBÖCZ, V. (2014): Magyar futrinka. – In: HARASZTHY, L. (szerk.): *Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon*. Pro Vértességi Közalapítvány, Csákvár, pp. 209–215.
- BÉRCES, S., CSÓKA, A. és ELEK, Z. (2018): Befolyásolja-e a kísérleti elrendezés a magyar futrinka (*Carabus hungaricus*) populációjának becslési paramétereit? Módszertani esettanulmány a táborfalvai hosszú távú fogás-jelölés-visszafogás kutatásokról. – In: KORDA, M. (szerk.): *Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén. Rosalia 10*. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 679–696.
- BOKOR, E. (1922): Bogártudományi jegyzetek. – *Rovartani Lapok* **26**: 33–38.
- CSEHÓ, G. (2018): Adatok az Ócsai Tájvédelmi Körzet és az Ócsai Gyakorlótér bogárfaunájához, különös tekintettel a természetvédelmi szempontból jelentős fajokra (Coleoptera). – In: KORDA, M. (szerk.): *Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén. Rosalia 10*. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 665–678.
- CSÓKA, GY. és KOVÁCS, T. (1999): *Xilofág rovarok – Xylophagous insects*. – Erdészeti Tudományos Intézet, Agroiinform Kiadó, Budapest, 189 pp.
- HEGYESSY, G. és KOVÁCS, T. (2003): Adatok a Dunántúli déli részének cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). – *Folia historico-naturalia Musei matraensis* **27**: 161–196.
- HEGYESSY, G., KOVÁCS, T., MUSKOVITS, J. és SZALÓKI, D. (2000): Adatok Budapest és Pest megye cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). – *Folia historico-naturalia Musei matraensis* **24**: 221–282.
- HEGYESSY, G. és MERKL, O. (2014): Nagy hörcsincsér. – In: HARASZTHY, L. (szerk.): *Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon*. Pro Vértességi Közalapítvány, Csákvár, pp. 260–264.
- JAKUBEC, P. és RŮŽIČKA, J. (2015): Is the type of soil an important factor determining the local abundance of carrion beetles (Coleoptera: Silphidae)? – *European Journal of Entomology* **112**(4): 747–754.
- JUHÁSZ, G. (2018): A táborfalvai lö- és gyakorlótér, valamint az ócsai honvédségi terület története. – In: KORDA, M. (szerk.): *Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén. Rosalia 10*. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 65–80.
- KOVÁCS, T. (1997): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai II. (Coleoptera: Cerambycidae). – *Folia historico-naturalia Musei matraensis* **22**: 247–255.
- KOVÁCS, T. és HEGYESSY, G. (1995): Magyarországi cincér tápnövények (Coleoptera, Cerambycidae). – *Folia historico-naturalia Musei matraensis* **20**: 185–197.
- KOVÁCS, T., MUSKOVITS, J. és HEGYESSY, G. (2000): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai III. (Coleoptera: Cerambycidae). – *Folia historico-naturalia Musei matraensis* **24**: 205–220.

- KRÁTKÝ, J. és PODLUSSÁNY, A. (2008): New weevil species in the fauna of Hungary (Coleoptera: Curculionioidea). – *Folia entomologica hungarica* **69**: 185–188.
- LACKNER, T. (2010): Review of the Palearctic genera of Saprininae (Coleoptera: Histeridae). – *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **50** (supplementum): 1–254.
- LUCHT, W. és MERKL, O. (1993): Különböző csápú bogarak II. – Diversicornia II. Álpattanóbogarak, tövisnyakú bogarak, Merevbogarak – Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae. – In: *Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), VIII, 3.* Akadémiai Kiadó, Budapest, 34 pp.
- MAHUNKA, S. (szerk.) (1986): *The fauna of the Kiskunság National Park, I.* – Akadémiai Kiadó, Budapest, 491 pp.
- MAHUNKA, S. (szerk.) (1987): *The fauna of the Kiskunság National Park, II.* – Akadémiai Kiadó, Budapest, 479 pp.
- MEDVEGY, M. és MUSKOVITS, J. (1994): Az óriás galacsinhajtó rejtélye (Coleoptera, Scarabaeidae). Miért nem lehetett óriás galacsinhajtot találni 1971 és 1993 között? – *Folia entomologica hungarica* **55**: 379–380.
- MERKL, O. (2004): Cryptophilinae and Xenoscelinae of Hungary, with a check-list of Hungarian Erotylidae (Coleoptera). – *Folia historico-naturalia Musei matraensis* **28**: 123–133.
- MERKL, O. (2006): New beetle species in the Hungarian fauna (Coleoptera). – *Folia entomologica hungarica* **67**: 19–36.
- MERKL, O. (2014a): Szarvas álganéjtűró. – In: HARASZTHY, L. (szerk.): *Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon*. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 243–245.
- MERKL, O. (2014b): Skarlátbogár. – In: HARASZTHY, L. (szerk.): *Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon*. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 254–256.
- MERKL, O. (2018): Bogarak az Ócsai Gyakorlótérrel (Coleoptera). – In: KORDA, M. (szerk.): *Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén. Rosalia 10.* Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 639–664.
- MERKL, O. és NÉMETH, T. (2008): Notes on and further new species of the beetles in the Hungarian fauna (Coleoptera). – *Folia entomologica hungarica* **69**: 165–172.
- MERKL, O., SZÉL, GY. és TALLÓSI, B. (2011): Adatok a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” Natura 2000 terület bogárfaunájához (Coleoptera). – In: VERŐ, GY. (szerk.): *Természetvédelem és kutatás a Duna–Tisza közti homokhátságon. Tanulmánygyűjtemény. Rosalia 6.* Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 139–199.
- MERKL, O., KÖDÖBÖCZ, V., DELI, T. és DANYIK, T. (2014): Bogárfaunisztikai adatok a Dél-Tiszántúlról (Coleoptera). – *Crisicum* **8**: 99–152.
- MERKL, O. és VIG, K. (2009): *Bogarak a pannon régióban*. – Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, B. K. L. Kiadó, Magyar Természettudományi Múzeum, Szombathely, 494 pp.
- MUSKOVITS, J. és HEGYESSY, G. (2002): *Magyarország díszbogarai (Coleoptera: Buprestidae)*. – Grafon Kiadó, Nagykovácsi, 404 pp.
- NAGY, B. (1994): Heuschreckengradationen in Ungarn 1993. – *Articulata* **9**(1): 65–72.
- NAGY, F., SZÉL, GY. és VIG, K. (2004): Vas megye futóbogár-faunája (Coleoptera: Carabidae). – *Praenorica Folia historico-naturalia* **7**: 5–235.
- NÁDAI, L. és MERKL, O. (2004): Magyarország irhabogárféléinek lelőhelyadatai (Coleoptera: Trogididae). – *Folia historico-naturalia Musei matraensis* **28**: 111–122.
- PODLUSSÁNY, A. (2001): Új ormányosalkatú bogárfajok Magyarország faunájában (Coleoptera: Curculionioidea). – *Folia entomologica hungarica* **62**: 372–378.
- PONEL, P., PEREZ, C. és BLIGHT, O. (2013): *Cnemeplatia atropos* A. Costa, 1847: présence en France continentale et nouvelle capture en Corse (Coleoptera Tenebrionidae Pimeliinae). – *L'Entomologiste* **69**(6): 353–355.

- ROBERTSON, J., ŚLIPŃSKI, A., MOULTON, M., SHOCKLEY, F. W., GIORGI, A., LORD, N. P., MCKENNA, D. D., TOMASZEWSKA, W., FORRESTER, J., MILLER, K. B., WHITING, M. F. és MCHUGH, J. V. (2015): Phylogeny and classification of Cucujoidea and the recognition of a new superfamily Coccinelloidea (Coleoptera: Cucujiformia). – *Systematic Entomology* **40**: 745–778. <https://doi.org/10.1111/syen.12138>
- ROGOSZ, J. (2001): *Örkény története I.* – Örkény Nagyközségi Önkormányzat, Örkény, 256 pp.
- SABOL, O. (2012): Několik poznatků k aktivitě imág *Glaresis rufa* (Coleoptera: Trogidae). Records of adult activity in *Glaresis rufa* (Coleoptera: Trogidae). – *Klapalekiana* **48**: 137–140.
- SASSI, D. (2014): Taxonomic remarks, phylogeny and evolutionary notes on the leaf beetle species belonging to the *Cryptocephalus sericeus* complex (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae). – *Zootaxa* **3857** (3): 333–378. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3857.3.2>.
- SCHWEINSCHWALLER, I. és ZETTEL, H. (1995): Vorkommen und jahreszeitliche Aktivität von *Harpalus scaritides* Sturm, 1818, im Stadtgebiet von Wien (Coleoptera, Carabidae). – *Entomologische Nachrichten (N.F.)* **2**(1): 11–15.
- SECQ, M. és SECQ, B. (1995): Révision des *Saprinus* Erichson du sous-genre *Microsaprinus* Kryzhanovskij & Reichardt (Coleoptera, Histeridae). – *Bulletin de la Société Entomologique de France* **100**: 29–36.
- SOMAY, L. (2007): A dél-mezőföldi homok- és löszpuszták bogárfaunisztikai vizsgálata. – In: BATTÁRY, P. és KÖRÖSI, Á. (szerk.): *3. Szünzoológiai Szimpózium, Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2007. március 5–6. Program; Előadások és poszterek összefoglalói.* Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Szeged, p. 53. Online: http://www.ecology.hu/abstractok/szuszi_2007.pdf [Hozzáférés: 2017. június 19.]
- SZALÓKI, D., HORVÁTH, B. és MERKL, O. (2012): First record of *Ripidius quadriceps*, and data of other wedge-shaped beetles in Hungary (Coleoptera: Ripiphoridae). – *Folia entomologica hungarica* **73**: 35–43.
- SZALÓKI, D. és MERKL, O. (2005): A new soft-winged flower beetle in the Hungarian fauna, with a national checklist of Malachiidae (Coleoptera). – *Folia entomologica hungarica* **66**: 95–100.
- SZÉL, GY., BÉRCES, S., KUTASI, Cs. és KÖDÖBÖCZ, V. (2006): A magyar futrinka (*Carabus hungaricus* Fabricius, 1792) hazai elterjedése és élőhelyei (Coleoptera: Carabidae). – *Praenorica Folia historico-naturalia* **9**: 45–80.
- SZÉNÁSI, V. (2016): Two new weevil species in Hungary (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae). – *Folia entomologica hungarica* **77**: 53–55. <https://doi.org/10.17112/FoliaEntHung.2016.77.53>

THE BEETLE (COLEOPTERA) FAUNA OF THE SOUTHERN PART OF THE TURJÁNVIDÉK NATURA 2000 SITE

Ottó MERKL¹ and Valentin SZÉNÁSI²

¹Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum,
H-1088 Budapest, Baross utca 13, Hungary. E-mail: merkl.otto@nhmus.hu

²Duna–Ipoly National Park Directorate,
H-1121 Budapest, Költő utca 21, Hungary. E-mail: szvalent@gmail.com

A total of 1085 beetle species was identified from the material collected in the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site in Pest County, in the Danube–Tisza Interfluve, more precisely within the Táborfalva military training area and the Dabas Turjános Nature Conservation Area. The most valuable species both in terms of nature conservation and faunistics are inhabitants of open and closed sandy grassland habitats. The material yielded 41 protected and 1 strictly protected beetle species of which four are species of community interest, namely *Carabus hungaricus*, *Bolbelasmus unicornis*, *Cucujus cinnaberinus* and *Cerambyx cerdo*. The following protected species have populations significant at the national level: *Carabus hungaricus* (Carabidae), *Glaresis rufa* (Glaresidae), *Herpes porcellus* (Curculionidae), *Macrosiagon bimaculata* (Rhipiphoridae), *Scarabaeus typhon* (Scarabaeidae), *Stenoria apicalis* (Meloidae). Furthermore, a specimen belonging to the genus *Microsaprinus* (Histeridae) has also been identified. This genus was previously unknown from Hungary, but the specimen is a female, therefore identification at the species level is impossible.

Key words – beetles, Coleoptera, forest steppe, Homokhátság, Natura 2000